

**Abhandlungen**

der

**schweizerischen paläontologischen Gesellschaft.**



# **DIE RINDER DER TERTIÄR-EPOCHE**

**NEBST VORSTUDIEN**

**ZU EINER**

**Natürlichen Geschichte der Antilopen.**

**VON**

**L. Rütimeyer.**



Mit sieben Doppeltafeln nebst Holzschnitten.



**ZÜRICH**

**Druck von Zürcher und Furrer.**

**1877 & 1878.**





## 5. Strepsiceros-Gruppe.

**Tragelaphus. — Strepsiceros. — Oreas.**

Unter den zahlreichen Verbindungsfäden, durch welche die Schaaren der Antilopen einmal mit den Hirschen, andererseits mit den Gipfelpunkten unter den Cavicornia, den Schafen und Rindern in Berührung stehen, wird einer der merkwürdigsten durch die strepsiceren Antilopen gebildet. Heutzutage nur durch wenige und grösstentheils äberaus stämmige Formen, ja durch die jetzigen Riesen unter den Antilopen vertreten, schlagen die Merkmale ihres Schädels und Gebisses eine Brücke zwischen denjenigen der Antilopen und der Hirsche. Um so unerwarteter, als ihr Wohnort allem Anschein nach auf den Süden und Westen von Afrika eingeschränkt, von demjenigen der Hirsche weit abgetrennt ist. Auch hier wird sich also die Frage aufdrängen, ob die Aehnlichkeiten, die sich in einigen Fällen selbst auf äussere Erscheinung wie Statur und Farbe des Gewandes zu erstrecken scheinen \*), nur erworbener Art — wie es etwa für diejenigen von Dicranoceros und Rennthier vermuthet wurde — oder ob sie umgekehrt von historischer Bedeutung sein möchten. Im letztern Falle würde darin noch ein älteres Denkmal von Verwandtschaft vorliegen als in den früher berührten gelegentlichen Spuren von Stammesgenossenschaft zwischen Hirschen und den doch noch hier und da den Tisch mit ihnen theilenden Gazellen.

Den Gazellen in mancher Beziehung nahestehend besteht das augenfälligste Merkmal der Strepsiceren vor Allem in der Stellung und Beschaffenheit der Hörner. Es sind Spiesshörner, d. h. dichte, wesentlich dem Augenhöhlendach aufgesetzte Knochenzapfen \*\*), die indessen an Stärke meist weit über das bei Gazellen übliche Maass

---

\*) Vergleiche z. B. die treffliche Abbildung von *Tragelaphus euryceros* in Proc. Zool. Soc. of London 1871. pag. 482.

\*\*) Einen Durchschnitt durch die Hörner von *Oreas* gibt Vrolik, *Horenpitten bij Antilopen*. Amsterd. 1853. Taf. II. Fig. 3.

hinausgehen. Eigenthümlich ist den Strepsiceren-Hörnern nur die Ausbildung einer bei Gazellen höchstens schwach angedeuteten (am ehesten bei *A. Kevella*), hier aber meist stark ausgeprägten vordern Kante, sowie die auch Gazellen gelegentlich zukommende (*A. cervicapra*) hier aber und namentlich bei Langhörnern oft weit, bis zur vollkommenen Schraubenform durchgeführte Spiraldrehung der Stirnzapfen\*).

Die Hörner erhalten dadurch mindestens an der Basis einen dreikantigen Durchschnitt mit mehr oder weniger ausgesprochener Abplattung und Ausbreitung des hintern Umfangs (*Tragelaphus*). Die Stärke der Hörner bedingt die Ausbreitung ihrer Wurzel über den Bereich des Orbitaldaches hinaus bis auf die cranialen Theile des Stirnbeins und kann, bei *Oreas*, bis zu einer schwachen Verschmelzung über der Mittellinie des Schädels führen. Dennoch entbehrt das Stirnbein ausgesprochener Frontalsinus und verhält sich in dieser Beziehung wie bei Gazellen und Hirschen. In sehr lehrreicher Weise unterscheidet sich dadurch die Stirnzone der strepsiceren Antilopen von derjenigen von *Anoa*, wo die Hornzapfen, bei aller äussern Aehnlichkeit nach Form und Lage (vergl. vor allem *Tragelaphus*), doch von den Frontalsinus ausgehen, wie denn auch die Frontalzone von Strepsiceren gazellenähnlich supraorbital bleibt und nur bei dem ungewöhnlich stark bewaffneten *Oreas* noch Neigung zeigt, sich wie bei *Anoa* über den Parietalschädel hinzulegen.

Auch die Supraorbitalöffnungen verhalten sich wie bei Gazellen. Gross und trichterförmig liegen sie unmittelbar vor den Hornwurzeln, auswärts des Ursprungs der vordern Hornkante.

Mit solchen Gazellen-Merkmalen combiniren sich indess andere, welche, den Gazellen fremd, nur Parallelen, und zwar weitgehender Art, unter den Hirschen finden. Dahin gehört vor allem das Gebiss. Trotz der meist bedeutenden Grösse der Thiere ist das Gebiss der in Rede stehenden Antilopen in hohem Grade brachyodont, bei kleinen Formen (*Tragelaphus*) auch in anderer Richtung reh-ähnlich, mit abgerundeten Zahnprismen und am Unterkiefer sogar wie bei Hirschen mit erst freistehenden accessorischen Säulchen in der Mitte und an dem Vorderende von hintern Milch- und von Ersatzzähnen.

Auch die Schneidezähne folgen durchaus dem Plan von Hirschen; sie sind sichelförmig gebogen und die Mittelzähne von überaus mächtiger Entwicklung.

---

\*) Beides, Kantenbildung und Schraubendrehung, sind bekanntlich bei vielen *Cavicornia* gelegentlich auftretende Merkmale von Hörnern, wie bei Ziegen, Schafen, Büffeln (*Anoa*), mehreren fossilen *Bibovina*, unter Antilopen auch bei *Portax* und selbst kleineren Arten der *Cephalophus*-Gruppe; wobei, was nicht zu übersehen, mindestens Kantenbildung nicht selten nur als sexuelle Verstärkung der Hornzapfen männlicher Thiere erscheint, wie bei *Anoa* und *Bibovina*.

Aber auch bei den mächtigen Gestalten von Kudu und Oreas hat das Backenzahngewebiss viel mehr Aehnlichkeit mit demjenigen grosser Hirsche als mit dem irgendwelcher säulenzähniger Antilopen oder Rinder. Der Körper der Zahnkrone, mag er auch in den Seitenwandungen seiner Prismen flach und scharfkantig werden, bleibt kurz, von den Wurzeln scharf abgesetzt und wie bei Hirschen von der Kaufläche gegen die Kronbasis hin deutlich verdickt, also das Gegentheil von Säulenform. Wie schwer müsste es einem Palaeontologen fallen, einzelne Oberkieferzähne von Kudu oder Oreas anders als auf Hirsche zu deuten! Selbst die untern Backenzähne dieser Thiere bleiben trotz ihrer seitlichen Compression und Coulissenstellung Hirschzähnen weit ähnlicher als den aus ganz cylindrischen Prismen aufgebauten Säulenzähnen von Rindern oder von grossen Thieren unter der Gensengruppe.

Die Vergleichung des Gesichtsschädels führt zu gleichen Ergebnissen. Neben niedrigem Alveolartheil zeichnet er sich aus durch auffällige Ausdehnung des Nasenrohrs, die weit über das Maass selbst der in dieser Beziehung am meisten hirschähnlichen Gazellen hinausgeht. Während bei den letztern die Maxilla an dem Gesichtsschädel nur einen kleinen Antheil nimmt, sind die Oberkiefer bei Strepsiceros und Oreas gerade in ihrem praedentalen Theil nach Art von Hirschen ungewöhnlich ausgedehnt und mit Einschluss des namentlich den Hirschen ähnlichen Zwischenkiefers wesentlich zur Bildung eines cylindrischen Nasenrohrs verwendet. Auch die Nasenbeine, statt wie bei Gazellen auf Stummel beschränkt zu sein, sind wie bei Hirschen lang gestreckt und an ihrem Vorderende mit tiefen Incisuren versehen. Nur die den Hirschen eigenthümliche seitliche Ausdehnung der Nasenbeine über den Ethmoidräumen fehlt den Strepsiceren gänzlich und bleibt wieder dem Gazellentypus treu.

Von Hirschen überaus verschieden ist auch das Thränenbein. Es erlangt hier nicht nur die grösste Ausdehnung unter Antilopen, sondern sogar unter Wiederkäuern, ja unter Säugethieren überhaupt. Langgedehnt und hoch, und von dem Jochbein an seinem untern Rand begleitet, bedeckt es einen grossen Theil der Wange und ist dabei vollkommen flach. Vollkommen verschieden von dem durch tiefe Gruben ausgehöhlten Thränenbein der Hirsche findet es seine nächste Analogie nur unter langköpfigen Formen der Gensengruppe (*Oryx*, *Catoblepas* etc.), unter langköpfigen Cephalophus-Arten (*Portax*) und langköpfigen Rindern (Büffeln). Dennoch lässt es, verschieden von allen diesen Thieren, eine mächtige Spalte über den Ethmoidräumen, aber von ganz anderer Gestalt als bei Hirschen, offen. Diese Lücke ist es auch, die dem Thränenbein der Strepsiceren seine richtige Parallele zuweist. Auch hierin verhalten sich die langköpfigsten Gazellen, insbesondere *Kobus*, den Strepsiceren am ähnlichsten. Insofern würde *Tragelaphus*, die kurzköpfigste unter den Strepsiceren, vielleicht als

eine Art Bindeglied zu den Gazellen gelten können, wenn auch die Aehnlichkeit nur durch Reduction der Verhältnisse seiner grössern Verwandten zu Stande gekommen sein möchte.

Auch die Verhältnisse der Augenhöhlen und der orbitalen Luftsinus der Thränenbeine von Strepsiceren folgen mehr dem Plan von Gazellen als von Hirschen. Die Augenhöhlen sind grösser, querer und tiefer in den Schädel hineingestellt und von den Schläfengruben wirksamer getrennt, die Thränenbeinsinus ausgedehnter als bei Hirschen.

Die Schädelachse ist bei kleinen Thieren (*Tragelaphus*) gestreckt, bei grossen im hintern Theil abwärts gebogen. Die Gehirnkapsel behält bei kleinen *Tragelaphus* (*Decula* etc.) zeitlebens eine für Antilopen ungewöhnliche Ausdehnung. Weit kürzer ist sie schliesslich bei *Oreas* und *Kudu* und zwar nicht nur desshalb, weil hier die Frontalzone sich viel stärker nach hinten ausdehnt, sondern auch durch eine Art Zusammenschiebung von hinten her, die zu der Befestigung des schweren Kopfes am Rumpf nicht ohne Beziehung sein wird. Wenigstens scheint die Verkürzung von Schläfe und Jochbogen, die quere Ausdehnung der Hinterhauptsfläche durch mächtige Muskelflügel und die damit parallelgehende quere Stellung der *Bullae osseae* und des Gehörgangs bei *Oreas* und *Kudu* im Gegensatz zu *Tragelaphus* darauf hinzudeuten. Bei beiden erstern ist hiedurch die Parietalzone sowohl auf der Oberfläche als in der Schläfe auf das Minimum unter Antilopen beschränkt, und Stirnbein mit Schläfenschuppe in ausgedehnte Berührung gebracht.

Die Hinterhauptsfläche von *Kudu* und *Oreas* wird hiedurch derjenigen schwerbewaffneter Hirsche ähnlich, während sie bei kleinen *Tragelaphus*arten wie bei schwachhörnigen Gazellen gebildet ist. Aber auch in diesem Schädeltheil sind Anklänge an Gazellen unverkennbar in der für Hirsche ungewöhnlichen, dagegen auch grossen Gazellen eigenthümlichen, beträchtlichen Aufblasung der *Bullae osseae*. Gerade bei *Oreas*, welches bei dem Blick auf die Wehr, die ihm durch Körpergrösse und Bewaffnung verliehen ist, am ehesten eines Schutzes durch besonders vervollkommenes Gehörorgan scheint entbehren zu können, erreichen die *Bullae* eine Grösse wie bei den anderer Schutzmittel scheinbar entbehrenden Zwergen unter den Antilopen, *Nesotragus saltianus*, *Cephalophus pygmaeus* u. s. f. Immerhin lehrt der Blick auf die riesigen Muskelapophysen, welche am Keilbein von *Oreas* direct unter dem Hornansatz zwischen die *Bullae osseae* eingeschaltet sind, dass doch auch letztere hier gutentheils im Begriff sind, in andere als bloss pneumatische Functionen einzutreten.

Das Ergebniss für Beurtheilung der Strepsiceren scheint hiemit dahin zu gehen: allem Anschein nach in dem Stamm der Gazellen wurzelnd, erweitern sie den Habitus

derselben, so weit ihn Schädelstructur verfolgen lässt, bis in den Horizont der Hirsche. Sie würden demnach eher als eine biologische Parallele, als ein directer Seitenzweig der letztern erscheinen.

Nicht ohne Interesse ist noch eine andere Analogie. Wiederholt musste zum Zweck der Vergleichung auf weit abliegende Gruppen von Wiederkäuern hingewiesen werden, namentlich auf Portax und Anoa. Tragelaphus, Portax, Anoa durch eine gemeinsame Linie zu verbinden, könnte nur sehr oberflächliches Urtheil versuchen wollen. Trotzdem ist es am Platze, des sonderbaren Umstandes eingedenk zu sein, dass Tragelaphus, eine Schlussform für Gazellen und gleichzeitig Ausgangspunkt für die Strepsiceren, die mächtigsten unter den Antilopen, — Portax, eine Schlussform der Cephalophusgruppe und gleichzeitig Wurzelgestalt für manche Rinder, und Anoa, ein Ausgangspunkt für gewisse Büffel, bei aller Verschiedenheit der Endpunkte, zu welchen sie führen, momentan einander mindestens nach Physiognomie sehr ähnlich sehen. Wie so viele andere Lehren lässt dies wohl zum Mindesten schliessen, dass die Natur bei ihrer Aufgabe, in ihren Lebewesen mit den vielen Veränderungen tieferer Schöpfungsgebiete Schritt zu halten, zu neuer Formbildung, in tieferem Sinne, als so weit es sich nur um letzte Ausschmückung handelt, nicht so leichtlich und nicht ohne sehr besondern Anlass sich entschliesst.

---

## Schlusswort zu der Uebersicht der Antilopen.

Bei Abschluss des Ueberblickes über den Schädelbau der Antilopen und die daraus zu entnehmenden Lehren für Beurtheilung ihrer genetischen Beziehungen widerstrebt es mir, das Ergebniss der bisher vorhandenen systematischen Darstellungen dieser Thiergruppe noch in besondern Vergleich zu bringen. War auch weder das Object meiner Darstellung, noch deren Endabsicht, in letzter Instanz Systematik, neu, so wird doch die im Obigen angewendete Methode und vielleicht auch der besondere Gedankengang, dem sie entsprang, einigermaassen auf Neuheit Anspruch machen können. Ich darf es also wohl dem Leser selbst überlassen, die Ergebnisse und den Grad ihrer Begründung mit den ältern, zumeist in Handbüchern und Catalogen niedergelegten Anschauungen zu vergleichen.

Anfechtung erwarte ich am ehesten gegen den Grad der zuerst von Vrolik in die morphologische Beurtheilung dieser Thiergruppe eingeführten Verwendung der relativen Ausdehnung der diploëtischen Schädelhöhlen. Man kann nicht in Abrede stellen, dass Merkmale der Art nur unter sehr bestimmten und nicht gerade leicht zugänglichen Bedingungen Früchte tragen können. Von vorn herein stehen sie in nächster Beziehung zu Wachsthum und Alter und entziehen sich allen directen Messungen. Nur unter dem Vorbehalt ausgedehnter Uebersicht und besonnener Vergleichung werden sie also Dienste von Werth leisten. Absolute Anhaltspunkte sind also davon unter keinen Umständen zu erwarten. So sehr Pneumaticität der Stirnbeine zum allgemeinen Plan der Cephalophusgruppe gehört, so fehlen doch Lufthöhlen der Hornzapfen kleinen Arten dieser Gruppe gänzlich. Sollte desshalb, weil es zunächst Ausdruck von relativem Alter, in individuellem oder in viel weiterem Sinne des Wortes ist, ein Verhältniss, das zu so ausserordentlichen Erfolgen in Form und Bau des Schädels führt, bei der Beurtheilung einer so formenreichen Thierfamilie ausser Betracht bleiben dürfen? Wie mir scheint, hiesse dies überhaupt auf den Dienst vergleichender Anatomie Verzicht leisten. Wie jedes andere, so wird also auch dieses Merkmal, aus

seinem Verbande mit dem physiologischen Ganzen, zu dem es gehört, herausgerissen, kurzsichtiger und künstlicher Benutzung seine Dienste versagen, möge es, mit natürlichem Maass und in wirklich vergleichender Weise gemessen, sich als noch so charakteristisch erweisen.

Aehnliches liesse sich fast von allen in der obigen Untersuchung verwendeten Hilfsmitteln sagen, von dem Betrag und der Art, in welcher Stirnbein, Scheitelbein und Occiput sich an der Bildung der Hirnkapsel betheiligen, wie man sah, fast dem wichtigsten aller der zum Auffassen und Vergleichen von Schädelstructur verwendeten Hilfsmittel; ebenso von der so vielfach benutzten Form und Rolle des Thränenbeins oder auch aller übrigen Knochen, bis auf die relative Stärke der so wenig als bei Turner übersehenen, nur hier stets in letzter Linie verwendeten Abdrücke von Muskelansätzen, Nervendurchgängen u. dergl.

So weit, als die allerdings nicht ohne viele Mühe und nicht knapp ausgewählten Materialien es gestatteten, war die Untersuchung mindestens von dem Bestreben geleitet, keinem einzigen Merkmal irgendwelchen absoluten Werth zuzuschreiben, sondern jedem erstlich neben den andern den Rang anzuweisen, den ihm seine physiologische Rolle verleiht; und zweitens, sie unter keinen Umständen selbst für das jeweiligen benutzte Object als definitiv, sondern immer nach dem relativen Werthe zu beurtheilen, den ihnen individuelles oder geologisches Alter zuweist. Confrontirung etwa von nur ausgewachsenen Schädeln männlicher Thiere hätte allerdings in den meisten Stücken weniger Arbeit erfordert und bestimmtere Ergebnisse geliefert. Die an nicht wenigen Species gewonnene Einsicht in die gewaltige Ausdehnung von Bahn, welche der Schädel bis zu den etwa verwirklichten Endpunkten durchläuft, schien mir indess hiervon nur sehr einseitige Aussage zu versprechen. Ob es gelungen, den Forderungen vergleichender Anatomie in vollem Sinne des Wortes, nach Raum und Zeit, also in morphologischer und in historischer Richtung gerecht zu werden und jedes zufällig vorliegende Object nur als einen Punkt in einer langen und über das Leben des Individuums unsäglich weit hinausragenden Entwicklungslinie zu betrachten, von der wir in der Regel weder den Anfang noch das Ende kennen, muss ich dem Leser zu beurtheilen überlassen. Nur darf ich an ihn die Forderung stellen, auch seinerseits inne zu sein, dass selbst an scheinbar so starren Dingen, wie trockene Knochen, momentaner Detail von Gestalt nur das Gepräge zur Ansicht bringt, in welchem individuelles Leben, das sich unter dem Vermögen von Erblichkeit und eigener Energie seit geologischen Zeiträumen fortsetzte, erstarrt ist.

Von umfassenden bisherigen Bemühungen, das gesammte Gebiet der Antilopen im Vergleich zu den übrigen Wiederkäuern an der Hand von Structur im Ganzen,

nicht nur mit Hülfe einzelner und mehr oder weniger willkürlich gewählter Kennzeichen zu überblicken, stehen wohl die Versuche von Sundevall\*) und von Turner\*\*) oben an. Damit geschieht den vortrefflichen und in meiner Arbeit wohl nach Gebühr gewürdigten neuern Untersuchungen von Sir V. Brooke kein Unrecht, da sie ja einstweilen nur aus Vorarbeiten zu einer Uebersicht bestehen, auf welche die Zoologie mit Recht sich freuen darf.

So lehrreich es sein könnte, die Ergebnisse dieser Arbeiten mit den hier gewonnenen in Vergleich zu bringen, so darf ich dies doch dem etwaigen besondern Interesse des Lesers überlassen. Er wird bald gewahr werden, wie Sundevall bei aller Trefflichkeit der Principien, die er in seiner ausgezeichneten Einleitung niederlegt, denselben doch in der Anwendung wenig treu geblieben ist, wenn er so vielen der Beschaffenheit der Haut entnommenen Merkmalen schliesslich doch den ersten Rang einräumt. Auch zugegeben, dass die Haut das für die Beziehungen des Thieres zu seiner Umgebung empfindlichste Organ sei, so wird sie also doch von vornherein das wandelbarste aller sein, und über Verwandtschaft von Thieren unter sich Winke von vollkommen anderem Rang geben als Organe von beharrlicherer Art. Abgesehen davon, dass eine Betrachtung, welche eine Scheidewand zwischen lebenden und fossilen Thieren nicht anerkennt, von vorn herein sich an Organe von längerer Andauer als die Haut halten muss, wird doch die Beschaffenheit von besondern Hautstellen, wie Fusssohlen, Schnauze und dergleichen, möge ihnen noch so grosse biologische Wichtigkeit zukommen, am Thier gerade das Metabolische, das Skelet dagegen das Träge und Zähne von Structur verrathen. Ueber den relativen Rang, der innerhalb des selbstverständlichen Rahmens allgemeiner Erscheinung den besondern Merkmalen von Skelet, Gebiss, Haut u. dgl. zuzuweisen ist, wird man sich also bei systematischen Arbeiten zum Voraus Rechnung ablegen müssen.

Viel mehr Verwandtschaft besteht bezüglich der Methode zwischen dem von mir gemachten Versuch und den Arbeiten von Turner. Wenn die Ergebnisse dennoch wenig zusammenstimmen, so wird die Ursache ebenfalls schon bei oberflächlicher Vergleichung an den Tag treten. Sie beruht einmal in der verschiedenen Werthschätzung eines und desselben Merkmals und, was mehr ist, in der Verschiedenheit der Hand-

---

\*) C. Sundevall, Method. Uebersicht der wiederkäuenden Thiere. Uebersetzt aus dem Schwedischen von Fr. Hornschuch. Greifswald 1848.

\*\*) John Turner in vielen zerstreuten Aufsätzen in den Proceed. Zool. Soc. Zusammenstellung der Antilopen in Part. XVIII 1850. On the generic subdivision of the Bovidae or hollow horned Ruminants.



habung desselben. Ich glaube nicht der Unbilligkeit mich schuldig zu machen, wenn ich gestehe, in der Methode von Turner physiologische Leitung zu vermissen; Merkmale des verschiedensten Ranges, von so erheblichen wie Zahnbau bis zu so launenhaften wie kleine Muskelansätze (die Höcker des Basisoccipitale, die Form der Gehörblase) dienen ihm als gleichwerthige und directe Maassstäbe, während mir das Bedürfniss vorschwebte, solchen Verhältnissen den ihnen gebührenden physiologischen Rang zuzuweisen.

Die vielfache Belehrung, die ich in Bezug auf Détail aus den überaus fleissigen Arbeiten des langjährigen Vorstehers der vollständigsten dermalen bestehenden Museumsammlung für Antilopen entnommen habe, wird der mit der Litteratur vertraute Leser leicht gewahr werden. Geringere Unterstützung konnten diese Arbeiten, welche unter dem Titel *Ungulata furcipes* auch die Familie *Equidae* einschliessen \*), in der von mir zu Grund gelegten vergleichend-anatomischen Absicht bieten.

Sache fernerer Prüfung durch Anatomen, die sich diesem für wissenschaftliche Einsicht so neuen Gebiete gegenüber in günstigerer Lage befinden als ich, wird es nun sein, zu untersuchen, ob die hier zu Grund gelegten Gesichtspunkte, leider die einzigen, mit welchen sich Palaeontologie verständigen kann, sich als fruchtbar erwiesen haben. Das Criterium wird einfach sein. War der Gesichtspunkt richtig gewählt und richtig benützt, so sollte das Ergebniss doch in den wichtigen Punkten mit den von andern Ausgangspunkten gewonnenen sich vertragen können. Neben dem hier gewählten wird der zoologische oder physiographische den nächsten Rang beanspruchen. Immerhin mit dem sehr wesentlichen Vorbehalt, dass man der Beweglichkeit seiner Sprache wohl eingedenk sei und im Auge behalte, dass äusseres Gewand ein und dasselbe tiefere Gerüste zu Erscheinungen von sehr verschiedenem Anblick umzukleiden vermögen. Unbefangener, weil von Tagesverhältnissen unabhängige Aussage wird schon zu erwarten sein von dem geographischen Gesichtspunkte. Demselben ist bereits in der jetzt vorliegenden Untersuchung, so weit meine Hilfsmittel dies erlaubten, die genügende Stelle eingeräumt worden, und das Verdikt, das von dieser Seite auf die gewonnenen Gruppierungen fiel, scheint nicht zu Ungunsten unserer Methode zu sprechen.

Nicht nur, dass Dissonanzen zwischen Gestaltung und Verbreitung, wie sie manchen bisherigen Darstellungen anhaften, spärlicher an den Tag traten; sondern gerade

---

\*) „*Fam. Equidae*: Two middle toes soldered into one; covered with a single hoof, lateral toes subequal“ J. E. Gray, Catal. of the spec. of Mammalia in the Brit. Museum. Part. III. *Ungulata furcipes*. London 1852. Pag. 262.

bezüglich mancher der sonderbarsten Verhältnisse schienen sich Morphologie und Geographie die Hand zu reichen oder doch reichen zu können: Allerdings nur unter Beihülfe des wichtigsten, d. h. des palaeontologischen Gesichtspunktes.

Wie sehr ich die Pflicht fühlte, auch diesen zu betreten, konnte schon der Titel meiner Abhandlung andeuten. Nichtsdestoweniger muss ich noch darauf verzichten, dieser Aufgabe zu folgen. Trotz unablässiger Aufmerksamkeit auf dieses Gebiet und wiederholter Bereisung der dafür wichtigen Sammlungen würde ich kaum viel Bestimmteres mittheilen können, als was bereits aus der freilich sehr zerstreuten Literatur herauszulesen wäre.

Dies hier zu einer Compilation zu sammeln, oder gar die so vielfach unsicheren Angaben über fossile Antilopen einer Kritik zu unterstellen, kann also nicht meine Absicht sein. Ich begnüge mich mit einer kurzen Andeutung, in wie fern gut constatirte palaeontologische Thatsachen etwa unsern Gesichtskreis über den Bereich der Gegenwart hinaus zu erweitern versprechen.

Das Gebiet, auf welchem Antilopen von anderer Gestaltung als die heutigen bisher zur Kenntniss gekommen sind, beschränkt sich fast ausschliesslich auf die pliocenen und miocenen Ablagerungen von Süd- und West-Europa und von Indien. Auf pleistocenem Schauplatz begegnen wir nur Andeutungen von weiterer geographischer Verbreitung von Formen, die man kaum berechtigt scheint von den heutigen zu trennen.

Die ergiebigste Fundgrube fossiler Antilopen ist bekanntlich diejenige von Pikermi bei Athen, deren Inhalt in so ausgezeichnete Weise durch A. Gaudry beschrieben worden ist. Sie erscheint um so wichtiger, als sich diese Fauna einmal bis nach Italien, Süd-Frankreich und Spanien, andererseits bis nach Ungarn erstreckt und wohl auch einst den Verband, sei es mit den ältern Ablagerungen von Sansan, wie mit den jüngeren der Auvergne, aufdecken wird, die einstweilen beide in viel unvollständiger Weise, theils durch Lartet und Gervais, theils durch Aymard und Pomel bekannt geworden sind.

**Pikermi.** Die grosse Vorsicht, mit welcher sich Gaudry trotz des überaus reichen Materiales, das seiner Darstellung der Antilopen von Pikermi zu Grunde lag, über die Beziehungen derselben zu heutigen Antilopen äussert, legt jedem weitem Urtheil in dieser Richtung gewichtige Schranken auf. Wenn ich dennoch versuche, theils an der Hand jener Darstellung, theils auf dem Boden eigener Anschauung der Objecte die Antilopen von Pikermi dem Gestaltungskreis heutiger Antilopen so weit anzunähern oder einzuverleiben, als dies im Lichte der obigen Untersuchung erlaubt erscheinen mag, so begnüge ich mich mit folgenden Andeutungen:

1. *Gazella brevicornis* Gaudr. trägt nebst der ihr offenbar nahestehenden *Antilope deperdita* Gerv. aus Frankreich und Italien die allgemeinen Merkmale heutiger Gazellen in so ausgesprochener Weise an sich, dass man sogar geneigt sein möchte, eine besondere Art derselben, die in West-Africa lebende Antilope Dama als den nächsten Erben der fossilen Form zu bezeichnen.

2. *Palaeotragus Roueni* Gaudr. Trotz trefflicher Erhaltung der Ueberreste dieses Thieres ist es sehr schwer, dasselbe einer jetzt lebenden Antilopenform anzuschliessen. Die Gehirncapsel geht an relativer Ausdehnung über das Maass heutiger Gazellen hinaus bis zu demjenigen von Portax und Tetraceros; auch überdies schliesst das Fehlen von Ethmoidlücken und das hirschähnliche Gebiss *Palaeotragus* von den Gazellen aus. Andererseits stimmt aber der Einsatz und die Form der Hörner in keiner Weise mit irgend einem Glied der heutigen Cephalophus-Gruppe. Sie entspricht am ehesten derjenigen von Aegoceros (*leucophaeus*). Am zutreffendsten scheint *Palaeotragus* in heutiger Sprache charakterisirt zu sein, wenn man ihn als eine Form von Aegoceros mit noch brachyodontem Gebiss bezeichnen würde.

3. *Tragoceros amaltheus* Gaudr. nebst *Tragoceros Valenciennesi* Gaudr. und der von Gaudry nicht mit einem Speciesnamen bezeichneten Form Planche LII. Fig. 1. bin ich geneigt, mit *Palaeotragus* und insofern ebenfalls mit der heutzutage Africa angehörigen Gruppe von Aegoceros und Damalis in sehr nahe Beziehung zu bringen. Jedenfalls ist *Tragoceros* von vornherein von den Ziegen auszuschliessen. Das Gebiss, namentlich die Schneidezähne, ferner das Fehlen des Frontalwulstes von Ziegen und die direct supraorbitale Lage der Hörner legen dagegen Protest ein, während diese Verhältnisse und namentlich auch die auffällige Form des Horndurchschnittes bei Damalis (*pygarga*) Analogien finden.

4. *Palaeoryx Pallasii* und *parvidens* Gaudr. werden mit ziemlicher Bestimmtheit als brachyodonte Vorläufer des heutigen Genus Oryx betrachtet werden dürfen. Die kurze Hirncapsel und der sehr kurze und rasch zugespitzte Hirnschädel stimmt mit Oryx mehr überein als mit dem von Gaudry in Vergleich gezogenen Aegoceros.

5. *Palaeoreas Lindermeyeri* Gaudr., von der heutigen Gestalt von Oreas nur in unwesentlichen Dingen abweichend, vertritt die jetzigen Strepsiceren. Vielleicht ist denselben auch *Antidorcas Rothi* Gaudr. anzuschliessen.

**Frankreich** besitzt in *Antilope deperdita* Gerv., sowie in *Tragoceros amaltheus* und *Palaeoreas Lindermeyeri* von Mont Léberon eine Anzahl von Ausläufern der Fauna von Pikermi. Die erstere unterscheidet sich nach den von mir untersuchten Ueberresten von *Gazella brevicornis* höchstens durch etwas weitere Distanz der Hörner. Dasselbe gilt wohl auch von *Antilope recticornis* Gerv. (*Cordieri* Christ.) und

*Antilope boodon* aus Concud, die mit der unbenannten Form von Pikermi (Gaudry Pl. XLVIII. Fig. 1) nahe verwandt zu sein scheinen.

Weit weniger bestimmt darf das Urtheil lauten über die Antilopen von Sansan, *Antilope sansaniensis*, *clavata* und *Martiniana* Lartet. - Nach der Bemerkung von Lartet \*) vereinigt die erstere ein vertikal gestelltes und gemsenähnliches Gehörn mit rehähnlichem Gebiss. Nach den von mir im Jardin des Plantes untersuchten Ueberresten scheinen *A. clavata* und *Martiniana* mindestens im Gebiss einander überaus nahe zu stehen. *Antilope clavata* scheint in identischer oder nur wenig veränderter Gestalt in der Molasse der **Schweiz** aufzutreten, wo sie von Dr. Biedermann den Namen *Antilope cristata* erhalten hat \*\*). Die kleinen conischen Hörner sind hier etwas nach hinten gerichtet und ebenfalls mit rehähnlichem Gebiss combinirt, so dass man am ehesten geneigt sein möchte, in diesen mittelmioenen Antilopen brachyodonte Vorläufer der heutigen Gemen zu erblicken.

Eine sehr späte kleine Antilopenfauna findet sich endlich noch sogar in den pleistocenen vulkanischen Tuffen der Auvergne begraben. Pomel zählt von dort drei Arten auf \*\*\*), deren Namen besser der Vergessenheit überliefert würden. Eigenes Urtheil kommt mir darüber nur zu auf dem Boden der Beobachtungen, die ich theils in den Museen von Puy-en-Velay und von Clermont-Ferrand, so wie an den bessern Materialien im Besitz des Museums von Basel, sowie denjenigen des Britischen Museums machen konnte, das bekanntlich die gesammte Sammlung von Bravard, sowie einen guten Theil der Sammlung des Abbé Croizet enthält.

Die Materialien des Basler-Museums stammen von dem Volcan Coupet in der Nähe von Le Puy zwischen Langeac und Crespiniaac und bestehen ausser vortrefflichen Ueberresten von *Equus fossilis* oder *Stenonis*, die ich anderswo des Einlässlichen beschrieben †), und einer Anzahl von Hirscharten, aus Skeletstücken und Zahnreihen von Antilopen, unter welchen zwei Formen zu unterscheiden sind; eine kleinere, zu lückenhaft erhalten, um etwas Brauchbares darüber auszusagen, und eine grössere, die durch recht gute Reste vertreten ist. Sie entspricht der auch aus andern Stellen der Limagne in den Museen der Auvergne ziemlich reichlich erhaltenen *Antilope torticornis* Aymard. (Im Britischen Museum tragen Ueberreste von Puy-

\*) Lartet, Notice sur la colline de Sansan 1851. Pag. 36.

\*\*) W. G. A. Biedermann, Petrefacten aus der Umgegend von Winterthur. Viertes Heft 1873. Taf. VIII und IX.

\*\*\*) Pomel, Catalogue des Vertébrés fossiles. 1833. Pag. 112.

†) Beiträge zur Kenntniss der fossilen Pferde 1863, pag. 117.

de-Dôme, die zu derselben Form gehören, von Bravard's Hand den Namen *Antilope arvernensis*.) Die Hörner, zweikantig und schraubenförmig gedreht, weisen auf Thiere aus der Familie der heutigen Strepsiceren, und zwar würde die fossile Form nach der Lage der Hörner unmittelbar über den Augenhöhlen der heutigen Kudu-Antilope weit näher stehen als dem Genus *Oreas* oder *Tragelaphus*. Immerhin weisen die Ueberreste aus Auvergne auf ein Thier von nur etwa zwei Drittheil Grösse der Kudu-Antilope und mit viel kürzern Hörnern (Hornlänge bei einem männlichen Kudu längs der Spirale 780 Mm., bei einem starken Exemplar von *Ant. torticornis* 270 Mm.). Während ferner bei Kudu und *Oreas* die vordere oder obere Hörnkante die stärkere ist, ist die hintere oder untere stärker bei *Antilope torticornis*, ähnlich wie bei *Tragelaphus*.

Die Hörner stehen direct auf der Orbita, also viel weiter vorn als bei *Oreas*, und in ähnlicher Lage wie bei Kudu und bei *Tragelaphus*. Auch ihre Richtung ist eine ganz andere als bei *Oreas*. Sie erheben sich ziemlich steil über das Profil des Schädels und divergiren unter sich in stärkerem Winkel als bei *Oreas*; zudem ist ihre Achse nicht gerade gestreckt, sondern beschreibt, abgesehen von der schwachen Schraubenwindung, eine nach aussen gerichtete, d. h. nach der Mittellinie des Körpers convexe Curve. Lufträume erstrecken sich bis in ihre Wurzel, allein von da an ist der Hornzapfen dicht, mit etwas lockerem Gewebe in der Achse. In all diesen Merkmalen entspricht die fossile Form dem heutigen Genus *Tragelaphus* in dessen mittellang behornten Arten. (*Tr. sylvatica* etc.)

Das Gebiss von *Antilope torticornis* ist im Vergleich zu der Körpergrösse des Thieres kurz aber ungewöhnlich massiv, und überdies verstärkt durch accessorische Säulchen an oberen und durch quere vordere Compressionsfalten an unteren Molaren, wie sie sich an heutigen Antilopen etwa bei der *Damalis*-Gruppe der Gamsen und bei einigen Gazellen (*cervicapra*, *Kobus* etc.), aber auch unter Strepsiceren bei *Tragelaphus* finden. Es ist stärker und dabei niedriger als etwa bei der Gruppe der Gazellen und bei den heutigen grossen Strepsiceren, allein steht demjenigen des Genus *Tragelaphus* sehr nahe. Alles das lässt kaum einen Zweifel, dass die fossile Antilope der Auvergne der Gruppe der Strepsiceren angehöre und ein pliocenes Verbindungsglied zwischen dem miocenen Genus *Palaeoreas* und dem heute noch in Africa reichlich vertretenen Genus *Tragelaphus* bilde.

Die Antilopenüberreste, die bisher aus **Spanien** bekannt geworden sind, gehören, wie schon bemerkt worden ist, zu der Fauna von Pikermi \*).

---

\*) *Antilope boodon* Gervais: Bulletin Soc. Géol. de France. 2<sup>e</sup> Sér. X. 1853. P. 157. Pl. V.

Merkwürdig musste Angesichts der weiten Zerstreung fossiler Antilopen über Süd-Europa das bisherige Schweigen der Litteratur über Antilopenreste in **Italien** erscheinen. Die Durchsicht der dortigen Museen hat schon mir und später auch meinem Freunde Dr. Forsyth Major gezeigt, dass es nur am Suchen fehlte. Allerdings scheint gerade die an Säugethieren reichste Fauna in Italien, diejenige von Val d'Arno, keine Antilopen zu enthalten, als ob schon damals Hirsche, die ja in Val d'Arno reichlich vertreten sind, und Antilopen sich ausgeschlossen hätten. Nichtsdestoweniger fehlt es an Antilopen, und zwar von tertiären bis in sehr recente Ablagerungen, in Italien keineswegs, und wie zu erwarten schliessen sie sich in Bezug auf Form denjenigen des übrigen Süd-Europa des engsten an.

Am bestimmtesten wird das Urtheil ausfallen dürfen für einen Schädel, den ich bei einem meiner Besuche im Museum von Pisa auffand. Als Fundort ist angegeben eine Knochenbreccie von Olivola bei Massa (Provinz Lunigiana), aus welcher dasselbe Museum auch Schweinszähne enthält, die sich von denjenigen des heutigen Wildschweins nicht unterscheiden, und Pferdeзähne, die in Bezug auf Détail ihres Baues zwischen *Equus Stenonis* und *Equus Caballus* stehen. Was den Antilopenschädel betrifft, so vermuthete ich, dass er aus älterem Terrain in diese Breccie gerathen sein möchte. Nach Farbe und Erhaltung sieht er durchaus aus wie die Fossilien aus Pikermi, was von den Schweins- und Pferdeзähnen nicht gesagt werden kann.

Ich habe ihn in halber Grösse abgebildet in Fig. 13. 14. Taf. VII. Er ist offenbar durch äussern Druck abgeplattet und also in der Form etwas entstellt. Nichtsdestoweniger weist die Art des Horneinsatzes sofort auf das Genus *Oryx*. Die Hörner sind gerade gestreckt und cylindrisch und stossen an ihrer Wurzel in der Sagittalnath nahezu zusammen wie bei *Oryx Gazella*. Sie verlaufen in der Flucht der Stirnfläche wie bei den lebenden Arten von *Oryx* und der fossilen Species *Palaeoryx Pallasii* von Pikermi. (Steilere Stellung kommt ihnen zu bei *Palaeoryx parvidens*.) Sehr auffallend ist die beträchtliche Grösse des Thränenbeins; es übertrifft an relativer Ausdehnung nicht nur dasjenige von *Oryx Gazella*, sondern auch das schon bedeutendere von *Oryx Beisa* und kommt so an Betrag dem noch bedeutenderen von *Palaeoryx* von Pikermi gleich, wo überdies auch, wie bei dem Fossil von Olivola, die Ethmoidlücke auf eine schmale Spalte reducirt ist. Sehr bezeichnend ist überdies die starke Knickung des Schädelprofils; die Parietalzone fällt nahezu in rechtem Winkel von der Stirnzone ab. Auch dies stimmt nicht mit der jetzigen Schädelform von *Oryx* überein, wohl aber mit derjenigen des fossilen Genus *Palaeoryx*.

Ich halte es daher für durchaus gerechtfertigt, die Antilope von Olivola mit dem zuerst in Pikermi beobachteten Genus *Palaeoryx* Gaudry zu vereinigen, wenn sie auch

an Grösse und an Stärke der Bewaffnung hinter den beiden Arten von Pikermi zurückbleibt. In Erinnerung an den mir hochverehrten Vorsteher der Sammlung von Pisa gebe ich ihr den Namen *Palaeoryx Meneghinii*.

Aber auch an Formen, wie sie die obertertiären Schichten von Süd-Frankreich und Spanien aufweisen, scheint es unter den fossilen Antilopen in Italien nicht zu fehlen. Aus unterem Pliocen von Casino bei Siena hat F. Major in neuerer Zeit *Antilope Cordieri Christol*, also eine Form von Montpellier, und *Antilope Massoni Major* aufgezählt, von welcher er vermuthet, dass sie der bereits aus Alcoy bekannten *A. boodon* Gerv. sehr nahe stehen möchte \*).

Selbst in Knochenhöhlen aus relativ junger Zeit, wo Vermengung von Fossilien sehr verschiedenen Alters weniger wahrscheinlich erscheint als in Knochenbreccien, finden sich in Italien noch Ueberreste von Antilopen. Ich habe davon schon bei früheren Anlässen Meldung gemacht. Erstlich die im Museum von Turin aufbewahrten Ueberreste aus Knochenhöhlen der Insel Pianosa im toskanischen Archipel, begleitet von solchen von Bos, Bubalus, Cervus, Equus Stenonis, Ursus spelaeus \*\*). Von den Ueberresten, die ich auf Antilopen glaubte deuten zu dürfen (wohl bemerkt nur Skelettheile und Zähne, keine Schädelknochen, noch Hörner), kann ich freilich nur aussagen, dass sie auf Thiere von zwei verschiedenen Grössen hinzuweisen scheinen. Zweitens, ebenfalls in Turin, die noch spärlicheren Ueberreste aus einer sehr jung aussehenden Knochenbreccie von Verezzi an der ligurischen Küste \*\*\*).

Weiter nach Norden und selbst über die Alpen hinaus reichen in Europa Antilopenreste nur in sehr spärlichen, wenn auch unzweideutigen Spuren. Theils sind es Vertreter der Fauna von Pikermi, wie *Tragoceros amaltheus* und *Antilope brevicornis*, die Süss in der Nähe von Wien angekündigt hat †), theils solche derjenigen von Sansan, wie die schon erwähnte *Antilope cristata Biedermann* aus der nördlichen Schweiz. Um so auffälliger erscheinen die noch weiter nach Norden, bis nach

\*) F. Major Considerazioni sulla Fauna dei Mammiferi pliocenici e postpliocenici della Toscana. Atti della Soc. Toscana di Sc. naturali 1877, pag. 47.

\*\*) Versuch einer natürlichen Geschichte des Rindes I. 1867. Pag. 89. 97.

\*\*\*) Ueber Pliocen und Eisperiode auf beiden Seiten der Alpen 1876. Pag. 69.

Sehr unsicher erscheint mir vor der Hand die Antilopenatur eines Schädels aus einer Knochenhöhle bei Caserta, den Herr Major in dem Museum von Neapel aufgefunden hat. Nach der mir vorliegenden Photographie, die ich Herrn Dr. Major verdanke, kann ich nur sagen, dass ich unter heutigen Antilopen keine Gruppe mit ähnlichem Gebiss zu nennen wüsste. Es wird rathsam sein, genau zu prüfen, ob der Schädel nicht etwa von einem Thiere aus dem Geschlecht der Rinder stammen möchte.

†) Sitzungsberichte der k. Akad. der Wissenschaften in Wien. XLVII. 1. Abth. Pag. 312.

**Deutschland** vorgeschobenen Posten von Antilopen ganz anderen Gepräges, von welchen ich ebenfalls schon bei anderem Anlass Erwähnung gethan habe. Dies sind die Ueberreste aus den Bohnerzen von Schwaben, zwar nur vereinzelte Zähne, und insofern vermuthlich nicht auf ursprünglicher Fundstätte, aber ihrer Erhaltung nach doch auch nicht aus weiter Ferne verschleppt. Höchst charakteristisch ist der freilich einzige Zahn aus den Bohnerzgruben der Umgebung von Ulm, den ich unter dem Namen *Hippotragus Fraasii* beschrieben und abgebildet habe\*). Weniger genaues Urtheil durfte ich mir erlauben über die Zähne, welche schon vor weit längerer Zeit von Jäger aus Bohnerzgruben von Mälchingen auf der württembergischen Alp beschrieben und abgebildet worden sind und die ich zur einstweiligen Verständigung mit dem allerdings wenig sagenden Namen *Antilope Jägeri* bezeichnet habe\*\*). Immerhin hege ich nach Untersuchung der Originalien nicht den mindesten Zweifel, dass sie wirklich Antilopen angehören, und am ehesten würde ich sie denjenigen grosser Strepsiceren, namentlich *Oreas*, nahe stellen.

Ein zweites und offenbar in Bezug auf geographische Geschichte der Familie nicht minder wichtiges Gebiet für fossile Antilopen als Süd-Europa liefert **Indien**. Die bisherige Kunde hierüber beruht auf den für Antilopen leider nur sehr provisorischen Angaben des trefflichen Falconer\*\*\*). Aus eigener Anschauung der im Britischen Museum befindlichen Fossilien von dort kann ich ebenfalls nur Weniges beifügen, da es mir an Zeit gebrach, meine Untersuchung derselben mit der nöthigen Sorgfalt über das Gebiet der Rinder auszudehnen. Das am besten erhaltene Stück von indischen fossilen Antilopen ist jedenfalls der von Murchison abgebildete Schädel von *Antilope palaeindica* Falc. aus den sivalischen Hügeln†). Baker findet darin eine Aehnlichkeit mit den ihm bekannten Arten des Genus *Aceronotus* (*lunatus* und *Caama*). Meine eigene Anschauung stimmt damit nur so weit überein, als ich ihn der grossen Gruppe der Gemsen im Sinne der obigen Abhandlung zutheile. Ausgeschlossen ist jedenfalls die Gruppe der Strepsiceren, sowie diejenigen von *Oreotragus* und von *Cephalophus* mit Einschluss von *Portax*. Auch die Gazellen fallen ausser Betracht, da bei ihnen der ganze Gesichtsschädel durchweg kürzer, der Gehirnschädel aber länger ausfällt.

\*) Versuch einer natürlichen Geschichte des Rindes. Pag. 89. Taf. I. Fig. 7. 8.

\*\*) Jäger, Fossile Säugethiere Württembergs 1839. Pag. 22. Taf. V. Fig. 43—54. Rütimeyer natürl. Geschichte des Rindes. Pag. 89.

\*\*\*) Descriptive Catalogue of the fossil Ruminants of Vertebrata from the Sevalik Hills etc. Calcutta 1859.

†) Palaeontological Memoirs. Vol. I. Pag. 290. Pl. 23.



Auch die Thränengruben und die Form und Stellung der Hörner entspricht in keiner Weise den Gazellen. Nichtsdestoweniger bildet auch *Acronotus* durchaus keine zutreffende Parallele, wie durch mancherlei sehr bedeutsame Verschiedenheiten, vor Allem in dem Bau der Gehirnkapsel und in ihrem Verhältniss zu dem Gesichtsschädel leicht zu belegen wäre. Eine sorgfältige Vergleichung wird wohl ohne Schwanken das Genus *Damalis* als dasjenige herausstellen, welches unter allen heutigen Antilopen dem Plan von *Antilope palaeindica* am nächsten steht. Die gesammte Physiognomie des Schädels, sowie deren Détail, die Beziehung von Gesichts- und Gehirnschädel, die Form des Frontalwulstes und der Hörner in Durchschnitt, Einpflanzung und Richtung, die Gestaltung des Gesichtsschädels, der Thränengruben und Augenhöhlen, des röhrenförmig vortretenden Nasenrohrs sprechen alle in diesem Sinne.

In geographischer Rücksicht mag allerdings eine so nahe Beziehung zwischen dem indischen Fossil und einem heutzutage auf Africa beschränkten Genus bizarr genug erscheinen. Allein diese Kluft wird durch die Erinnerung um Vieles gemildert, dass auch das europäisch-miocene Genus *Tragoceros* dem Gepräge des heutigen Genus *Damalis* am nächsten zu stehen scheint.

Durchaus kein Zweifel über etwaige Beziehung zu heutigen Formen kann bezüglich einer andern fossilen Antilope Indiens walten, die aus Nerbudda stammt und im Britischen Museum in zwei Stücken, No. 36851 und 36853 erhalten ist, und wovon ich das erstere und vollständigere in Eindrittelgrösse in Fig. 7. 8. Taf. VI abgebildet habe \*). Beides sind hintere Schädelhälften. 36851 ist etwas stärker (Breite aussen an den Hornwurzeln 135 Mm. (117 und 135 Mm. bei zwei Schädeln vom lebenden Nylgau im Basler Museum)) und noch mit fast vollständigen Hornzapfen versehen. Das andere Stück ist kleiner und die Hornzapfen abgebrochen; vielleicht konnte es einem weiblichen Thier angehört haben. Nach Grösse und nach allen Einzelheiten des Baues stimmen diese Schädel so sehr mit demjenigen des jetzigen Nylgau überein, dass man vor Allem nicht das mindeste Bedenken tragen kann, sie mit dem nämlichen Genus-Namen zu bezeichnen. Immerhin wird es nach den in der Litteratur bisher üblichen Principien passend sein, der Nerbudda-Form einstweilen einen besondern Speciesnamen zu geben, wofür ich nach Falconer's Sitte den Namen **Portax namadicus** wähle. Die Unterschiede zwischen den fossilen und den lebenden Schädeln beschränken sich darauf, dass an den erstern die Hörner den Augenhöhlen nähergestellt

---

\*) Die von Falconer (*Palaeontolog. Memoirs* Pag. 289) erwähnten Fossilien No. 569 und 573 des Museums der Asiatischen Gesellschaft von Bengalen dürften leichtlich mit denjenigen des Britischen Museums in sehr enger Beziehung stehen.

sind, und dass bei ihnen die dem Genus *Portax* eigenthümliche parietale Facette der Schädelloberfläche merklich grösser ist als bei der noch lebenden Form. Ferner ist die Occipitalfläche vertikaler gestellt und das Hinterhauptsgelenk massiver als bei dem Nylgau. Für die geologische Geschichte des Genus könnte vielleicht aus ersterem Umstand auf eine einst grössere quere Ausdehnung der Parietalzone im Vergleich zur Frontalzone geschlossen werden. Wichtiger und sicherer ist mindestens der Nachweis, dass die Form des Nylgaus so wenig nur heutigen Ursprungs ist, als so manche andere Form von Antilopen unserer Tage.

Ich denke des gänzlichen absehen zu können von einem dritten Bezirk, der angeblich fossile Antilopen beherbergen sollte, der **westlichen Hemisphäre**, welche heute noch, und zwar nur in ihrer nördlichen mit der alten Welt in so erkennbarem Verband stehenden Hälfte, nur zwei weit von den Formen der alten Welt verschiedene Gestalten von Antilopen aufweist, die oben beschriebene Gemse *Mazama* und die von ihren altweltlichen Verwandten weit mehr abweichende gabelhörnige Gazelle *Dicranoceros*.

Nur aus litterarhistorischen Gründen erwähne ich den von Leidy unter dem Namen *Cosoryx furcatus* aus dem Pliocen von Dakota aufgezählten Wiederkäuer. Seit der nähern Bekanntschaft mit den vermuthlichen Stammformen der Hirsche in dem europäischen Miocen kann wohl kein Zweifel bestehen, dass *Cosoryx* der in Europa durchaus nicht spärlich vertretenen Hirschgestalt angehören werde, die in neuester Zeit von A. Gaudry den Namen *Procervulus* \*) erhalten hat, und über welche ich vielleicht in Kurzem an der Hand vortrefflicher Materialien, die mir darüber aus der schwäbischen Molasse vorliegen, Näheres mittheilen kann.

Noch weniger Gewicht für einstige Ausdehnung von Antilopen über Amerika messe ich einstweilen der Anmeldung einer fossilen Antilope, *A. maquinensis* von Lund \*\*) aus der südamerikanischen Höhle von Lagoa do Sumidouro, und des sogenannten *Leptotherium* aus der Höhle von Anna Felicia in Bolivia bei. Bis auf bessere Belehrung wird man besser thun, diesen Namen nur apokryphen Werth zuzuschreiben.

---

\*) Les enchainements du Monde animal. 1878. Pag. 87.

\*\*) P. W. Lund, Blik på Brasiliens Dyreverden. Kjöbenhavn. 1841. Pag. 86 u. f.

Im Anschluss an die oben gegebene Uebersicht von Schädelstructur an heutigen Antilopen ist es kaum gestattet, die hier gesammelten Nachrichten über fossile Arten in anderem als in zoogeographischem Sinn zu verwerthen. Besteht doch deren Aussage wesentlich in der Aussicht, dass die vorhandenen so gut wie die mit Sicherheit noch zu erwartenden Thatsachen alte Wurzeln für die Mehrzahl der uns heutzutage bekannten Formen zum Vorschein bringen werden.

Das Wenige, was sich schon jetzt in Ergebnisse formuliren lässt, beschränkt sich etwa auf Folgendes:

Im Allgemeinen erscheinen bis jetzt Antilopen nicht in älteren als in miocenen Schichten. Auch die Vorkommnisse in den Böhmerwäldern Deutschlands werden hiegegen keine Einwendung bilden, und selbst in solchen sind sie wenig über das Gebiet der Alpen hinaus nach Norden verbreitet.

Die ältesten und nördlichsten Formen scheinen in allgemeinem Habitus den heutigen nördlichsten Vorposten der Antilopen, den Gamsen, freilich in weiterem als dem bisher üblichen Sinne des Wortes anzugehören. Selbst die gegenwärtig den Tropen Afrika's angehörige Physiognomie von *Damalis* und *Aegoceros* ist in älterer Tertiärzeit bis an den Fuss des Himalaya und bis über den Nordabhang der europäischen Alpen hinaus verbreitet.

Durchweg scheint älteren Formen ein niedrigeres und einfacher gebildetes, mehr hirschähnlich gebildetes Gebiss zuzukommen als neueren. *Hypselodontie* und *Plicidentie*, Bereicherung des Gebisses nach Umfang und nach Inhalt, scheinen also, wie schon Lartet erkannt hat, mindestens einen Zug, und insofern auch einen Maassstab für die Beurtheilung der progressiven Metamorphose zu bezeichnen.

In starker Vertretung und weiter Verbreitung im Süden von Europa erscheinen mit dem geologischen Horizont von *Pikermi* Gazellen und *Strepsiceren*, vielleicht damals unter sich weniger getrennt als gegenwärtig, sowie Vertreter der heutigen *Oryx*-Gruppe unter der Gamsen-Familie, also Formen, deren Schwergewicht heutzutage vorwiegend oder ausschliesslich auf Afrika beschränkt ist. Erst in sehr später Zeit, in irgend einem Abschnitt der pleistocenen Epoche, erlöschen also nördlich des Mittelmeeres diese gegenwärtig afrikanischen Gestalten, während mindestens in Europa Gazellen und Gamsen

noch lange, Gazellen mindestens bis in praehistorische Zeit, einen grössern Umfang an Raum ausfüllen als gegenwärtig.

Unbekannt auf älterem als dem gegenwärtigen Boden sind einstweilen nur die Form von *Oreotragus* und von *Cephalophus*, mit Ausnahme des bis in die jüngste Tertiärzeit hinaufgehenden und schon damals indischen Genus *Portax*.

---

## Caprina.

Ein strenges Einhalten der Wegweisung, welche sich für Gruppierung der Wiederkäuer aus der Vergleichung des Schädelbaues ergibt, würde den Schafen und Ziegen eine wesentlich andere Stellung zuweisen, als der Verlauf unseres Textes. Schon die Besprechung der Giraffe liess voraussehen, dass ein Anschluss zwischen Cervicornia und Cavicornia, so weit bisher bekannt, nur durch Thiere vermittelt wird, die wir ihrer äussern Erscheinung nach Antilopen zu nennen pflegen, während es wohl schwer wäre, ein Verbindungsglied irgend welcher Art zwischen Hirschen einerseits und Schafen und Ziegen andererseits namhaft zu machen. Eine einzige Thierform dürfte vielleicht einen schwachen Anspruch auf diese Rolle machen, Diceranoceros. Gerade hierin liegt indess ein Wink über die wirklichen Beziehungen der Schafe zu den übrigen Wiederkäuern enthalten. Da es zu weit gegangen wäre, die Pronghorn-Antilope Hirsch zu nennen, so werden wir Schafe und Ziegen vielmehr als eine Wiederkäuerreihe anzusehen haben, welche, den Antilopen parallel, und mit ihnen etwa auf der Stufe von Diceranoceros, vielleicht auch von Rupicapra am nächsten zusammentreffend, selbstständige Modificationen eingeht, deren Schlusspunkt Ovibos nicht mit Unrecht seit langem als eine Art von Parallele zu der Architectur des Rindes gilt.

Schon die äusseren Merkmale, wie Körpergrösse, Statur, Haarkleid, Beschaffenheit von Hörnern und Gebiss, sowie andererseits die geographische Verbreitung, die wesentlich — den wohl nur nachträglich nach dem höchsten Norden verdrängten Ovibos ausgenommen, — den Hochregionen der nördlichen Hemisphäre oder der Wasserscheide zwischen nördlicher und südlicher Abdachung der Erde folgt, thun sofort dar, dass die gesammte Gruppe sich in weit engeren Grenzen von Gestaltung hält als die Familie der Antilopen, sei es, dass ihr eine grössere Beständigkeit in der Bewahrung einmal erhaltener Gestaltung inwohnte, oder, was vielleicht dasselbe besagen könnte, dass sie geringerem Wechsel an geologischen Erlebnissen ausgesetzt war.

Als craniologisches Gepräge der Schafe und Ziegen im Gegensatz zu Hirschen und einem guten Theil der Antilopen wurde in meiner früheren Arbeit über Wiederkäuer (Natürliche Geschichte des Rindes. Pag. 38) die Verkürzung und die damit oft einhergehende Knickung der Parietalzone bezeichnet, in Folge welcher die letztere in mehr oder weniger starkem Winkel nach hinten abfällt, bis sie bei den Argalis nahezu von der Oberfläche des Schädels verdrängt wird und wie bei vielen Rindern in eine Flucht mit der Occipitalzone fällt.

Die Verkürzung der Parietalzone wird dabei wohl mehr zu bedeuten haben als die Knickung, da letztere nicht nur ausbleiben kann (Ovibos), sondern auch mit der Stärke der Bewaffnung des Schädels in Beziehung zu stehen scheint. Sie wird bedingt durch zwei unter sich durchaus nicht nothwendig correlate Verhältnisse, einmal durch wirkliche Biegung der Schädelachse zwischen Vomer und Keilbein, zweitens durch Knickung der Schädeloberfläche in der Linie des Hornansatzes. Die letztere ist meistens Folge von diploëtischer Verdickung der Stirnbeine. Immerhin ist erheblich, dass eigentliche Lufthöhlen der Schädelknochen bei Schafen nur in geringem Maasse sich ausbilden; im Gegentheil gehört massive und schwere, von Fett getränkte Knochensubstanz zu den Eigenthümlichkeiten dieser Familie und bei den mit Wolle statt mit schlichtem Haar bedeckten Vertretern derselben, zumal bei den an die kältesten Klimate gebundenen Ovibos und Budorcas erreicht sie Grade, die selbst denjenigen des Elenthiers übertreffen. Die geringe Pneumaticität der Hornzapfen, die wiederum bei Schafen im natürlichen Zustand in der Regel weniger weit geht als bei Ziegen, steht damit in enger Beziehung.

Da die Parietalzone bei aller Verkürzung also fast immer noch einen selbstständigen Theil der Hirnkapsel bildet, ohne von der Stirnzone ganz überdacht zu werden, so liegt die Schläfengrube noch gutentheils oberflächlich und öffnet sich frei nach hinten, und je nach der Ausdehnung der Frontalzone theilweise nach oben. Die Stirnzone erreicht ihre grösste Querausdehnung wie bei Antilopen weit mehr zu Gunsten der Augenhöhlen als wie bei Rindern zu Gunsten des Hornansatzes. Mögen die Hörner auf dem Höhepunkt ihrer Stärke schliesslich auch einen grossen Theil der Schädeloberfläche einnehmen oder wie bei Ovibos sogar an den Seitenrand der Stirnfläche hinausrücken, so wurzeln sie ursprünglich über und medianwärts von den Augenhöhlen und sind in verschiedenem Grade seitlich abgeplattet.

Als ein zweites Merkmal von allgemeinem Belang gehört dazu der exquisit hypsodonte Bau des Backzahn-Gebisses. Er erreicht hier, und wieder bei Schafen (am wenigsten bei Ovibos) in höherem Maasse als bei Ziegen, den Gipfelpunkt unter Wiederkäuern. Aeusserer Ausdruck davon ist die im Verhältniss zur Länge des

Schädels ungewöhnliche Höhe der Maxillarfläche. Dazu fügt sich die langgestreckte und von den Mittel- zu den Seitenzähnen fast gleichbleibende schmale Gestalt der Schneidezähne mit entsprechender Zuspitzung der ihnen entgegenstehenden Endplatte der Zwischenkiefer.

Von dem allgemeinen Grundtypus der Cavicornia entfernen sich dabei die Ziegen im Allgemeinen in geringerem Maasse als die Schafe, sowie sich auch die Modificationen ihres Schädelbaues innerhalb engerer Schranken bewegen als bei den Schafen. Der auffällig niedrige Gesichtsschädel des weiblichen *Ovis Nahoor*, der, im Verein mit den flachen Nasenbeinen, den gestreckten Intermaxillae und den vollkommen aufrechten Hörnern diesem Thier eine Gamsen-Physiognomie verleiht, — andererseits der merkwürdig hohe Gesichtsschädel von *Budorcas* und des Fettschwanzschafes, oder die Gaur-Physiognomie des männlichen *Argali* und die Rindsgestalt des Schädels von *Ovibos* sind Beispiele von Variationen innerhalb des Schafschädels, für welche sich innerhalb der Reihe der Ziegen keine Parallelen namhaft machen lassen. Wenn auch gewisse Ziegen, wie vor allen *Aegoceros Pallasii*, im Gesamtbau des Schädels sich manchen Schafen, etwa *Ammotragus*, auffallend annähern und umgekehrt andere wie *Hemitragus jemlaica* den besondern Typus der Ziegen zu einer Art von Extrem führen, so sind doch solche Endpunkte unter Ziegen von der Mittelform weniger entfernt als die so manigfach divergenten Schlussformen der Schafe.

Abgesehen von solcher Knappheit in Gestaltung des Schädels können folgende Merkmale als bezeichnend für Ziegen gelten. Erstlich die Stellung und die Gestalt der Hörner. Sie sind der Mittellinie des Schädels angenähert und stehen steil. Sie sind dabei in der Regel compress mit vorderer Kante, und so gestellt, dass die grosse Achse des Durchschnitts der Schädelaehse parallel oder von derselben nur in schwachem Winkel abgewendet ist. Bei Schafen wurzeln die Hörner etwas weiter hinten und von der Mittellinie des Schädels entfernter. Ihre Form ist weniger compress, meist dreikantig, mit breiter oder abgerundeter Vorderfläche und starker Divergenz der grossen Durchmesser des Durchschnittes, bis zu vollkommener Querstellung bei *Budorcas* und bei dem weiblichen *Ovis Nahoor*. Gleichzeitig sind sie in der Regel von Anfang an weit mehr seitwärts und abwärts geneigt als bei Ziegen, bis endlich in *Ovibos* ein Gipfelpunkt erreicht ist, der sogar bei Rindern keine Parallele findet. Auch in dieser Beziehung schliesst sich *Aegoceros Pallasii* fast unmerklich an manche Schafe, wie *Ammotragus* oder *Ovis Nahoor* (♂) an.

Weniger auffällig, aber nicht minder bedeutsam ist eine Anzahl anderer Verschiedenheiten im Schädelbau von Ziegen und Schafen. Der gesammte Schädel fällt bei Schafen breiter aus als bei Ziegen; die Stirnzone ist in der Längs- wie in der queren

Richtung ausgedehnter; die Scheitelknickung ist weiter nach hinten verschoben, daher die Parietalzone im Allgemeinen kürzer, steiler und breiter ausfällt als bei Ziegen. Auch die Nasenbeine sind bei Schafen breiter, meist in querer und longitudinaler Richtung gewölbt, und reichen weniger weit nach hinten. Die Augenhöhlenränder sind breiter und treten seitlich stärker über den Schädelumriss vor, wodurch das Thränenbein so nach unten verschoben wird, dass es nur an der Seitenwand der Augenhöhlen Theil nimmt und nach unten auf die Masseterfläche übergreift. Die Masseter-crista verläuft also bei Schafen meist über das Thränenbein — bei Ziegen unter demselben hin. Dennoch ist das Thränenbein selber ausgedehnter, so dass es die Gesichtslücken gegen das Nasenbein hin zuschliesst und meistens durch Thränengruben etwas ausgehöhlt (ausser bei *Ammotragus*, *Ovis Nahoor* und *Budorcas*).

Höchst unsicher und schwankend ist Gestaltung von Muskelflächen und Muskelfortsätzen. Doch ist im Allgemeinen die Hinterhauptsfläche bei Schafen steiler gestellt als bei Ziegen und die Processus exoccipitales schwächer; das *Os tympanicum* ist meistens kleiner und steht tiefer. Endlich ist das Gebiss bei Schafen durchschnittlich massiver gebildet als bei Ziegen. Die Backenzähne bilden im Verhältniss zur Grösse des Schädels dickere und höhere Säulen und stehen im Kiefer vertikal, während sie bei Ziegen schwächer und comprimirt und dabei schiefer und coulissenartig gestellt sind. Selbst die Schneidezähne sind bei Schafen massiver und breiter als bei Ziegen.

Obwohl es nicht das Ziel dieser Arbeit ist, den Schädelbau der Wiederkäuer für jede Gruppe bis in die Einzelheiten von Genus und Species zu verfolgen, so mag es doch nicht verfehlt sein, auch hier einigen einzelnen Formen, welche die Variationsgrenzen der Gruppe besonders bezeichnen können, einige Worte zu widmen.

Den Anschluss an die Antilopen und zwar im Besondern an die Gemen, vermittelt wohl für die Gruppe der Ziegen der Typus des Steinbocks, den Gemen am nächsten stehend in *Capra Beden*, am fernsten in *Capra hispanica* und *Aegoceros Pallasii*. So sehr die Hörner erwachsener Männchen bei Steinböcken durch schliessliche Ausbildung einer breiten und durch Kanten mehr oder weniger begrenzten Vorderfläche, und der Schädel durch Entwicklung eines mächtigen diploëtischen Querwulstes zwischen den Hornwurzeln sich sowohl von Gemen als von schwachbehornten Ziegen unterscheidet, so führen doch weibliche, und noch mehr jugendliche Schädel ohne grosse Sprünge von der Gestalt des Gemeneschädels zu demjenigen der Ziegen und des Steinbocks.

Zur Zeit des Auftretens des Milchgebisses sind Schädel von Gemse und Ziege einander in manchen allgemeinen Zügen sehr ähnlich. Die Hirnkapsel ist in ihrem ganzen Umfang jetzt noch gleichförmig gewölbt und von dem kurzen Gesichtsschädel



auffallend scharf abgesetzt. Die Parietalzone ist an der Umhüllung des Gehirns jetzt noch am stärksten betheiligt. Schon jetzt aber machen sich am Ziegenschädel folgende Eigenthümlichkeiten bemerkbar. Die Frontalzone ist ausgedehnter als bei der Gemse und greift namentlich weiter rückwärts in den Bereich der Parietalzone. Die ersten Hornanlagen liegen weiter zurück und von der Mittellinie entfernter als bei der Gemse, während die Nasenbeine weiter in den Bereich der Stirnzone hinaufreichen. Die Augenhöhlen der Ziege sind kleiner und liegen tiefer, das Thränenbein also oberflächlicher. Offene Gesichtslücken über dem Thränenbein führen in grosse Ethmoidhöhlen, die sich bis in den vordern Theil der Stirnbeine ausdehnen. Die Hirnkapsel ist dabei gestreckter und comprimierter, was sich besonders in der steileren Stellung der Alae posteriores und des Foramen ovale verräth. Die Schläfenschuppe ist niedriger, die Condyli occipitis massiver, das Tympanicum, obschon in diesem Alter noch tief liegend und blasig, grösser, das Pterygoideum internum nach seinem obern Rand hin ausgedehnter, der Gaumen nach hinten breiter.

Trotz der schliesslich so mächtigen Verstärkung der Hörner bleibt Ibex auch im erwachsenen Alter des Männchens den Gemen näher als die Ziege durch die geringe Längsausdehnung der Stirnzone und den mächtigen Querwulst zwischen den Hörnern, der dem vordern Abfall der Stirn concave Form verleiht und sie von den horizontal bleibenden Nasenbeinen scharf absetzt. An der nachträglichen Streckung des Gesichtsschädels betheiligen sich vorzugsweise das Thränenbein und die Intermaxillae, welche sich selbst im erwachsenen Alter nahezu berühren.

## Hemitragus.

Den Typus des Ziegenschädels im engeren Sinn bringt Hemitragus zum stärksten Ausdruck. Obgleich, wie oben bemerkt wurde, die Modificationen des Ziegentypus sich innerhalb engerer Schranken halten als diejenigen der Schafe, so bildet der Iharaal insofern eine Parallele mit dem Argali unter den Schafen, als hier wie dort die Parietalzone den höchsten Grad der Verkürzung und so steile Stellung erreicht, dass sie fast in der Flucht des Occiput nach hinten abfällt. Immerhin behält sie noch eine selbstständigere Gestaltung als beim Argali. Auch die Stirnzone erfährt hier die ausgedehnteste Knickung, so dass sie nach vorn die Flucht der Nasenbeine, nach

hinten diejenige der Parietalzone fortsetzt. Diese mächtige Knickung zwischen Gesicht- und Gehirnschädel kömmt zu Stande erstlich durch eine winklige Beugung der Schädelachse, die einen höhern Grad erreicht als bei Gensen und Steinböcken; das Praesphenoideum liegt im Scheitel dieser Beugung. Ueberdies gelangt der diploëtische Aufsatz, der die Hörner trägt, hier zu seiner stärksten Ausdehnung. Die Hornzapfen sind nach Ziegenart compress, mit vorderer Kante, und berühren sich in der Mittellinie. In Folge der scharfkantigen Scheitelnickung scheinen sie weiter hinten zu wurzeln als bei Ziegen mit ausgedehnterer Wölbung der Stirnzone.

Eine Folge der starken Knickung sowohl der Schädelachse als der Schädeloberfläche ist die mächtige vertikale Ausdehnung an dem Zusammentreffen von Gehirn- und Gesichtsschädel. Die Augenhöhlen, wie bei Ziegen im erwachsenen Alter kleiner als bei Schafen und ohne vorspringende Ränder, sind nicht nur im Umriss ihrer Oeffnung, sondern auch in ihrer Achse steil gestellt. Das Thränenbein, langgestreckt und ohne alle Thränengruben, liegt daher fast in der Ebene der Stirnbeine, und die Nerven- und Gefässöffnungen der Augenhöhle sind steil aufwärts gerichtet. In Folge der starken Beugung der Schädelachse ist die Choanenwand auffallend kurz und hoch. Selbst die äussere Gesichtsfläche wird hieran theilhaftig, was sich in der steilen Stellung und der beträchtlichen Höhe von Masseterfläche und Masseterkante sowie in der Kürze des Jochbogens verräth.

Die compress und am untern Rande sehr gestreckte Form der Bullae osseae, die sehr breite Gestalt des Basioccipitale, die dreieckige nach hinten rasch an Breite gewinnende Form des Gaumens, die grosse Ausdehnung des obern Theils der Pterygoidea, welche die grosse dreieckige Lücke zwischen Ala pterygoidea und palataler Choanenwand ausfüllen, sind Verhältnisse, die Hemitragus mit den übrigen Ziegen gemein hat.

*Capra Falconeri* könnte in mancher Beziehung als ein Mittelglied zwischen *Capra Aegagrus* und *Iharal* bezeichnet werden. Doch beruht die Vermittlung nur in der einigermaassen ähnlichen Ausdehnung der Stirnsinus zu Gunsten der sehr starken Hörner, während die Schädelachse nicht mehr gebogen und die Parietalzone nicht mehr nach hinten geneigt ist als bei der gewöhnlichen Ziege.

## Kemas.

---

Viel näher steht dagegen dem Iharal das Genus Kemas. Es unterscheidet sich von ihm nur in unwesentlichen Dingen, namentlich durch schwächere und also von einander mehr getrennte Hörner und durch ausgedehntere Parietalzone, sowie durch geringere Knickung der Schädelachse. Ausdruck hievon ist die gestrecktere Gestalt von Jochbogen, Choanengegend und Masseterfläche. Während der Markhoor also nur in Bezug auf äussere Schädelphysiognomie eine Parallele zu dem Iharal bildet, kann der Warryato als ein wirkliches Bindeglied zwischen Capra und Hemitragus gelten.

## Aegoceros Pallasii.

---

Als eine Gestalt, welche in mancher Beziehung auf der Grenzscheide zwischen Ziegen und Schafen steht, ist schon oben Aegoceros Pallasii bezeichnet worden. Von diesem seltenen Thiere liegt mir im Basler Museum ein vortrefflicher Balg und Schädel eines erwachsenen Thieres vor Augen\*). Allerdings erreicht die Dicke und Stärke der Schädelknochen hier einen Grad wie bei Schafen. Auch die Stärke und die Stellung der Hornzapfen geben dem Schädel eine Ammotragus und Ovis montana ähnliche Physiognomie. Doch ist der Durchschnitt der Hörner dabei fast rundlich, wie bei dem männlichen Ovis Nahoor, dem auch die Hornscheiden in der Art der Runzelung am nächsten stehen. Immerhin bleiben trotzdem die Hornzapfen des Tur

---

\*) Das Thier stammt nach der Angabe von Herrn Edw. Gerrard in London, von dem ich es gekauft habe, von einem Ort „Sagedechi“ am Elbrüz. Rouillier, Bulletin de Moscou 1841. 910 Pl. II, gibt die einzig mir bekannte Abbildung dieses seltenen Thieres. Die Hörner sind richtig dargestellt in Blasius, Wirbelthiere Deutschlands Pag. 479 unter dem unrichtigen Namen Capra caucasica (Güldenstädt Acta, Petropolit. 1779 II. 273. T. 16. 17, welche den sibirischen Steinbock betreffen; Copie in Schreber, Säugeth. Tab. 281. B.). Auch die Abbildung von „Capra Pallasii“ bei Schinz, Arten der wilden Ziegen (Neue Denkschriften d. Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturwissensch. II. 1838. Taf. I) bezieht sich auf den sibirischen Steinbock und nicht auf den caucasischen Tur.

noch insofern dem Plane von Ziegen treu, als nur eine Kante derselben zu voller Ausbildung kömmt, die vordere; nur liegt sie in Folge der queren Richtung der Hörner nicht mehr wie bei Ziegen vorn, sondern verläuft auf dem obern Umriss des Hornzapfens in der Fortsetzung des queren Frontalwulstes. Der Hornzapfen ist also im Durchschnitt nur massiver als bei übrigen Ziegen, nicht linsenförmig oder birnförmig, sondern rundlich, bis fast zum Auslöschen der Vorderkante. Massiver, weniger compress, bei erwachsenen Männchen bis zur Ausbildung einer vordern Fläche, sind die Hornzapfen schon bei Steinböcken, unter welchen Beden die am meisten comprimierten, der Tur die vollsten, d. h. bis zur Auslöschung der Kanten verstärkte Hörner trägt. Unter seinem Geschlecht steht ihm *Capra hispanica*, der Steinbock des südlichen Spaniens, am nächsten. Bei Schafen, auch bei *Ammotragus*, ist der Durchschnitt des Hornzapfens immer mehr oder weniger dreieckig, indem zwei Seitenflächen und eine Vorderfläche zu fast gleichwerthiger Ausbildung gelangen. Das Profil des Gesichtes ist von der Nasenspitze bis zum Scheitelkamm fast geradlinig, wie bei *Ammotragus* und *Ovis Nahoor*, die Augenhöhlen treten röhrenförmig wie bei Schafen über die Wange vor. Der hintere Abfall der Stirnfläche steht bei horizontaler Schädelage vertikal, in einem Grade wie dies bei den stärkstwaffneten Steinböcken nie der Fall ist, wie denn auch die Form der Occipitalfläche und die ganze Art der Befestigung des Schädels an den Rumpf fast ähnliche Verhältnisse wie bei *Ovis montana* schafft. Sogar die *Bullae osseae* bleiben durch auffallend geringe Grösse weit mehr schaf- als ziegenähnlich.

Auf diese allerdings physiognomisch sehr wirksamen Punkte beschränkt sich indess die Analogie mit Schafen, während alle Détails des Schädelbaues innerhalb des Formenkreises der Ziegen, zumal der Steinböcke bleiben. So kömmt der Parietalzone bei aller Kürze doch eine grössere Selbstständigkeit zu als bei den Schafen von gleich starker Bewaffnung; der Stirnwulst ist niedriger, die Nasenbeine, so massiv sie sind, sind schmaler als bei den genannten Schafen und weniger gewölbt. Das Thränenbein entbehrt wie bei Ziegen der Thränengrube und ist verhältnissmässig schmal und durchaus oberflächlich, d. h. in der Fortsetzung der Stirnfläche gelegen, ohne sich in die Wangenfläche hinabzubiegen. Auch die Augenhöhlen sind kleiner als bei den zunächst stehenden Formen von Schafen.

In mancher Richtung, hauptsächlich aber in der massiven, fast rundlichen Form der Hornzapfen und in deren queren Stellung bildet also allerdings der Tur einen Culminationspunkt unter Ziegen, doch nicht durch excessive Ausbildung des besondern Typus dieser Gruppe wie etwa der Markhoor und der Iharal, sondern eine Art von Grenzform nach den Schafen hin.

## Ammotragus.

Umgekehrt scheint unter den Schafen *Ammotragus* dem Ziegentypus in vieler Beziehung so weit als möglich entgegenzukommen. Von diesem Thier liegen mir nur zwei Schädel vor, die vielleicht den Charakter der Species nicht in reiner Form an sich tragen. Sie stammen von Thieren ab, die in zoologischen Gärten aufgewachsen sind, und sind von vorn herein, wie ich vermuthe aus diesem Grunde, überaus eigenthümlich durch ausserordentliche Leichtigkeit der Knochensubstanz. Die Stirnbeine nebst den Hornzapfen sind von mächtigen Lufthöhlen gefüllt und die äussere und innere Grenztafel auf starke Papierdicke verdünnt, alle Knochen fettlos.

Beide Schädel stammen von männlichen Thieren sehr verschiedenen Alters, deren Vergleichung auf eine sehr bedeutende Variabilität in der Physiognomie des Mähenschafes sollte schliessen lassen. Die Altersverschiedenheiten beziehen sich vor Allem auf eine sehr beträchtliche Verlängerung und Streckung des Schädels bei zunehmendem Wachsthum. Die Streckung verräth sich in der allmäligen Verminderung der Knickung der Schädelachse und somit in der dadurch bedingten Streckung des Choanenrohrs. Die Verlängerung betrifft die Gesamtheit des Schädels, also Intermaxillar-, Maxillar-, Frontal- und Parietaltheil. Im Gesichtstheil scheint sie auszugehen von der Zunahme des Gebisses, wodurch der Intermaxillartheil nach vorn, der Frontaltheil mit den Augenhöhlen nach hinten geschoben wird. Im Gehirntheil tritt die Parietalzone immer mehr über den Frontalwulst hinaus nach hinten vor. Der Stirntheil erhält schliesslich eine für Schafe ungewöhnliche Länge ohne entsprechende Breitezunahme. Im Gegentheil erscheint die Stirnzone an dem erwachsenen Thier schmal, und die Hornzapfen, in der Jugend ziemlich weit von einander getrennt, stossen später in der Sagittalnaht zusammen. Im Durchschnitt sind sie in der Jugend fast rund, später dreieckig, mit drei in stark abgerundeten Kanten in einander übergehenden Seitenflächen, denjenigen von *Capra Ibex* nicht unähnlich, nur mehr seitwärts gerichtet. Die Profilinie ist von den Nasenbeinen bis zu dem Frontalwulst vollkommen geradlinig.

Besonders eigenthümlich, und wie mir scheint typisch für die Species, verhalten sich Nasenbeine und Thränenbeine. Erstere sind auffallend klein, kurz, schmal, flach und durch bleibende Gesichtslücken von dem Thränenbein getrennt. Die Thränenbeine, ohne Thränengrube, sind in Höhe und Länge sehr ausgedehnt und greifen

namentlich sehr weit in die Stirnfläche hinauf, wo sie fast erst in der Mitte des Augenhöhlenrandes in vollkommen querer Nath an das Stirnbein stossen. Beides, die Form der Nasenbeine und die hohe fast mehr der Stirn- als der Wangenfläche angehörige Lage der Thränenbeine, sind Merkmale, die sonst den Ziegen zukommen. In etwas mässigerem Grade finden sie sich übrigens auch bei *Ovis Nahoor*. Der Tur einerseits, *Ovis Nahoor* und das Mähnenschaf andererseits, scheinen also der Berührungslinie zwischen Ziegen und Schafen am nächsten zu stehen.

### Budorcas.

Ueber dieses vor wenig Jahren noch fast unbekannte Thier hat bekanntlich der Père David die Materialien nach Frankreich gebracht, welche die Grundlage zu der so höchst erwünschten Monographie desselben durch Alph. Milne-Edwards bildeten \*). Ein glücklicher Zufall gestattete, mir diese Vorräthe im Jardin des Plantes durchzusehen, nachdem ich kurz vorher in London die reiche Sammlung von Wildschafen Hoch-Asiens studirt hatte, welche vom Prinzen von Wales von seiner Reise in Indien zurückgebracht worden waren. Wenn ich daher bezüglich eines Urtheiles über das von mir schon in meiner früheren Arbeit über Wiederkäuer besprochene Genus *Budorcas* mich diesmal in wesentlich besserer Lage befinde als damals, so gereicht es mir doch zum Vergnügen, zu gestehen, dass diese reichliche seitherige Belehrung mir nur bestätigte, was mich darüber schon die ärmlichen Hilfsmittel des Basler Museums gelehrt hatten.

Es genügt, etwa den Schädel des weiblichen *Ovis Nahoor*, oder auch den Schädel eines ägyptischen Fettschwanzschafes, ja selbst denjenigen des im Sommer die Schweiz bewohnenden Bergamaskerschafes neben denjenigen des bis vor Kurzem halb mythischen Thieres aus Hoch-Thibet zu stellen, um sofort inne zu werden, dass *Budorcas* sich nicht nur in jeder Beziehung innerhalb des Typus der Schafe hält, sondern dass sogar seine bedeutendste Eigenthümlichkeit sich blos auf die Form der Hörner beim männlichen Thier und auf die relativ bedeutendere quere Ausdehnung des Schädels

---

\*) Alph. Milne-Edwards, *Recherches pour servir à l'Histoire naturelle des Mammifères*, 1868 bis 1874. Pl. 74—79.

beschränkt. Die merkwürdige Höhe des Gesichtsschädels mit der ungewöhnlich starken Wölbung der Nasenbeine ist kaum stärker als bei dem ägyptischen Schilluk oder bei dem Bergamasker-Schafe, und die so eigenthümliche Stellung und Richtung der Hornzapfen stellt sich nur als eine Weiterführung des Planes heraus, welcher der Hornbildung bei *Ovis Nahoor* zu Grunde liegt. Allerdings mag wohl *Ovis Nahoor* den sexuellen Unterschied in der Bewehrung durch Hörner zu weiteren Graden führen als irgend ein anderer Wiederkäuer. So ausserordentlich auch das Gehörn des männlichen *Nahoor* durch vierkantigen Umriss und Aufrollung von der Wurzel bis zur Spitze, in vollkommen transversaler Richtung, von dem des männlichen *Budorcas* abweicht, so zeigen doch die schwachen und daher steilen, ja an der Basis vertikal gestellten Hörner des weiblichen Thieres die durchaus transversale Einpflanzung der Hörner und die Rückwärtsbiegung ihrer Spitzen in vollkommen ähnlicher Weise wie *Budorcas* in beiden Geschlechtern. *Budorcas* bleibt trotz stärkerer Entwicklung der Hörner dem Plan des weiblichen *Nahoor* treu, und der grösseren Stärke der Hornzapfen entspricht der quere Wulst, den die Stirnzone bildet, sowie die Kürze und die im Vergleich zu der Stirnzone concave Oberfläche der Parietalzone.

Auch der Gesichtsschädel von *Budorcas* trägt im Vergleich zu den oben genannten Racen zahmer Schafe in allen Theilen nur die Folgen grösserer Ausdehnung in querer Richtung zur Schau. Dieselbe geht so weit, dass die namentlich in ihrem hintern Theile ungemein breiten Nasenbeine sich bis in die Wangenfläche hinabbiegen, und ähnliche Verhältnisse beherrschen die Form des Gaumens. Das Thränenbein, mit breiter Maxillarfläche, steht zur Augenhöhle durchaus lateral und entbehrt wie bei *Ovis Nahoor* und mehreren anderen Schafen einer Thränengrube. Die *Ossa incisiva* reichen weiter rückwärts als bei den genannten zahmen Racen von Schaf.

## Ovibos.

Der Erörterung, die ich diesem Genus in der früheren Schrift gewidmet habe\*), sehe ich mich nicht genöthigt, hier trotz einer seither erschienenen Monographie desselben \*\*) etwas beizufügen.

\*) Versuch einer natürlichen Geschichte des Rindes. 1867. II. Abth. Pag. 6.

\*\*) Boyd Dawkins, *The British Pleistocene Mammalia*. Part. V. *Ovibos moschatus*. London 1872. Siehe auch Alex. Ecker, *Archiv für Anthropologie*. Band XI, 1878. Pag. 142.

Man kann *Ovibos* insofern ein Rind unter den Schafen nennen, als die Hornwurzeln hier wie bei der Mehrzahl der Rinder von den Seitenrändern der Stirnzone ausgehen, so dass die letztere, ohnedies im Vergleich zu weniger abweichenden Formen von Schafen sehr breit, über den Schläfen eine Ausdehnung erreicht wie bei Rindern. Nichtsdestoweniger liegt die Parietalzone, ebenfalls sehr breit und dabei kurz, noch vollkommen oberflächlich \*). Die Schläfengrube öffnet sich daher nicht nur nach hinten, sondern hinter den Hornwurzeln auch nach oben, ohne von den Stirnbeinen überdacht zu werden. Damit verbindet sich eine selbst für Schafe ungewöhnlich starke Ausdehnung der Hornwurzeln, so sehr, dass diese bekanntlich bei männlichen Thieren den grössten Theil der Stirnzone bis zur Sagittalnaht in Anspruch nehmen können, sowie die plötzliche Abwärtsbiegung der seitlich abgeplatteten Hornzapfen. Von dem queren Stirnwulst, der bei *Budorcas*, bei so sehr verschiedener Einsetzung der Hörner, die Parietalzone von der Stirnzone abschnürt, ist also bei *Ovibos* keine Spur vorhanden.

Im Uebrigen folgt der Schädelbau, abgesehen von dem für Schafe ungewöhnlichen horizontalen Verlauf der Schädelachse, so gut wie bei *Budorcas*, demjenigen von Schafen, bis in kleine *Détails*, wie etwa Gestalt von Gefäss- und Nervenrinnen. Auch das Gebiss, und vornehmlich die Schneidezähne, sowie die Form der diese tragenden Zwischenkiefer und die Form des Gaumens verhält sich wie bei Schafen. Das Thränenbein weicht von demjenigen der Schafe nur durch die ungewöhnliche Höhe ab, die mit der allgemeinen Höhe des Gesichtsschädels Schritt hält, und ist von Thränengruben seicht ausgehöhlt. Die Augenhöhlen sind breitrandig und stehen röhrenförmig so weit vor, dass auf sie die grösste Breite des Schädels fällt, und hinter ihnen die Jochbogen sofort nach der relativ schmalen Occipitalfläche convergiren. Die *Processus exoccipitales* sind klein und einwärtsgebogen wie beim *Argali*. Das *Basioccipitale* ist ausserordentlich breit, die *Condyli occipitis* massiv wie beim *Argali*, aber nicht vorragend.

---

\*) Gute Darstellungen hievon geben die Bilder von Tab. V. in *Catalogue of the Specimens of Mammalia in the Coll. of the Brit. Mus. Part. III. Ungulata furcipes*. 1852.



## Fossile Caprina.

### Bucapra Daviesii Rütim.

Den fossilen Resten von Schafen oder Ziegen ein besonderes Kapitel widmen zu wollen, wäre noch gewagter, als bei Antilopen. Es würde dies eine der auffälligsten Lücken in der Palaeontologie der Säugethiere berühren, insofern bekanntlich, wenn man absieht von etwas ältern Vorkommnissen heutiger Formen, wie namentlich Ibez, bisher nur höchst vereinzelte und unsichere Ueberreste, meist aus sehr späten Epochen, auf Anwesenheit von Schafen und Ziegen vor der Lebewelt unserer Tage hindeuten. Sie bestehen nur in wenigen Vorkommnissen in Höhlen und Breccien, welche bisher auf Süd-Europa, Frankreich und Italien beschränkt sind, wie *Capra Rozeti Pomel* \*) aus pleistocenem Terrain der Auvergne, *Capra Cebennarum Gerv.* aus der Höhle von Mialet, *Ovis primaeva Gervais* aus anderen Höhlen von Süd-Frankreich \*\*), einige ähnliche Ueberreste aus Italien, über die wir von Dr. F. Major Aufschluss zu erwarten haben. Nichtsdestoweniger wäre wohl nichts verfrühter, als hieraus auf wirkliche Abwesenheit solcher Thiere in früheren Erdepochen, welche andere Wiederkäuer enthalten, schliessen zu wollen. Mag auch der Hinblick auf das exquisit hypsodonte Gebiss auf einen späten Erwerb der gegenwärtigen Erscheinung bei diesen Thieren hinzuweisen scheinen, so zeigt doch ihr Schädelbau, dass sie keineswegs etwa einen letzten Terminus in der Structur des Wiederkäuers vertreten, sondern dass man viel mehr erwarten sollte, sie mindestens in ähnlichen Terrains fossil zu finden wie die Rinder. Eine Erklärung dieser Lücke kann also höchstens in dem

---

\*) Pomel, Catal. des Vertébrés fossiles, 1853. Pag. 113.

\*\*) Gervais, Zool. et Paléontol. franç. 2. Edit. Pag. 135 u. f. Zool. et Pal. général. Pag. 60 etc.

Umstand zu finden sein, dass allerdings Hornzapfen oder grössere Parteen des Schädels zu sicheren Diagnosen unentbehrlich sind. Vielleicht auch, dass von früh an die geographische Verbreitung, wie sie heute wesentlich nur den Gebirgszügen zwischen nördlicher und südlicher Hemisphäre folgt, eine beschränkte war.

Umsomehr ist es Aufgabe, den etwaigen Spuren fossiler Vertreter dieser Gruppe mit Aufmerksamkeit zu folgen. In diesem Sinne wage ich es, einen der merkwürdigsten Schädel aus der sivalischen Sammlung Falconer's hier unter obigem Titel zur Kenntniss zu bringen. Leider, und es ist mir angelegen, dies zu betonen, war es einer der letzten, der mir in die Hände fiel, so dass ich auf die Untersuchung desselben nicht mehr so viel Sorgfalt verwenden konnte, wie ich wünschte. Theils war dies Zufall, theils sah ich mich allerdings genöthigt, ihn immer und immer wieder von den Rinderschädeln, denen ja meine Absicht in erster Linie zugewendet war, auszuscheiden. Der Prüfstein wissenschaftlicher Methoden liegt in der Art, wie sie sich an neuen Objekten bewähren, wo die Nähe von bekannter Umgebung ausbleibt oder mindestens fester Boden nur an zerstreuten Punkten auftritt. Es wird sich also hier zu erweisen haben, inwiefern der Leitfaden, der mir in der Verfolgung von Schädelstructur an Wiederkäuern zur Richtschnur diente, das Urtheil über dieses mancfach von allem bisher Bekannten abweichende Fossil richtig führte.

Der Schädel trägt die Nummer 36677. Er stammt aus den sivalischen Hügeln und ist von Herrn Will. Davies am Britischen Museum mit ausserordentlicher Sorgfalt aus dem sehr harten Molasse-ähnlichen Sandstein ausgemeisselt. An seiner Fundstätte wird wohl auch das ganze Skelet des Thieres gelegen haben, und es fragt sich, ob dasselbe nicht noch in den Kellern des Museums aufzufinden wäre. Wenigstens hängt der Unterkiefer mit beiden Aesten noch unverletzt an dem Oberkiefergelenk; auch das Zungenbein findet sich noch in der normalen Lage, und die zwei ersten Halswirbel liegen nur wenig verschoben hinter dem Hinterhauptsgelenk. Nur die Schnauze ist im Ober- und Unterkiefertheil quer abgebrochen. Auch die Schneidezähne dürften also vielleicht eher in London als in den sivalischen Hügeln liegen.

Die Länge des ganzen Schädels, wenn wir die fehlende Intermaxillarzone der Länge der Backzahnreihe annähernd gleich schätzen, mag etwa 420 Mm. betragen haben. Die Höhe beträgt mit Einschluss des Unterkiefers 240 Mm., die grösste Breite des Occiput 150 Mm. Der Schädel erreicht also so ziemlich die mittlere Grösse der Rindsschädel von demselben Fundort. Er ist vollkommen hornlos, und man konnte daher bei erstem Anblick leicht geneigt sein, ihn zu den unten zu beschreibenden hornlosen Rindern von dem nämlichen Fundort zu stellen. Bei näherer Prüfung wurde man indess sogleich eine Menge von sehr wichtigen Unterschieden gewahr.

Im Ganzen zeichnet sich der Schädel beim ersten Anblick im Gegensatz zu den Rindsschädeln, auch abgesehen von dem Unterkiefer, der allerdings diesen Eindruck vermehrt, durch ungewöhnliche Höhe und Schmalheit aus, sowie durch die für Rinder vollkommen fremdartige starke Knickung des Schädel-Profiles. Die Knickung liegt in der Mitte der Frontalzone, unmittelbar über den Augenhöhlen, wo die Profillinie des Gesichtsschädels und diejenige des Gehirnschädels, erstere stärker, letztere schwächer gegen den Höhepunkt ansteigend, in stumpfem Winkel zusammenstossen. Die Augenhöhlen liegen in Folge hiervon nicht nur scheinbar ungewöhnlich hoch im Schädel, sondern das Aufragen der Thränenbeine bis nahe zum Scheitelpunkt desselben gibt davon auch einen anatomischen Ausdruck. Die Physiognomie erhält dadurch in hohem Maasse das Gepräge, das wir in der populären Sprache, und zwar bei Thieren allerlei Art, ja selbst bei Menschen mit dem sehr typischen Namen «schafnasig» zu bezeichnen pflegen.

Die Knickung der Schädeloberfläche liegt also in dem Bereich des Stirnbeins. Die gesammte Scheitelzone ist oberflächlich gelegen und sogar die Hinterhauptsfläche sendet einen ansehnlichen Theil der Schuppe auf die Schädeloberfläche.

Schon durch diese Verhältnisse sind Rinder aller Art von einer Vergleichung ausgeschlossen. Selbst bei Büffeln, und insbesondere Anoa, wo der Parietalschädel unter Rindern die grösste Ausdehnung und Unabhängigkeit erhält, sind solche Verhältnisse unbekannt und erreicht die Stirnzone im Vergleich zu den übrigen Regionen des Schädels ein viel bedeutenderes Uebergewicht in longitudinalem und in queren Sinne.

Nicht weniger bestimmt sind durch eine Menge gleich schwer wiegender Verhältnisse, wie Lage und Form von Thränenbein, Gebiss und dergleichen, die hornlosen Wiederkäuer, Kameele und Tragulina, sowie die geweihtragenden von aller Vergleichung ausgeschlossen. Trotz der Hornlosigkeit des Thieres kann es sich also nur noch darum handeln, ob es einem Vertreter der Antilopen oder aber der Gruppe der Schafe und Ziegen angehörte.

Diese Einschränkung der Wahl nöthigt selbstverständlich, immer weniger allgemein wirksame Merkmale als Kriterien zu Hülfe zu rufen, wie etwa Gebiss, typische Schädelöffnungen, Gesichtslücken, Gefäss- oder Nervenrinnen, Thränengruben u. s. f. Aber auch auf solchem Boden lautet, wie mir scheint, der Entscheid immer noch bestimmt genug. Die früher gegebene Schilderung von Schädelstructur unter Antilopen reicht aus, um die Gruppe von *Cephalophus*, von *Oreotragus*, von *Strepsiceros* so sicher als irgend eine der bisher in Betracht gezogenen Abtheilungen von Wiederkäuern auszuschliessen. Es würden also höchstens noch die Gazellen, wo ja mindestens

Saiga noch heutzutage hornlose Thiere enthält, und die grosse Gruppe der Gemsen in Frage stehen können, und zwar wie leicht ersichtlich höchstens nur die Gestalten mit kurzer Stirnzone, ohne Gesichtslücken und Thränengruben, wie vor allem Gemse, Goral und dergleichen. Auch hier genügt es aber, auf einige die gesammte Physiognomie des Fossiles beherrschende Merkmale hinzuweisen, um auch die letzten etwaigen Ansprüche auf den Titel Antilope bei Seite zu setzen: das vollständige Fehlen von diploëtischen Frontalsinus, die ungewöhnliche Ausdehnung des postorbitalen Parietalschädels und die starke Hypsodontie des Gebisses, wodurch die Augenhöhlen nach oben geschoben und der Masseterfläche eine Ausdehnung an Höhe gegeben wird, die selbst Gazellen und Gemsen fehlt. Die Abwesenheit von Frontalsinus steht allerdings grösstentheils in Verbindung mit dem Fehlen von Hörnern. Allein jetzt reicht die Form der Parietalzone und die von dem Bau des Gebisses bedingte Gestaltung des Gesichtstheils aus, um das sivalische Thier der Abtheilung der Caprina zuzuweisen, auch ohne noch beschränktere Détails von Schädelbau zu Hülfe zu rufen.

Wenden wir uns endlich zu der Beschreibung des Fossiles, so verdient die Seitenansicht desselben, da sie am vollständigsten erhalten ist, die erste Rücksicht. Das Schafprofil tritt hier am deutlichsten ins Auge. Die vom Nasenbein und dem in gleicher Flucht liegenden Thränenbein gebildete Gesichtslinie steigt bis zu dem obern Rand der Augenhöhle, um von da in schwacher Wölbung in die Scheitellinie überzugehen. Das Dach der Augenhöhle liegt also in der Höhe und auch in der Querlinie der Scheitelnknicung des Stirnbeins. Die Augenhöhlenränder ragen nur sehr wenig seitlich über den Umriss des Schädels vor und sind dünn. Das Thränenbein ist flach und so weit nach oben gerückt, dass es mehr der Stirnfläche als der Wangenfläche angehört. Sein unterer Rand wird von der Massetercrista gebildet und nach oben stösst es an das Stirnbein erst am obern Rand der Augenhöhle. Weder Thränengruben noch Gesichtslücken in der Umgebung des Thränenbeins sind vorhanden. Die Oeffnung der Augenhöhle bildet ein schief gestelltes Viereck.

Die Wangenfläche besitzt schon in Folge der hohen Lage der Augenhöhlen, aber auch hievon abgesehen in ihrem alveolaren und zwar sowohl in dem zygomatischen als in dem maxillaren Theil eine ausserordentliche Höhe. Die Massetercrista wendet sich vom Jochbogen dem Orbitalrand entlang nach oben und verfolgt den untern Rand des Thränenbeins. Die Masseterfläche ist also sehr ausgedehnt und besitzt ein starkes Tuber maxillare über dem hintersten Praemolarzahn. Dennoch nimmt die Wangenfläche nach vorn so rasch an Höhe ab, dass man schliessen darf, dass der intermaxillare Gesichtstheil sich rasch zuspitzte. Das Foramen supramaxillare scheint vor der Backzahnreihe gelegen zu haben. Der Höhe der Wangenfläche entspricht die

Form des Unterkiefers, der sowohl in seinem horizontalen Ast als in dem vertikalen sehr ausgedehnt ist. Wäre er nicht dem Schädel in normaler Lage noch angefügt, so würde man zaudern, einen Unterkiefer von so beträchtlichen Dimensionen einem an sich nicht so massiven Schädel zuzuschreiben.

Die Schläfengrube, nach oben vollkommen offen oder nur von einer schwachen Kante der abgeplatteten Parietalzone überdacht, ist langgestreckt und niedrig. Der Schuppentheil des Schläfenbeins nimmt daran einen stärkeren Antheil als das Scheitelbein, das in langen Zipfeln an die Keilbeinflügel stösst. Eine stark vorspringende Kante trennt die Schläfengrube von der Augenhöhle und läuft in den hintern Augenbogen aus. Ueberaus ausgedehnt ist die knöcherne Umgebung des Gehörapparates, Os tympanicum und mastoideum, und mit einer ungewöhnlich grossen, fast kuglig aufgeblasenen Bulla ossea verbunden.

Die Hinterhauptsfläche, von derjenigen von Rindern selbst hornloser Racen überaus verschieden, ist schmal und hoch und blos von dem Hinterhauptsbein und den Mastoidea gebildet. Die Hinterhauptschuppe greift weit auf die Scheiteloberfläche über. Sowohl die Exoccipitalfortsätze als die Gelenkköpfe des Hinterhaupts sind merkwürdig massiv gebildet.

Höchst fremdartig unter Wiederkäuern ist die Gestaltung der Schädeloberfläche. Im Umriss ist sie lang und schmal, allein statt mehr oder weniger einförmig flach zu sein, wie bei der Mehrzahl der Rinder, oder die einfache Wölbung sonstiger Wiederkäuerschädel darzubieten, zerfällt sie in der Parietal- und Frontalzone in eine Anzahl von Facetten, wie man sie sonst an Wiederkäuern nicht anzutreffen gewohnt ist. Am fremdartigsten ist eine Art von Sagittalerista, die im hintern Theil der Hirnkapsel, und sonderbarer Weise nicht von der Occipitalkante an, sondern erst in Mitte der Parietalzone merklich vor der Deltoidnaht anhebt, und sich nach vorn bald wieder in zwei den vordern Augenhöhlenwinkeln zulaufende Aeste trennt. Die Scheitelfläche zerfällt dadurch in zwei seitlich dieser Crista liegende Facetten, zwischen welchen sich von vorn her eine rhombische Stirnfacette einschiebt, die man sonst nur an Carnivoren und etwa gelegentlich an Omnivoren (*Merycopotamus* u. s. f.) anzutreffen pflegt. Leider ist alle Spur der Coronalnaht erloschen; immerhin wird man kaum zweifeln dürfen, dass dieselbe wie bei allen Wiederkäuern hinter den Augenbogen in mehr oder weniger querer Richtung verlief.

Auch der Uebergang der Schädeloberfläche in die Schläfe ist eigenthümlich genug. Obschon die Schläfengrube nach oben vollständig offen liegt, so ist sie doch von der Scheitelfläche geschieden durch eine den Rand jener Parietalfacetten bildende sehr merkliche Crista, die nach vorn hin immer stärker vortritt, um endlich in den

Augenbogen überzugehen. Die erwähnten Facetten der Scheitelfläche sind also nicht wie bei Carnivoren und Omnivoren von der Schläfenmuskulatur bedeckt zu denken. Der Schläfenmuskel wird nicht über die obere Schläfenkante hinaus geragt haben, und jene Facetten sind nicht Muskelgruben, sondern nur durch Abplattung und Verdünnung des Hirndachs, mit gänzlicher Unterdrückung aller diploëtischen Hohlräume entstanden. Linkerseits, wo das knöcherne Hirndach abgenützt ist, sieht man sogar recht deutlich die Windungen des Gehirns an dessen Steinkern zum Vorschein kommen. Die Decke der Gehirnkapsel ist also in ihrem oberflächlichen Theil ausserordentlich dünn und nur in der Mittellinie und an den supratemporalen Rändern zu vorstehenden Kanten verstärkt. Vor den Augenhöhlen bietet die Oberfläche des Gesichtsschädels nichts von Wiederkäuern Abweichendes.

So fremdartig diese Facettirung der Frontal- und Parietalzone an einem Schädel, den wir bereits aus allgemeinen Gründen der Ziegenfamilie zugewiesen haben, sein mag, so ist doch ersichtlich, dass solche Verhältnisse unter Wiederkäuern nicht ohne alles Beispiel sind. Ob die Coronalnaht quer verlief wie etwa bei Tragulina und bei Lama's, oder ob sie einer Richtung folgte wie beim Kameel, ist nicht sehr erheblich. Eher möchte ich vermuthen, dass sie quer verlief, da ja die von der Coronalnaht zu kreuzenden Cristae nicht Schläfencristae sind. Die eigentlichen Schläfencristae aber bilden an dem Fossil trotz der seitlichen Lage der Schläfengruben nur eine Verstärkung dessen, was bei Tragulina, ja schon bei hornlosen Hirschen, Moschus etc. oder gar schon bei Dicotyles angedeutet ist und unter Wiederkäuern zu sehr ähnlicher Ausbildung gelangt bei Portax. Man müsste sich bei Portax die Schädeloberfläche erstlich hornlos, und überdies durch eine mediane und nach vorn sich gegen die vordern Augenhöhlenränder gabelnde Sagittalerista complicirt denken, um eine Parallele mit dem Verhalten an dem fossilen Thiere zu gewinnen. Hiefür ist allerdings vollkommene Hornlosigkeit eine allererste Bedingung. Eine viel weiter liegende Parallele für die Abflachung der Schädeloberfläche und die Gestaltung der Schläfengrube könnte auch bei der hornlosen Giraffe der Tertiärzeit, *Helladotherium*, gefunden werden.

Auch für die riesige Ausdehnung der *Bulla ossea* lässt sich schwerlich eine Parallele unter heutigen Wiederkäuern aufführen, indem dieselbe bis in die Flucht des Gaumens hinabreicht und selbst über das Maass von Tragulina hinausgeht. Immerhin ist zu beachten, dass unter manchen Wiederkäuern, und namentlich bei Ziegen die *Bulla ossea* überaus grossen Veränderungen der Grösse im Verlauf des Wachsthumes ausgesetzt ist, und dass sie an noch hornlosen Zicklein das Maass von *Tragulus* fast noch übertrifft, während sie an alten Thieren bis auf höchst geringe Grade zusammenschmilzt.

Vom Gebiss ist leider der hier wichtigste Theil, die Schneidezähne, unbekannt. Dagegen ist die Maxillar- und die Mandibularreihe fast vollständig erhalten. Die erstere hat eine Ausdehnung von 140 Millimeter, die Molaren für sich 85 Mm., die Praemolaren 55 Mm., Länge der Molarreihe etwa 6%, Praemolaren etwa 4% der ganzen Ausdehnung der Zahnreihe. Das bezeichnendste Merkmal der Zähne besteht, wie schon gesagt, in der schon durch die Höhe der Kiefer bedingten ausserordentlichen Höhe der Zahnsäulen. Schon dies unterscheidet sie wesentlich von Rindszähnen. Gleichzeitig sind die Zahnprismen so wenig wie bei heutigen Thieren mit exquisit hypsodontem Gebiss (Ziegen, Schafe, Pferde) gerade gestreckt, sondern merklich gebogen und überdies schief gestellt, so dass im Ober- und im Unterkiefer die Zähne sich von vorn und von hinten her einer Mittellinie zuneigen, die zwischen den Molaren und Praemolaren liegt. Die Zähne sind, vornehmlich im Oberkiefer, bis zur Kaufläche von einer dicken Cementkruste eingehüllt, so dass die Falten des eigentlichen Zahnkörpers nur zunächst dem Kaurand zum Vorschein kommen. Im Détail des Baues weichen sie von Rindszähnen sehr ab und verhalten sich wie bei Ziegen und Schafen. Sowohl am Ober- als am Unterkiefer sind sie compresser als bei Rindern und an der Innenwand von mandibularen, an der Aussenwand der maxillaren flacher, mit einfacherer Fältelung versehen als bei Rindern. Es sind fast nur die beiden Randfalten, welche vorstehen, während die Zahnprismen selbst fast platt erscheinen. An Unterkieferzähnen treten die Prismen der Aussenwand kantig hervor wie bei Schafen und Ziegen. Accessorische Säulchen fehlen sowohl oben als unten. An den untern Praemolaren ist die hintere Zahnhälfte im Vergleich zu der vorderen ansehnlicher entwickelt als bei Rindern, ähnlich dagegen wie bei Schafen und Ziegen. Vordere Compressionsfalten der unteren Molaren, wie sie den Schafen so allgemein zukommen, sind nicht da. Die Ausdehnung der Praemolarreihe im Vergleich zu der Molarreihe ist grösser als bei Schafen und verhält sich wie bei Ziegen \*).

Nach so specieller Beschreibung des Fossils ist es entbehrlich, nochmals auf den vorher erörterten allgemeinen Gesichtspunkt zurückzukommen. So neu die Erscheinung einer hornlosen Ziege mit einem Schädel von der Grösse wie bei Rindern sein mag, so führte der negative Weg, durch Ausschluss, so gut wie der positive durch Confrontirung mit heutigen Parallelen immer bestimmter auf die Ovina oder Caprina als die einzige Structur, die als Rahmen für die Merkmale des sivalischen Fossils dienen könnte, und selbst innerhalb dieses Rahmens fielen die kleineren Details vielmehr auf

---

\*) Die Unterschiede im Gebiss von Ziegen und Schafen habe ich besprochen in der Fauna der Pfahlbauten pag. 124 u. f.

Seite der Ziegen als der Schafe. Dünne, diploëlose Beschaffenheit der Schädelkapsel, langgestreckte Parietalzone, hohe Lage des Thränenbeins über der Massetercrista, vollständiges Fehlen von Thränengrube, ziemlich rasche Zuspitzung des Gesichtsschädels, dies Alles, nebst den eben erwähnten Détails des Zahnbaues lässt die Wagschaale vielmehr auf Seiten der Ziegen als der Schafe fallen. Am wenigsten wird aus der für Ziegen ungewohnten Grösse des Schädels ein Einwand gegen dieses Endergebniss gefunden werden können\*). Erreichen doch noch in unsern Tagen, wie manche neuern Reiseberichte lehren, mehrere Schafe der Argaligruppe die Körperhöhe von Rindern. Und können uns andererseits manche heutigen Vertreter solcher Thiere, wie *Budorcas*, *Ovibos*, *Ibex* warnen, grosses Volum des Schädels von vornherein als Anzeichen grossen Volums des ganzen Körpers anzusehen.

Der Name *Bucapra*, nach dem Vorbild von *Budorcas* gebildet, scheint mir daher den neuen sivalischen Wiederkäuer nicht unpassend zu bezeichnen, obschon er mit Rindern nur die Grösse des Schädels theilt, und wenn ich an diesen Fund den Namen von Herrn William Davies knüpfe, der ihn aus seiner harten Hülle befreit hat, so möchte ich damit nicht nur dem Gefühl persönlicher Dankbarkeit für unermüdliche Hülfe bei meiner Arbeit, sondern auch der Hochachtung Ausdruck geben, mit welcher mich die Einsicht in dessen langjährige und überaus grosse Verdienste, zunächst um die ihm anvertraute unschätzbare Sammlung, aber hiedurch auch um die gesammte Palaeontologie erfüllt hat. Diese nach Maass zu würdigen, bedarf es freilich schon einer nähern Kenntniss sowohl der Anforderungen, welche ernste Wissenschaft an die Pflege einer Sammlung wie die des Britischen Museums stellt, als der Hemmnisse, welche ihr an so vielen Orten aus Leitfäden anderer Art erwachsen.

---

\*) An einem Gypsabguss des Gebisses von *Capra Rozeti* Pomel, von Malbattu bei Issoire. (Brit. Mus. No. 27626) beträgt die Ausdehnung der obern Molaren 80 Mm., nahezu so viel als an dem sivalischen Schädel.



## Bovina.

Schon in meinen früheren Arbeiten über Wiederkäuer — und es gehörte dies wohl zu einem der allgemeinsten und sichersten Ergebnisse derselben — wurde die Gruppe der Rinder in ihrer heutigen Erscheinung im Vergleich zu den übrigen Wiederkäuern als eine Art von Grenzpunkt der gesammten Familie bezeichnet. Anatomisch vor allem charakterisirt durch ganz ausnahmsweise Ausdehnung der Stirnzone auf Kosten der Scheitelregion des Schädels und zu Gunsten einer fast extracranialen Einsetzung der Hörner, erscheinen sie auch geographisch in dem grossen Verbreitungsbezirk der Wiederkäuer im Allgemeinen höchst eigenthümlich vereinzelt und fast inselartig eingestreut. Eine Bisonart ist ihr einziger Vertreter in der gesammten Neuen Welt, und auch dort auf deren nördliche Hälfte eingeschränkt. Eine davon nur wenig abweichende Art nebst dem Grunzochsen sind die einzigen heute noch lebenden wilden Rinder in der nördlichen Hälfte der Alten Welt. Die wilden Rinder Afrikas beschränken sich auf das Genus Bubalus, und trotz des ungeheuren Gebietes, das sie bewohnen, erscheint es gewagt, unter denselben mehr als etwa zwei, d. h. die beiden extremsten Formen, als besondere Species zu unterscheiden. Einige Manigfaltigkeit, aber wiederum weit mehr oberflächlicher Art, durch Zerspaltung in allerhand Varietäten, als durch tiefer greifende Verschiedenheiten der Organisation verwirklicht, weist nur Süd-Asien auf.

Aber auch da beläuft sich bei näherem Zusehen der ganze Vorrath erstlich auf zwei Büffel: die Zwergform Anoa, auf einige Inseln des östlichen Archipels beschränkt, und die mächtige Gestalt des Arni, als wildes Thier wohl nur noch dem Continente angehörig, und beide unter sich sowohl als von den afrikanischen Büffeln bis zu Merkmalen von Genus-Werth verschieden; zweitens, theils auf Indien eingeschränkt, theils bis auf die Sundawelt verbreitet, die Vertreter des Genus Bibos, welche wiederum trotz zahlreicher Varietäten wohl nur in den zwei extremsten Formen bis zum Werth von Species auseinanderweichen. Selbst unter Beifügung des über Europa, Westasien

und Nordafrika, aber wieder in einer einzigen Species einst in wildem Zustand ausgebreiteten Stammes *Taurus* steigt also die Gesamtzahl der wilden Rinder nicht höher als auf sieben Genera mit zehn Arten, von welchen letztern vier der nördlichen, sechs der südlichen Hemisphäre zugewiesen werden können.

Bringt man dabei das Maass in Anschlag, in welchem diese Gestalten sich von dem allgemeinen Plan des Hornträgers entfernen, so ist es nicht wenig lehrreich, dass die demselben am nächsten gebliebene Gestalt des Büffels durch vier, die schon weiter abweichende Form der *Bibovina* durch drei (bei Einschluss von *Poëphagus*), die Bisonten durch zwei, und der offenbare Gipfelpunkt der Reihe, *Taurus*, durch eine einzige Species vertreten ist. Süd-Africa und in noch höherem Maass Süd-Asien scheinen also die Stellen zu sein, wo die Kraft, welche diese besondern Thierformen schuf, ihre Phantasie und ihre Energie, gesetzt auch, dass sie nicht von hier ausgegangen sein sollte, doch am frischesten bewahrt hat, während die entferntesten Umbildungen wie vereinzelte Ausläufer nach Norden und Nordwesten ausgestossen sind.

Die nicht sehr reichlichen Winke, welche von Seiten der Palaeontologie auf diese dem Anschein nach so einfache Auffassung der Geschichte der Form des Rindes fielen, sind zusammengestellt in den Tableaux meiner früheren Monographie desselben (Natürliche Geschichte des Rindes, Zweite Abtheilung, Pag. 52, 67, 170), wo ich die lebenden und die mir damals ausreichend bekannten fossilen Arten des Rindes sowohl nach morphologischer als nach geologischer Reihenfolge zusammenzustellen suchte. Für die Büffel ergab sich daraus ein altes, schon durch pliocene und miocene Formen vertretenes Quellgebiet in Indien, das durchaus im Sinne der oben gegebenen Darstellung sprach. Aermere und unsicherer fiel die Auskunft aus für die Bisonten, insofern die sowohl in morphologischem als in geologischem Sinne primitive Form eher auf einen Ausgang von der westlichen als der östlichen Hemisphäre hinzuweisen schien. Die neue Arbeit von Allen\*), welche auf viel reichlicheres Material gestützt den *Bison latifrons* als eine sehr bestimmte Species und zwar als eine Stammform für die übrigen Bisonten darstellt, würde zu derselben Anschauung führen. Am unerwartetsten war das Ergebniss für die *Bibovina*, indem sich im Pliocen Europas, namentlich in Toscana, ein Typus von Rind vorfand, der sich nach Structur des Schädels wie eine Wurzel für diese gegenwärtig auf Indien beschränkte Gruppe verhielt, während umgekehrt aus dem Pliocen von Indien eine Form von *Taurus* namhaft gemacht wurde,

---

\*) J. A. Allen, The American Bisons. Mem. of the Museum of comparative Zoology. Vol. IV. No. 10. 1876.

welche die ohnehin culminativen Merkmale dieser Gruppe bereits so ausgesprochen an sich trug wie der im Pleistocen von Europa so reichlich verbreitete *Bos primigenius*.

Ich beabsichtige nicht, in der gegenwärtigen Schrift die lebenden Rinder nochmals zur Sprache zu bringen. Trotz reichlicher Erweiterung des Gesichtskreises seit der früheren Arbeit würde ich der daselbst gegebenen Darstellung nichts Wesentliches beifügen können \*). Die Anschauungen, die ich den früher geäusserten etwa beizufügen wünschen könnte, werden sich ergeben aus der kurzen Recapitulation der Schädelmerkmale der Rinder, womit ich die hier beabsichtigte Darstellung einer Anzahl von fossilen Rindern einzuleiten für nöthig finde.

Auf palaeontologischem Boden sind als charakteristische Merkmale der Rinder im Vergleich zu den übrigen Cavicornia zu nennen: Bedeutende Körpergrösse. Bleibt auch Anoa in Statur fast unter dem durchschnittlichen Maass von Antilopen oder Schafen stehen, und erreichen diese beiden letzten Gruppen in mehreren Formen wie etwa Oreas, Argali etc. die Mittelgrösse der Rinder, so vertreten doch ohne Zweifel die Rinder im Ganzen den Gipfelpunkt von Stämmigkeit und Körperwucht, zu welchem es die Cavicornia, ja man dürfte trotz der Riesengestalten des Elen und der Giraffe sagen, die Wiederkäuer gebracht haben. Dies ins Einzelne von Thatsachen oder von Tragweite zu verfolgen, ist hier nicht der Ort. Die Bewaffnung des Arni oder des Cap-Büffels, die massiven Hufe, die schweren Wammen, welche manchen Rindern zukommen, sind beredter Ausdruck von der Macht und dem Luxus, womit an so stämmigen Thieren nur Hautgebilde aufzutreten vermögen, und das nicht weniger luxuriöse Gebiss deutet genugsam auf das Aequivalent von Arbeit, das zum Aufbau und zur Erhaltung solcher Körpermassen nöthig ist. Sind auch bei Schafen die Zahnsäulen im Verhältniss zur Grösse des Schädels noch ausgedehnter als bei Rindern, so wird man doch zugeben, dass das gesammte Gebiss der Rinder, von den Schneidezähnen bis zu den Backzähnen, und letztere nicht nur nach Volum des ganzen Zahnkörpers, sondern auch nach Leistungswerth complicirter Art, nach Plicidentie das mächtigste

---

\*) Besonders lehrreich war mir die Durchsicht der reichen Sammlungen, welche in den letzten Jahren hauptsächlich durch Dr. Morice aus Cochinchina in die Museen von Lyon und Paris gelangt sind. Sie erhöhten in nicht geringem Grad den Eindruck, den ich schon früher bei Durchgehung der Materialien des Reichs-Museums in Leiden von der wunderbaren Elasticität in der Gestaltung der Schädelform von *Bos sondaicus* und *Bos Gaurus* gewonnen hatte. Die offenbaren Belege von Kreuzung zwischen diesen zwei Formen sind wohl nicht minder bedeutsam. Eine kurze Mittheilung darüber findet der Leser im Anschluss an meine Notiz „Ueber Prof. M. Wilkens' *Brachycephalus*-Race des Hausrindes“. Verhandl. d. naturforsch. Gesellschaft in Basel VI. 3. 1878.

aller Kauorgane unter Wiederkäuern darstellt. Reichlich und charakteristisch genug spiegelt sich dies Alles im Detail ab in der mächtigen Ausdehnung aller Flächen für Musculatur, am Schädel also vornehmlich der Nacken- und Kaumusculatur.

Noch typischer, wenn auch wohl nicht ganz unabhängig von diesem Maximum von Körperwucht, ist die besondere Architektur des Schädeldachs. Das Stirnbein gelangt hier zu einer Ausdehnung, die nicht nur unter Cavicornia oder unter Wiederkäuern, sondern geradezu unter den bis jetzt bekannten Säugethieren einen Schlusspunkt bildet. Es überdacht nicht nur Gehirn- und Augenhöhlen, sowie einen Theil der Riechhöhle, sondern schliesslich selbst ausgedehnte, sonst freiliegende Muskelgruben, wie Schläfe und Hinterhaupt. Die Parietalzone ist dadurch auf die Occipitalgegend, und die Hornansätze sind soweit als möglich rück- und auswärts von den Augenhöhlen auf das Schläfendach hinausgedrängt. Die Hörner sind meist seitwärts gerichtet, der Horndurchschnitt cylindrisch oder von vorn nach hinten abgeplattet, häufig dreieckig.

Geringere Grade solcher Tendenz zu excessiver Ausdehnung des Stirnbeins äussern sich allerdings schon bei manchen Antilopen. In longitudinalem Sinn bei *Catoblepas* und *Alcelaphus*, in transversalem Sinn bei ersterem Genus und bei *Portax*, in weit schwächerem Maass unter Schafen bei *Budorcas* und *Ovibos*. Für Rinder ist sie aber von *Anoa* bis zu *Gaurus* und *Taurus* durch alle Altersstufen so ausgesprochen, dass sie billig auch als Maassstab für Begrenzung der kleinern Gruppen verwendet wird. Als solche sind schon früher bezeichnet worden\*):

1. *Bubalina*. Die Ausdehnung der Stirnbeine bleibt auf dem geringsten Grad unter Rindern stehen. Die Parietalzone liegt also noch relativ frei. Der Hornansatz ist der Mittellinie des Schädels noch angenähert und die Hörner sind nach rückwärts gerichtet; sie sind dabei abgeplattet, meist dreikantig. Der Gesichtsschädel kann dabei hoch und kurz ausfallen und die Schädelachse gestreckt bleiben, wie bei den africanischen Büffeln, oder er ist, bei den asiatischen, mit mehr geknickter Schädelachse, lang und niedrig, was sich, wie früher gezeigt worden, am meisten in der Ausdehnung des Choanenrohrs verräth.

2. *Bibovina*. Die Stirnfläche dehnt sich nach hinten in querer Richtung in einen mächtigen diploëtischen Frontalwulst aus und wird so oft dreieckig. Die

---

\*) Für Darstellungen verweise ich im Allgemeinen auf die mit der Lucae'schen Tafel gezeichneten und also auf strenge Correctheit und Vergleichbarkeit Anspruch machenden Holzschnitte und Abbildungen in der früheren Monographie, sowie in den noch ältern Arbeiten über diesen Gegenstand (Fauna der Pfahlbauten. Art und Race des zahmen europäischen Rindes.) Die Wurzelform unter lebenden Büffeln, *Anoa*, ist dargestellt in unserer Tafel VII. Fig. 6. 7.

Hörner, in der Jugend nahe an der Mittellinie wurzelnd und nach hinten gerichtet, wenden sich erst mit dem Alter mehr seitwärts und sind meist mehr oder weniger abgeplattet. Die Parietalzone ist in der Jugend noch selbstständig und wird erst allmählig durch die stete Ausdehnung der Frontalzone über diese hinaus und in den Bereich der Occipitalzone verdrängt\*).

Sucht man unter Bibovina nach ähnlichen Wurzelformen, wie sie Anoa für Büffel bietet, so drängt sich Portax, obwohl wir dieses Thier, und mit allem Recht, Antilope zu nennen pflegen, unwillkürlich auf. Eine Verkürzung der Frontalzone von Bibos mit gleichzeitiger Unterdrückung des Frontalwulstes, der Art, dass der Hornansatz den Augenhöhlen genähert, und das Scheitelbein, wie es allerdings bei dem jungen Gaur der Fall ist, ohne auf die Occipitalzone überzugreifen, mit als Dach der Hirnkapsel dienen würde, würde zu der Form von Portax führen. Ja noch mehr. Man kann nicht verkennen, dass zwischen Portax und die Jugendform von Bibos, nur abweichend durch stärkere und der Mittellinie des Schädels mehr genäherte Hornwurzeln, sich *Bos etruscus* eindrängt\*\*). Portax, *Bos etruscus*, *Bos sondaicus* und *Gaurus* bilden so eine morphologische Reihe, deren Gradation bezeichnet ist durch immer weiteres Rückgreifen der Stirnbeine über einen erst selbstständigen und gestreckten, dann immer mehr nach hinten abfallenden und endlich gänzlich in die Hinterhauptsfläche eingehenden Parietalschädel. Die verschiedene Einpflanzung der Hörner, weit auswärts, fast supraorbital bei Portax, der Mittellinie nahe bei *Bos etruscus*, *Bos sondaicus* und selbst noch bei dem jugendlichen Bibos, kann den Eindruck dieser Reihenfolge nicht verwischen.

3. *Bisontina*\*\*\*). Die Schädelachse ist sehr wenig gebogen. Der Schädel ist depress, mit flacher und breiter und relativ kurzer Stirnzone und vollständig marginaler Einpflanzung der Hörner in geringer Entfernung hinter den Augenhöhlen. Die Parietalzone, kurz und breit, macht sich immer noch als selbstständiger Schädelabschnitt bemerklich. Der Gesichtsschädel ist kurz, mit hoher Maxillarfläche, breiten und kurzen Nasenbeinen und rasch zugespitztem Incisivtheil.

\*) Ueber Altersmetamorphosen von Bibovina giebt ausser den früher mitgetheilten Zeichnungen nach Salom. Müller unsere Fig. 4. 5. Taf. VII. lehrreichen Aufschluss an einem jugendlichen Schädel (vermuthlich 10—12 Monate alt) des Gaur im Basler Museum, den ich den Bemühungen eines früheren Schülers, des Herrn Ad. Spitteler aus Liestal verdanke. Mein Ansuchen an Herrn Spitteler, der seit Jahren in Indien lebt, mir junge Schädel von Gaur zu verschaffen, hat derselbe durch eigenhändiges Erlegen solcher Thiere beantwortet.

\*\*) S. Fig. 3 Taf. VII. und die Abbildungen in der früheren Monographie.

\*\*\*) Fig. 9. Taf. VII. gibt die Darstellung eines jungen Thieres. An Abbildungen erwachsener fehlt es in der Litteratur nicht.

4. *Taurina*. Sie führen die Merkmale des Rindes zu ihrem Gipfelpunkt. Die Stirnzone erreicht sowohl in querer als in longitudinaler Richtung das Maximum von Ausdehnung. Die Hornwurzeln sind dadurch so weit als möglich nach aussen und nach hinten verlegt; die Parietalzone ist gänzlich in den Bereich des Hinterhauptes verdrängt, und zwar nicht nur durch allmähliges Uebergreifen der Frontalzone im Verlauf des Wachsthum, sondern von so früher Jugend an, dass dieses Verhalten dem Aufbau der Gehirnkapsel von Anfang an das wesentlichste Geleise vorschreibt. Erheblichen Antheil an der Umhüllung des Gehirns, von der Hinterwand der Hirnkapsel abgesehen, nimmt also die Scheitelzone niemals. Immerhin ist sie in der Jugend überaus viel ausgedehnter als im erwachsenen Alter und bildet sogar eine Zeit lang zwischen Sutura coronalis und deltoidea eine sehr kurze und quere Zone von einiger Selbstständigkeit, den letzten Rest der Zone, welche bei Anoa oder auch bei Portax an der Umhüllung des Gehirns noch nahezu so stark betheiligt ist als die Stirnzone.

Diesem Jugendzustand von *Taurina* bleiben in Bezug auf die Rolle der Parietalzone, abgesehen von den Veränderungen im übrigen Schädel, Verkürzung, Ausdehnung in querer Richtung und Abplattung, die *Bisontina* gewissermassen zeitlebens treu.

Insofern würden die *Bisontina* als ein Seitenspross der *Taurina*, auf deren Jugendform mit ihnen verbunden und des Weiteren in ein neues Geleise von Entwicklung übergeführt, erscheinen können. Umsomehr, als auch andere Jugendmerkmale von *Taurus*, die kurze und rasche Zuspitzung des Gesichtes, die dadurch bedingte fast dreieckige Form der Nasenbeine und dergleichen den Bisons zeitlebens anhaftet.

Sehr ähnlich fällt das Urtheil aus über ein ferneres Glied der Familie der Rinder, über den durch eine einzige, aber wie es scheint, grossem Wechsel unterworfenen Species vertretenen Yak, das Genus *Poëphagus*.

Nach dem Bau des Schädels sollte man geneigt sein, *Poëphagus* als eine Mittelstufe zwischen *Taurus* und *Bison* einzuschalten. Leider fehlt mir die Kenntniss der Jugendform des Yaks. Der Gehirn-Schädel des erwachsenen Thieres bleibt aber in mancher Beziehung ebenfalls der Jugend von *Taurus* parallel. Die Parietalzone ist noch kürzer als bei *Bison*, aber immerhin bildet sie noch einen Gürtel, der oberflächlich hinter der Stirnzone gelegen, sich in die Schläfengrube hinabbiegt und den Frontalwulst von der Hinterhauptsfläche abtrennt \*). Auch der übrige Schädel des Yak stellt ihn

---

\*) Eine Abbildung hievon wird ein Holzschnitt im weitem Verlauf dieser Arbeit geben. Ueber den Gesamtschädel siehe die Holzschnitte Pag. 110 und 112 in Natürl. Gesch. des Rindes. II. Abth.

in die Mitte zwischen Taurus und Bison. Die Stirnzone ist kürzer und breiter als bei Taurus, aber nicht so kurz und breit wie bei dem Bison; die Augenhöhlen treten weiter vor als bei Taurus, aber weniger als bei Bison. Der Gesichtsschädel erreicht die Länge und im Intermaxillartheil die Breite wie bei Taurus, aber er bleibt niedrig und breit, und die Nasenbeine behalten trotz erheblicher Länge die dreieckige Gestalt wie bei Bison.

Hiemit weicht allerdings mein dormaliges Urtheil über den Grunzochsen merklich ab von der Ansicht, die ich in der frühern Besprechung dieses Thieres (Natürliche Geschichte des Rindes Pag. 107) geäußert habe. Ohne die Beziehungen zu Taurus zu verkennen, legte ich damals besonderes Gewicht auf diejenigen zu dem weiblichen Banting. Die letztere stelle ich noch jetzt nicht in Abrede, wie mir diese Form von Rind in morphologischer Beziehung noch immer wie eine Mutterlauge für die übrigen asiatischen Rinder im engern Sinn erscheint. Immerhin entnehme ich der seither gewonnenen reicheren Bekanntschaft mit den Altersmetamorphosen der Bibovina einerseits, mit dem Formeninhalt des Yak andererseits, von dem mir zwar nicht junge, aber doch Schädel verschiedenen Alters und namentlich auch hornlose vorliegen, wohl nicht mit Unrecht, dass die Beziehungen zu Taurus doch nähere und innigere sind, als diejenigen zum Banting; ich möchte sogar den zuerst von Turner auf Schädelvergleichung gestützten Gedanken nicht ganz abweisen, dass der Yak ein Bindeglied zwischen Taurus und Bisonten bilden könnte.


Keinen Zweifel hege ich bezüglich des sogenannten Zebu's, *Bos indicus*, den ich schon früher als einen Descendenten des Banting bezeichnete. Ueber den Formeninhalt dieses nur im zahmen Zustand bekannten Rindes, das allem Anschein nach so ziemlich alle Haustierrassen Asiens und Africas von älterem Datum als der europäische Import geliefert hat, ist mein Gesichtskreis seit der frühern Arbeit ebenfalls um Vieles erweitert worden. Die Zutheilung dieses Thieres zu der Familie des Banting hat dadurch nur neue Stützen erhalten, wenn auch dies Hausthier in Statur, sowie an Gestaltung und Wehr des Schädels von den Zwergfiguren in Japan bis zu den riesigen Sanga-Rindern Mittel-Africas kaum in weniger weiten Grenzen schwankt als die zahmen Abkömmlinge des Primigenius-Ochsen. Erreicht doch an einem Sanga-Schädel der hiesigen Sammlung die Ausdehnung des Frontalwulstes sowohl seitlich, zum Tragen der weit ausserhalb des Schädels anhebenden Hornzapfen, als rückwärts über die Occipitalzone hinaus Grade, die hinter den stärksten Verhältnissen der Art an dem fossilen Primigenius nicht zurückbleiben. Und doch ist die Physiognomie des Zebu dadurch kaum verwischt worden.

Ueber die Beziehungen des Zebu zu der ebenfalls nur im zahmen Zustand, also

auch nicht fossil bekannten *Brachyceros*-Form des Hausrindes von Europa und Nord-Africa habe ich einige nicht unbedeutende Thatsachen mitgetheilt in den Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel VI. 3. 1878. Pag. 514.

Bibovina, Bisontina und Taurina sind also unter sich weit enger verbunden als mit den Bubalina. Sie bilden eine lang- und ursprünglich schmalstirnige, eine kurz- und breitstirnige und eine lang- und breitstirnige — mit oberflächlicheren Prädikaten eine hohl-, gewölbt- und flachstirnige Gruppe von Rindern im engeren Sinn des Wortes, von welcher sich die Büffel von der Antilopen-ähnlichen Anoa bis zu dem an Merkmale von *Taurus* streifenden Arni in allen Détails von Schädelbau so sehr unterscheiden, dass man jene drei Gruppen von Rindern nur als eine Parallele und nicht als eine Weiterbildung der Büffel bezeichnen kann. Von Wurzelformen der Rinder, die von deren Endpunkten so weit oder noch weiter abliegen als Anoa vom Arni, etwa einem *Probibos*, war schon bei Besprechung der Antilopen die Rede und wird nochmals bei den im Ferneren zu besprechenden fossilen Rindern die Rede sein.

Nach den in der früheren Schrift befolgten Prinzipien könnte man die gegenseitigen Beziehungen der heute lebenden Formen in morphologischer Absicht etwa folgendermaassen gruppieren:



So unvollkommen auch das Hilfsmittel solcher Tableaux sein mag, so trägt es doch dem unserer Anschauung zu Grund gelegten Gesichtspunkt Rücksicht. Wenn der Grad der Ausdehnung der Stirnzone als Grundlage einer morphologischen Grup-



pirung der Rinder gelten kann, so ist offenbar, dass die starke postorbitale Ausdehnung der Stirn und die Neigung zu Bildung eines durch diploëtische Sinus ausgedehnten Frontalwulstes die hohlstirnigen Bibovina und die flachstirnigen Taurina doch in eine Reihe bringt, die über die kurz- und gewölbtstirnigen Bisontina hinausgeht. Dehnt sich doch bei der hornlosen Form der Taurina, den sogenannten Galloway-Rindern, so gut wie bei den noch hornlosen Jugendstadien des Rindes die Stirnzone viel weiter über die Parieto-Occipital-Zone aus als selbst bei erwachsenen Bisonten. Will man den Grad der Ausdehnung des Parietalschädels der Gruppierung zu Grunde legen, so muss man freilich zugeben, dass bei jungen Bibovina derselbe überaus viel gestreckter und selbstständiger erscheint, als auf gleichen Altersstufen von Bisontina und Taurina. Die Altersmetamorphose durchläuft also bei Bibos eine längere Bahn und beginnt mit primitiveren Stadien als in dem mehr zusammengedrängten Formencyclus von Bison und Taurus. Dies einigermaßen überblicklich darzustellen, ist auch die Absicht des Tableau. Eine Lücke, die ich freilich noch nicht auszufüllen vermag, lässt dasselbe immerhin offen: die Frage über den Faden zwischen Bibovina und Taurina.

---

# Fossile Rinder.

## A. Bubalina.

### 1. Probubalus (Hemibos Falconer) triquetricornis. Rütim.

Normale Form: *Männlich*, Fig. 1. 2. Taf. VII. Britisches Museum Nr. 39563.

$\frac{1}{4}$  nat. Grösse. Derselbe Schädel in  $\frac{1}{3}$  natürl. Grösse in Fig. 1. 2. Taf. I. der *Natürlichen Geschichte des Rindes*. Abth. II. 1876. — Fig. 1. 2. Taf. IV. Br. M. Nr. 23109.  $\frac{1}{3}$  nat. Gr.

*Weiblich*, Fig. 1. 2. Taf. I. Br. M. Nr. 16173.  $\frac{1}{3}$  nat. Gr.

Trochoceros-Form: Fig. 3. 4. Taf. I. Br. M. Nr. 36665.  $\frac{1}{3}$  nat. Gr. —

Fig. 11. Taf. VI. Br. M. Nr. 48031.  $\frac{1}{3}$  nat. Gr.

Aceros-Form: Fig. 1—3. Taf. II. Br. M. Nr. 48033.  $\frac{1}{3}$  nat. Gr.

Schon in meiner früheren Abhandlung (Pag. 23) habe ich dieses von Falconer zuerst beschriebene sivalische Rind als eine Art von Grundform zunächst der Büffel bezeichnet und auf dessen nahe Beziehungen zu dem noch lebenden Zwerg-Büffel (Anoa) von Celebes aufmerksam gemacht. Die Aehnlichkeit zwischen beiden Formen erschien mir sogar so gross, dass ich nicht anstand (Pag. 52), dafür den gemeinsamen Namen Probubalus (*sivalensis* und *celebensis*) vorzuschlagen.

Die damalige Besprechung stützte sich, ausser der Bekanntschaft mit den wenigen im Britischen Museum zur Schau aufgestellten Originalien, hauptsächlich auf einen Gypsabguss allerdings eines der besterhaltenen Schädel, sowie auf briefliche Mittheilungen meines Freundes Falconer. Die gegenwärtige Darstellung beruht auf viel ausgedehnterer Grundlage, nämlich auf dem Studium von nicht weniger als etwa 24 Schädeln des Britischen Museums, welche ich sämmtlich einer und derselben Species einverleibe.

Man wird erwarten, dass so ausgedehnte Hilfsmittel meine jetzige Aufgabe, im Vergleich zur frühern sehr erleichtert haben werden. Allerdings ist mir kaum von irgend einer lebenden Art wilder Rinder eine so grosse Anzahl von Schädeln gleichzeitig zur Verfügung gestanden. Dennoch muss ich gestehen, dass Schwierigkeiten aller Art sich gerade an diesen Umstand knüpften. Einmal waren es diejenigen, welche in der Regel der Untersuchung von Fossilien anhaften, wie Unsicherheit der Umrisse, Quetschung und Fragmentirung der Objecte, von Gewicht und Volum derselben auch ganz abgesehen.

Ernsthafter waren solche, die gerade aus dem grossen Reichthum von Material erwachsen. Traten doch, neben mehr oder weniger bekannten oder typischen Formen andere hervor, von denen man beim ersten Anblick fragen musste, ob sie überhaupt nur Rindern angehören möchten.

Diese Modificationen erwiesen sich als zweierlei Art. Erstlich solche, die zu dem nothwendigen und normalen Formenkreis eines Säugethieres gehören konnten, wie etwa Verschiedenheit in Geschlecht und Alter. Die Entscheidung darüber war relativ leicht, insofern sie sich auf die Vergleichung mit analogen Unterschieden an lebenden Rindern stützen konnte, worüber es mir allerdings an Anhaltspunkten keineswegs gebrach.

Viel schwerer war es, eine Anzahl von Abweichungen zum Theil von geringerer, zum Theil von stärkerer Wirkung als die vorigen zu beurtheilen, die sich derart nicht erklären liessen. So nahe es liegen mochte, solche Fälle mit besondern Namen von Species zu bezeichnen, so schien mir davon wenig Belehrung abzufallen. Auch ohne die eindringlichen Lehren, welche mir aus dem Studium heutiger verwandter Thiere seit Jahren zugeflossen waren, erschien mir auch an dem jetzt vorliegenden Material die Frage nach Species nur in der letzten Linie zu stehen. Wichtiger schien mir zu sein, den Formenkreis, der sich als Peripherie um besondere typische Gestalten anreihete, vorerst als ein Ganzes zu betrachten, und erst des Weitern für Abweichungen von als central erkannten Formen sich nach physiologischen oder biologischen Motiven umzusehen, bevor die Frage erwogen wurde, ob solche Abweichungen nach einem andern Centrum, oder also einer andern Species oder Genus gravitiren möchten.

Das Ergebniss dieser Kritik war fast durchweg ein in letzterer Beziehung negatives. Ich stehe nicht an, die Gesammtheit der 24 Schädel, von welchen hier zunächst die Rede sein soll, trotz beträchtlicher Variationen in einzelnen Dingen oder in der ganzen Physiognomie als individuelle oder Racen-Variationen einer und derselben Species zu beschreiben. Allerdings erhielt dadurch der Begriff von Species an diesen tertiären Thieren eine Elasticität von ungewohntem Grad, und ich bin wohl gewahr, dass die einzige Stütze für solche Anschauung eine sehr precäre ist. Liegt sie ja in letzter

Linie nur in dem Vertrauen, das man meinem Urtheil auf diesem Gebiete zuschreiben mag.

Dies vorauszusenden, hielt ich mich aus zwei Gründen verpflichtet. Erstlich weil ich nicht nur an diesem Genus, sondern in der Folge dieser Arbeit an noch weniger sicher begrenzten Gestalten mich genöthigt sehen werde, die Thore für Species-Inhalt an tertiären Thieren weit zu öffnen, und überdies die Art der Erhaltung der Fossilien, ihre Menge, sowie äussere Verhältnisse mir nicht gestatten, die Darstellung der verschiedenen Formen mit dem vollen Apparat von Belegen zu umgeben, der auf so neuem Gebiete verlangt werden könnte. Einen guten Theil davon hoffe ich durch Mittheilung von gewissenhaft ausgeführten Zeichnungen zu ersetzen. Auf Messungen und Berechnungen, wie ich sie an dazu bequemeren Objecten in meinen bisherigen Arbeiten mitzutheilen pflegte, musste ich aus vielfachen Gründen grösstentheils Verzicht leisten.

Noch grössere Aufforderung dazu lag in folgender Betrachtung. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die ganze Zahl von Thieren, deren Schädel von Falconer aus einem und demselben Grab gehoben worden sind, über weite Räume zerstreut gelebt hätten. Wir werden uns also mit der allerdings ungewohnten Annahme zu befreunden haben, dass auf relativ engem Raum der sivalische Büffel in einer Mannigfaltigkeit von Gestalt sich erging, für die wir kaum an unsern Hausthieren entsprechende Parallelen finden. Mochte auch sein Formenkreis vielleicht in Gesammtheit nicht grösser ausfallen, als derjenige der beweglichsten Gestalten heutiger wilden Rinder, wie etwa des Sunda-Ochsen oder des afrikanischen Büffels, so müsste man doch, so weit meine Erfahrung reicht, einen guten Theil von Asien nebst der Sundawelt ausbeuten, um für den erstern, einen guten Theil von Africa, um für den letztern einen gleichen Reichthum an individueller Gestaltung auf einen Punkt zu häufen, und es würde schwer sein ein geologisches Ereigniss zu denken, das dies zu Stande bringen könnte. In Bezug auf Umfang verhält sich also das Gebiet, aus dem die unter dem Namen *Probubalus* zu beschreibenden Formen stammen, im Vergleich zu dem Raum, der nöthig wäre, um ähnlichen Reichthum von Gestalt an irgend einem heutigen wilden Rinde zusammenzubringen, wie eine kleine Insel zu einem grossen Continent. Keinen stärkern Eindruck habe ich aus den Kellern des Britischen Museums heimgetragen, als dass der Stoff, aus welchem die jetzt hier begrabenen Geschöpfe sich einst aufbauten, — da wir ja heutzutage Entfaltung solcher Elasticität an weite Zerstreung gebunden sehen — seither um Vieles spröder geworden sei. Man wird also zum Mindesten geneigt sein, die Zeitdauer, welche den sivalischen Büffeln zu Gewinnung solchen Reichthums an Gestalt offen stand, nicht allzu kärglich abzuschätzen. Selbst

diese Betrachtung, da sie sich nur auf die Thatsache stützt, dass die von Falconer im sivalischen Gebiet gesammelten Fossilien aus einer und derselben geologischen Epoche stammen, würde ich zurückgehalten haben, wenn nicht Gaudry an den Wiederkäuern von Pikermi und Kowalewsky bei Besprechung bunodonter Formen tertiärer Hufthiere sich unwillkürlich zu ähnlichen Aeusserungen gedrängt gesehen hätten.

Wenn ich mich nach diesen Vorbemerkungen zu dem Ergebniss der Beobachtung wende, so kann die Darstellung der Merkmale der Species um so kürzer ausfallen, als sie erstlich mit denjenigen des Genus zusammenfallen und zweitens die lebende und die fossile Form schon einmal von mir beschrieben worden sind.

### A. Normal-Form.

Hauptsächliches und somit auch Genus-Merkmal von *Probubalus* im Vergleich zu andern Büffeln ist die grosse Ausdehnung der Parietalzone und die in der Regel fast gleichmässig dreiflächige Gestalt der Hörner. Unter allen bis jetzt bekannt gewordenen Rindern findet sich Aehnliches, mit den besondern Charakteren der Büffel verbunden, nur noch bei *Anoa depressicornis* (Taf. VII. Fig. 6. 7). Auch abgesehen von der früheren Darstellung beider Formen erspart die grosse Verschiedenheit des geologischen Horizontes, dem dieselben angehören, ja schon die sehr verschiedene Körpergrösse ein Eingehen auf deren besondere Merkmale. Die Frontalregion ist bei dem sivalischen Thier wie bei dem lebenden *Anoa* in Folge der nach hinten gehenden Richtung der Hörner langgestreckt und schmal und bildet zwischen dem Hornansatz den höchsten Punkt des Schädels. Die Hornzapfen wurzeln auf meist deutlich ausgesprochenen Stirnschultern unmittelbar hinter den Augenhöhlen und nahe an der Mittellinie des Schädels, doch so, dass zwischen ihnen und den Augenhöhlen meistens eine ganz platte Fläche von rhombischer Gestalt frei bleibt. Sie divergiren in mehr oder weniger offenem Winkel nach hinten und neigen sich in der Regel von ihrem Ursprung an schwach abwärts, um vermuthlich durchweg mit den Spitzen sich wieder aufwärts zu heben. Anstatt geradlinig zu sein wie bei *Anoa*, beschreibt also die Achse der Hornzapfen sowohl in horizontalem als in vertikalem Sinn eine mehr oder weniger starke, meist indess nur schwache Curve. Im Durchschnitt sind sie in der Regel dreikantig, durchaus flach auf der Unterseite, stark gewölbt bis firstförmig auf der Oberfläche, mit besonders scharfer Kante medialwärts. Der Parietalschädel bildet eine ausgedehnte Zone, deren Profil von demjenigen der Stirn in starkem Winkel nach hinten abfällt. Die Kranznaht springt bis zwischen die Hornansätze vor. Die Occipitalfläche, meist

stark in die Quere gedehnt, ist durch flügel förmig vorstehende Muskelkanten von der Parietalzone getrennt, und ohnedies in starkem Winkel von ihr abgebogen.

Der Gesichtsschädel ist langgestreckt und in zwei deutlichen und von parallel laufenden Rändern begrenzten Stufen, der Maxillar- und der Intermaxillarstufe, nach vorn verjüngt. Der Parietalschädel oder die Schläfenzone fügt dazu hinter den Augenhöhlen eine dritte Stufe. Die Augenhöhlen treten mit wulstig verdickten Rändern seitlich weit aus dem Umriss des Gesichtes vor; die Supraorbitalrinnen sind meist tief und bei starken Formen oft auf weite trichter förmige Gruben concentrirt. Das Thränenbein ist sehr ausgedehnt und nach seinem obern und untern Ende hin erweitert, in der Mitte also eingeschnürt. Die Nasenbeine sind lang, gerade gestreckt, und nach ihrem hintern kurz zugespitzten Ende hin rasch verbreitert. Auch nach dem vordern Ende nehmen sie meist an Breite zu und sind hier mit tiefen Incisuren versehen. Sehr lang ist der Intermaxillatheil des Gesichts und endet in einer breiten und quer abgeschnittenen Platte. Die Intermaxillae legen sich nach hinten weithin an die Nasenbeine an. Der Gaumen ist flach und parallelrandig; die Foramina palatina liegen hinter der Kiefer-Gaumennaht. Das Choanenrohr ist lang und beginnt wie bei Anoa erst weit hinter der Grenze des Gaumens, der an erwachsenen Schädeln keine Spur mehr von einem spheno-maxillaren Einschnitt zeigt. Das Gebiss ist ausgezeichnet durch ausserordentlich kräftigen Bau mit quadratischem Umriss und breit abgerundeten Prismen der Molaren, mit relativ schwachen, nur auf späten Stadien der Abtragung aus dem Umriss des Zahnes vortretenden accessorischen Säulchen.

An normalen, d. h. durch wohl bekannte physiologische Bedingungen bedingten Modificationen dieser Schädelform lassen sich folgende verzeichnen:

**1. Jugendform.** Als das jüngste Thier der Probubalusheerde des Britischen Museums wird wohl der Schädel Nr. 39588 zu betrachten sein. Die Hornzapfen sind hier kaum dreikantig, fast cylindrisch und ziemlich deutlich gestielt. Sie stehen der Hornform von Anoa depressicornis sehr nahe und divergiren von der Wurzel an in stärkerem Winkel als bei ältern Thieren der als typisch betrachteten Probubalus-Form, in ähnlicher Weise etwa wie bei weiblichen Schädeln.

**2. Weibliche Form.** Sie ist am besten durch den nach der Dinkel'schen Tafel H, Fig. 4. 4<sup>b</sup>, in unserer Fig. 1. 2, Tafel I dargestellten Schädel vertreten, Br. Mus. Nr. 16173. Des Fernern zähle ich hieher zwei sehr gequetschte Schädel Nr. 39561 und 17555, ebenso Nr. 39586, 36666 und 40886<sup>a</sup>, endlich die Fragmente 48026 und 36675. Das gemeinsame und distinctive Merkmal aller dieser 8 Schädel liegt in der im Vergleich zu der männlichen Form langgestreckten und schmalen Gestalt derselben, in dem geringen Vorragen der Augenhöhlen, in der platten

Stirnfläche mit schwachen und langgedehnten Supraorbitalrinnen, in der schlanken, nach hinten nur schwach erweiterten Form der Nasenbeine und in der schwachen Bewaffnung. Die Hornwurzeln stehen weit auseinander und bilden nur unerhebliche Anschwellungen; die Hornzapfen sind schwach, fast cylindrisch und divergiren in weit offenem Winkel. Die Parietalzone ist im Vergleich zu den männlichen Schädeln scharf von dem übrigen Schädel abgeschnürt, die Occipitalzone nur wenig in die Breite ausgedehnt. Wie bei allen Rindern vereinigen sich also zu der Herstellung weiblicher Physiognomie Gracilität, geringe Muskelstärke, schwache Bewaffnung und Verharren von Jugendmerkmalen. Die Schlankheit der allgemeinen Form erstreckt sich gleichmässig auf alle Theile des Schädels. Für das Auge ist sie in der grössern Längenausdehnung der Parietalzone und in der geringen Breite des Occiput besonders auffällig. Die Spitze der Lambdoidnaht reicht bis in die Mitte zwischen den Hornschultern.

**3. Männliche Form.** Dargestellt ist sie in dem Schädel Brit. Museum Nr. 39563, Fig. 1. 2, Taf. I, Natürliche Geschichte des Rindes, II. Abtheilung, sowie in Fig. 1. 2 unserer diesmaligen Tafel VII, ferner in unserer Fig. 1. 2, Taf. IV (Copie nach Dinkel's Tafel H, Fig. 3. 3<sup>a</sup>, Brit. Mus. 23109. Auch Fig. 1. 1<sup>a</sup> der Dinkel'schen Tafel (Br. Mus. 39584), sowie Fig. 2. 2<sup>a</sup> (Br. Mus. 16411) sind männlichen Schädeln gewidmet, letztere einem der mächtigsten und stärkstbewaffneten Thierte der ganzen Heerde. Zu den männlichen Schädeln der Normalform zähle ich überdies Nr. 39588, 48021, 48024 und 48025 des Brit. Museums, sowie die Fragmente Nr. 36675 und 36676.

Bezeichnend für diese 10 Schädel ist vor Allem Grösse und Zunahme der Breitenmaasse, namentlich im hintern Theil des Kopfes, kräftige und oft überaus mächtig ausgeführte Sculptur, nicht nur durch ungewöhnliche Stärke aller Muskelansätze und aller Gefäss- und Nervenrinnen, sondern selbst durch markige Zeichnung von sonst glatten Schädelstellen, sowie stärkere Bewaffnung. Die männlichen Schädel sind also im Vergleich zu den weiblichen dick, plump und durch starke Breitenzunahme nach hinten mehr oder weniger dreieckig. Wie bei lebenden Rindern ist das mächtige Vortreten der wulstig verdickten Augenhöhlenränder sowohl über das Niveau der Stirnfläche als über die seitlichen Contouren des Schädels physiognomisch besonders wirksam. Die Oeffnung der Supraorbitalkanäle ist schiessschartenartig erweitert, die Stirnplatte zwischen den Augenhöhlen, obgleich vollkommen platt, ist meist durch reichliche Knochengranulationen überaus rauh. Die Nasenbeine sind nach hinten stark verbreitert und so gewölbt, dass das Nasenrohr merklich über die sonstige Wölbung des Gesichts-

schädels vortritt. Starke Furchen trennen die Nasenbeine, da sie sehr dick sind, von den Rändern der Maxilla ab.

Die Hornzapfen sind überaus mächtig und meist scharf dreikantig, indem die Wölbung der Oberfläche sich in zwei fast platte Seitenflächen, eine mediale und eine äussere durch eine mittlere First abscheidet. Die Hornwurzeln sind sehr stark und die Mittelkanten der Oberfläche können in starken und oft überaus rauhen runzeligen Schultern der Stirnzone bis zur Stirnnaht zwischen den Augenhöhlen zusammenlaufen. Meistens bleibt indess eine flache aber rauhe Stirnplatte auch bei männlichen Schädeln zwischen Hornwurzeln und Augenhöhlen frei. Immerhin wird durch die gegenseitige Annäherung der Hornwurzeln die Parietalzone merklich verkürzt und in die Breite gedehnt, so dass sich die sehr breite Occipitalfläche dichter an die Hornwurzeln herandrängt. Die Zunahme der Breitenmaasse äussert sich selbstverständlich auch auf die gesammte Unterfläche des Schädels von dem Hinterhauptsgelenk bis zur Intermaxillarzone.

Unter dem wenig bestimmten Namen von Racen stelle ich folgende noch physiognomische Gruppen der Probubalusform zusammen, deren Merkmale sich durch Alters- oder Geschlechtsverschiedenheiten nicht ausreichend erklären lassen.

## B. Aepyceros-Form \*).

Einige Schädel, vornehmlich Nr. 48017, 48023 und 48027 (Fragment) führen die Probubalusgestalt zu einer Physiognomie, für die sich mir vom ersten Anblick an die Bezeichnung «Bocksgestalt» unwillkürlich aufdrängte. Sie wird dadurch zu Stande gebracht, dass die Stirnzone hinter den Augenhöhlen an Breite eher verliert als zunimmt und die Hornwurzeln vor der Parietalzone wie bei Steinböcken und Ziegen in der Mitte fast zusammenstossen. Die Parietalzone wird dadurch fast unterdrückt oder verschwindet wenigstens in der Ansicht der Oberseite des Schädels, und die Occipitalzone scheint an die Stirnzone anzustossen. Es gehören diese Thiere also zu den am stärksten bewaffneten der ganzen Heerde und so viel sich wahrnehmen liess, waren es auch Thiere von ausgewachsenem Alter. Nichtsdestoweniger bleiben sie merklich unter der Mittelgrösse von Probubalus zurück, was nicht wenig zu dem Eindruck von Bock physiognomie, wenn auch an einem Büffelschädel, mithilft. Auch im Uebrigen tragen diese kleinen Schädel einen überaus kräftigen Bau, der vermuthen lässt, dass sie

---

\*) *αἰνύσας*, hochgehört.



männlichen Thieren angehörten. Die Augenhöhlen treten weit aus dem Umriss des Schädels vor. Die Supraorbitalrinne bilden tiefe Furchen hinter den Augenhöhlen. Nichtsdestoweniger wüsste ich Nichts namhaft zu machen, was ihre Abtrennung von der Normalform von *Probubalus* als besondere Species rechtfertigen könnte. Eingedenk, wie überaus wenig dazu gehört, um auch an uns wohl bekannten Thierformen, namentlich z. B. an zahmen Rindern, der Physiognomie besonderes Gepräge zu geben, das sich oft sofort aufdrängt, auch ohne dass wir vermöchten, Bedingungen dafür im Bau des Schädels nachzuweisen, würde es mir gewagt erscheinen, in diesen kleinen und überaus trotzig aussehenden Thieren etwas anderes als individuelle oder Rassen-Eigenthümlichkeiten anzuerkennen. Um so weniger, als wir analogen Modificationen auch bei andern Rindern von derselben Herkunft begegnen werden.

### C. *Trochoceros*-Form.

Fig. 3. 4, Taf. I; Fig. 11, Taf. VI.

Schon dieser Name, mit welchem ich eine fernere und weit häufigere, aber eben so wenig als die vorige durch Geschlecht und Alter zu erklärende Umgestaltung der *Probubalus*-Gestalt bezeichnen will, gibt der Darstellung derselben eine den Fachmännern wohl bekannte Unterlage. Mit diesem von H. v. Meyer zwar als Species-Titel verwendeten Namen habe ich bekanntlich eine sehr typische Variation von Schädel-structur bezeichnet, die sich schon an dem fossilen *Bos primigenius* überaus häufig einfindet und dann an dessen zahmen Descendenten sich sogar zu einem höchst constanten Merkmal von Race befestigt hat. *Trochoceros*-Hörner scheinen auch an dem sivalischen Büffel sehr häufig aufgetreten zu sein. Ich zähle dazu die Schädel Nr. 36665 und 48028 bis 48033, nicht viel weniger als ein Drittheil des Vorrathes an *Triquetricornis* im Britischen Museum. Leider sind alle nur in hintern Hälften erhalten. Zur Abbildung (Fig. 3. 4, Taf. I) ist zunächst Nr. 36665 gewählt worden (von Falconer's Hand mit der Etiquette *Antilopidae* Nr. 5, — Nr. 48032 als Female of *Bovidae* Nr. 2 bezeichnet).

Fast alle diese Schädel sind im Vergleich zu denjenigen der Normalform, und zwar nicht etwa durch äussere Gewalt, auffallend platt gedrückt und in die Breite gedehnt. Dem entsprechend sind die Hornansätze weit nach aussen verlegt, wodurch der frontale Zwischenraum zwischen den Hornschultern breit und sattelförmig vertieft wird. Auch die Parietalzone oder die Hirncapsel erscheint meistens auffallend abgeplattet und breit, die Occipitalfläche statt vertikal, schief nach hinten geneigt. Der Durchschnitt der Hörner

ist im Allgemeinen, so gut wie bei der Normalform, dreieckig, mit platter Unterfläche und scharfer medialer Kante; allein auch hier ist Abplattung unverkennbar und erreicht oft hohe Grade; die Aussenfläche des Hornzapfens ist also niedrig und geht in einfacher Wölbung in die Innenfläche über, oder mindestens macht sich die obere First des Horns oft erst weit hinter dem Hornansatz bemerklich. Die Hornschultern der Stirn erscheinen daher stark abgerundet wie etwa bei dem Banting und bei *Bos etruscus*. Sehr häufig sind die Hornzapfen deutlich gestielt, d. h. beim Verlassen der Stirnfläche und vor Beginn der Hornscheide eingeschnürt, wie bei der *Frontosus*- oder der säbelhörnigen Race des zahmen Rindes. Die Hörner sind weit mehr seitwärts gerichtet als bei den bisher beschriebenen Formen und verlaufen bis zur Spitze in starkem Bogen. Sie liegen auch in vertikalem Sinne mehr in der Ebene der Stirn und erheben sich darüber erst gegen die Spitzen hin.

Trotz der Gemeinsamkeit dieses Typus, der sich dem Auge sofort aufdrängt, ist es wichtig zu bemerken, dass er keineswegs sich in knappen Grenzen hält. In Abplattung des Schädels und der Hörner, in Ausdehnung der Parietalzone und Neigung der Hinterhauptsfläche, in Art der Biegung der Hörner ist keiner der sieben Schädel dem andern gleich. Es sind dies also individuelle Variationen verschiedenen Grades, aber in einer und derselben Richtung. Innerhalb des *Trochoceros*-Gepräges findet somit, und zwar allem Anschein nach im Zusammenhang mit der verschiedenen Stärke der Bewaffnung, eine ganze Reihe von Gradationen in Gestaltung der Hirncapsel statt, als deren Grenzen etwa Nr. 48031 und 48029 bezeichnet werden können. Nr. 48031 vertritt den Gipfelpunkt von Säbelhörnigkeit und gleichzeitig den stärksten Grad von Abplattung und longitudinaler Ausdehnung der Scheitelzone. Umgekehrt ist bei Nr. 48029 die Scheitelzone auf das Minimum von Länge beschränkt, die Hirncapsel im Allgemeinen hoch, die Hinterhauptsfläche vertikal, nur die Gelenkköpfe derselben stark vortretend. Die Scheitelzone ist hier kaum ausgedehnter als bei dem Genus *Bison*. Würde dieser Schädel vereinzelt vorliegen, so könnte man geneigt sein, ihn eine neue Form von *Probubalus* ankündigen zu sehen; dennoch handelt es sich lediglich um grössere oder geringere Länge der Parietalzone, welche selbst bei Nr. 48029 nur vertritt, was im Allgemeinen schon die *Aepyceros*-Köpfe kennzeichnet. Im Wesentlichen ist an der Structur von *Probubalus* nicht das Mindeste geändert. Schon hiedurch wird die naheliegende Vermuthung, die schon Falconer nicht fremd gewesen zu sein scheint, dass diese besondere Gestaltung auf Geschlechts-Unterschied beruhen möchte, ausgeschlossen, umsomehr als wir innerhalb der *Probubalus*-gestalt bereits Formen kennen gelernt haben, die mit viel grösserem Recht als Attribute weiblichen Geschlechts bezeichnet wurden, als die in Rede stehenden. Ich möchte daher die

Merkmale der letztern viel eher in Correlation bringen zu der Umgestaltung der Bewaffnung des Thieres, um so eher als durchaus ähnlicher Umbau des Schädels sich mit Quer- oder besser Säbelhörnigkeit auch an andern Rindern combinirt. Unter sivalischen Rindern wird davon in der Folge dieser Arbeit noch reichlich die Rede sein. Aber auch unter lebenden Thieren wiederholt sich dies unverkennbar in den Variationen sowohl des zahmen als des wilden indischen Büffels, und noch schärfer in den africanischen Büffeln. *Bubalus brachyceros* wird doch, so sehr er auch gegenwärtig zu einer localen Species befestigt sein mag, in letzter Linie als eine *Trochoceros*-Gestalt von *Bubalus caffer* gelten müssen und trägt im Vergleich zu diesem dieselben Abänderungen im Schädelbau zur Schau, wie die *Trochoceros*-gestalt von *Probalus*. Dass die *Trochoceros*-form des zahmen *Primigenius*-Rindes mit der besondern Form der Hörner nicht Alters-, sondern gerade Jugendmerkmale der Stammform im Bau der Gehirnkapsel verbindet, wird in Erwägung des menschlichen Einflusses, der hier stattfand, dieser Anschauung eher zur Stütze als zum Einwand dienen.

Oder sollen wir die *Trochoceros*-form des sivalischen Büffels, wenn sie nicht auf sexueller Beschränkung beruht (die Frage, ob innerhalb derselben, wie ich zu vermuthen geneigt bin, beide Geschlechter Vertretung finden könnten, liess sich bei der Unvollständigkeit der betreffenden Schädel nicht entscheiden; sicher ist nur, dass keiner derselben einem jungen Thiere angehörte), als Merkmal einer besondern Species betrachten? Auch hiegegen sträubt sich der so sehr verschiedene Grad der Durchführung von *Trochoceros*-Gestalt. Die sieben Schädel, die ich unter diesem Titel zusammenstellte, bilden eine Reihe, welche mit dem Minimum von Säbelhörnigkeit in Nr. 48029 beginnt und sich hier nahe an die Normalform von *Probalus triquetricornis* anschliesst, bis zu Nr. 48031, welcher freilich bei Absehen von den Mittellgliedern sich davon stark unterscheidet. Ich habe daher diesen Schädel in Fig. 11, Taf. VI noch besonders abgebildet ( $\frac{1}{3}$  nat. Grösse), allerdings in anderer Stellung als Nr. 36665 (Fig. 3. 4, Taf. I), vollkommen von oben gesehen, wodurch der Anschluss an geringere Grade von Säbelhörnigkeit etwas verwischt wurde. Gleichgestellt und also directer Vergleichung zugänglich ist dagegen Figur 1, Taf. VII ( $\frac{1}{4}$  natürl. Grösse). Seiten-Ansichten der beiden Schädel würden die Analogie in deutliches Licht gesetzt haben. Wie man sieht, ist hier der Zwischenraum zwischen den Hornschultern, der sonst in der Regel kaum breiter ist als die parietale Zone des Schädels, in einen dieselbe um Vieles übertreffenden queren Sattel ausgedehnt, der ganz allmählig in die wenigstens Anfangs vollkommen quergestellten und dabei gleichzeitig sehr stark abgeplatteten Hörner ausläuft. Immerhin hat der Durchschnitt der Hörner das für *Probalus* so bezeichnende Merkmal der Dreikantigkeit noch jetzt nicht verloren.

Nur ist die Oberfläche der Hornwurzel in noch stärkerem Grade als bei Fig. 3. 4, Taf. I blos convex, statt firstförmig, und die Unterfläche ist noch mehr als bei diesem schief nach oben und hinten geneigt, so dass die mediale Kante viel höher liegt als die äussere Seitenkante. (In der Zeichnung kömmt dies leider nicht zum Ausdruck.) Das Horn ist also gleichzeitig in seinem flachen Durchmesser nach oben und hinten gedreht, vollkommen wie bei starken Graden von Säbelhörnigkeit des zahmen *Trochoceros*-Rindes oder des indischen Büffels. Im Uebrigen wüsste ich an dem erhalten gebliebenen Theil des Schädels nichts namhaft zu machen, was ihn als Species von der Normalform von *Probubalus* zu unterscheiden berechtigen könnte. (Vergl. Fig. 11, Taf. VI mit Fig. 1, Taf. VII). Ein hoher Grad von Abplattung mit entsprechender Breitezunahme ist das Einzige, was ihn, aber wie wir sehen, lediglich in individuell gesteigertem Maass, für welches keine Bindeglieder fehlen, auszeichnet. Wenn somit Plattköpfigkeit mit Säbelhörnigkeit in irgend einem natürlichen physiologischen Connex zu stehen scheint, so dürfte umsomehr diese ganze Schädelform nur als ein individuelles oder zum mindesten als ein blosses Racen-Merkmal zu beurtheilen sein, als sie einmal in sehr verschiedenem Grade auftritt und zudem mit dem Alter der Thiere zuzunehmen scheint. In verstärktem Maasse wird man jetzt gewahr sein, dass die Vermuthung, hierin ein Attribut weiblicher Thiere zu erblicken, dahin fällt, da ja durch die ganze Thierwelt das weibliche Geschlecht vor dem männlichen sich gerade durch Beschränkung der Variabilität auszeichnet.

Musste schon die Uebersicht der säbelhörnigen Vertreter von *Probubalus* uns auffordern, für den Begriff der «Species» an dem uns vorliegenden Vorrath tertiärer Rinder die Sehweite über das für Beurtheilung von Geschöpfen unserer Tage gewohnte Maass hinaus zu erweitern, so wird es nicht mehr besonderer Rechtfertigung bedürfen, wenn ich als Schlusspunkt der Reihe von *Probubalus*-gestalten noch eine fernere Form dem Leser vorführe, auf welche sogar der Speciesnamen bei kurzsichtiger Anwendung kaum mehr passt.

#### D. *Aceros*-Form.

Fig. 1. 2. 3, Taf. II.

Der sonderbare Schädel, in dem ich, vielleicht um einen kleinen Schritt zu weit gehend, eine hornlose Form von *Probubalus* erblicke, einer der merkwürdigsten der Falconer'schen Sammlung, trägt die Nr. 48033 und ist in Fig. 1—3 unserer Tafel II abgebildet. Er stammt von demselben Fundort wie alle bisher besprochenen, ist

aber der einzige seiner Art. Leider ist er, guten Theils durch Rollen, sehr beschädigt und besteht nur aus der Hinterhälfte, d. h. aus Stirn-, Scheitel- und Hinterhauptszone. Auf den ersten Anblick scheint er durchaus hornlos zu sein. Nicht weniger auffällig ist seine ausserordentliche Abplattung und Flachheit. Zwischen den Augenhöhlen ist die Stirn nur unmerklich vertieft. Schon hierdurch gewinnt sie den Anschein ungewöhnlicher Breite und Flachheit, und derselbe wird nicht wenig vermehrt durch den Umstand, dass diese Fläche durch die nur äusserst seichten Supraorbitalrinnen wie durch die Augenhöhleldächer kaum unterbrochen wird. Die breiteste Stelle der Stirn bilden aber nicht wie gewöhnlich die hintern Winkel der Augenhöhlen, sondern ein postorbitaler, den vordern Theil der Schläfengrube überdachender Vorsprung der Stirn, der leider beiderseits stark verletzt ist. Hier sollte sich ausweisen, ob das Thier Hörner trug oder nicht. Mit Sicherheit lässt sich bei dem Zustand des Schädels darüber nicht urtheilen. Doch spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Thier nicht gänzlich hornlos war, sondern dass Stummel von sehr plattgedrückten, im Durchschnitt dreieckigen Hörnern mit platter Unterseite und hinterer Kante von hier ausgingen.

Hinter den Augenhöhlen zieht sich die Stirnfläche sehr rasch zu dem vom Scheitelbein eingenommenen Isthmus zwischen den Schläfen zusammen, hinter welchem sogleich die sehr niedrige und breite, und gleichzeitig stark nach rückwärts geneigte Occipitalzone anhebt. Obgleich somit der Parietalschädel zwischen Hinterhaupt und Stirn keine besondere Selbstständigkeit erreicht, so dringt das Parietale doch mit vorderer stumpfer Spitze weit in die Stirnzone ein, bis zu einer Linie zwischen den Hinterrändern der vermuthlichen Hornansätze. Die Oberfläche der Parietalkante verläuft in durchaus gleicher Flucht mit der Stirnfläche, so dass die Occipitalkante die höchste Stelle des Schädels bildet.

In der Seitenansicht liegt, da die Jochbogen und die Augenbogen abgebrochen sind, die Augenhöhle frei zu Tage. Sie fällt auf durch abgeplattete Form und sehr schief nach oben und vorn gehende Richtung ihrer Achse. Hinter ihr ist die Schläfengrube in ihrem vordern Theil überdacht durch den vermuthlichen Hornansatz, während sie nach hinten vollkommen offen und von der Scheitelfläche nur durch eine Kante getrennt ist. Die schiefe Neigung der Hinterhauptsfläche und das weite Vorragen des Occipitalgelenkes sind in der Seitenansicht besonders bemerklich. Die Unterseite des Schädels ist stark verletzt. Sie bringt die sehr beträchtliche Querausdehnung des Hinterhauptsgelenkes und des Tympanalthails vor Augen, sowie die weit offene trichterförmige Oeffnung des Supraorbitalcanals.


Sowohl die Vergleichung der Abbildungen als diese kurze Beschreibung genügt,

um bemerklich zu machen, dass, sofern nur dieser Schädel Nr. 48033 und etwa der weibliche Probubalusschädel Nr. 16173 vorgelegen hätten, Niemand daran hätte denken dürfen, die beiden in eine und dieselbe Species, ja kaum in ein und dasselbe Genus zu vereinigen. Dennoch darf ich jetzt, nachdem dem Leser eine Menge von Zwischengliedern vorgeführt worden, das Vertrauen hegen, dass ihm das Band, das so weitgetrennte Gestalten verbindet, ersichtlich geworden, und er begreiflich finden werde, wenn ich trotz langen Sträubens immer und immer wieder zu dem Urtheil zurückkehrte, dass es sich hier lediglich um weite Dehnung eines und desselben, allerdings überaus elastischen Typus handle, dessen wesentliche Züge selbst so differente Zuthaten wie Steinbockähnliches Gehörn und annähernde oder wirkliche Hornlosigkeit nicht auszulöschen vermochten. (Vergl. die hornlose Form Fig. 1. 2, Taf. II mit der stark behornten männlichen Normalform Fig. 1. 2, Taf. VII.) Am wenigsten durfte die Betrachtung stören, dass Hornlosigkeit bei heutigen Büffeln meines Wissens nicht bekannt ist, wenn, wie sich im Verlauf unserer Darstellung tertiärer Rinder zeigen wird, eine gute Anzahl derselben, ja wenn selbst der schon besprochene sivalische Vertreter der Ziegenfamilie ohne diese Wehr erschien.

Auch ohne solches Umsehen nach Analogien unter heutigen Thieren wird indess über den Anschluss des in Frage stehenden Schädels an die bisher besprochenen kein Zweifel walten können. Bildet er doch nur einen Excess von Dem, was wir bei den säbelhörnigen Gestalten Stufe für Stufe zunehmen sahen. Es ist also höchst wahrscheinlich, dass selbst diese Etappe nicht die letzte war, sondern fast mit Sicherheit eine gänzlich hornlose Form ankündigt. Ist doch schon jetzt das Erlöschen der Supraorbitalrinnen, die freilich nur theilweise mit der Anwesenheit von Hörnern in Beziehung stehen, weiter gediehen als bei manchen hornlosen Rindern, mit welchen wir uns in der Folge zu beschäftigen haben werden. Auch die übrigen Eigenthümlichkeiten des Schädels, Abplattung und Breitenausdehnung sind nur Steigerung Dessen, was sich als häufige Begleitung von Säbelhörnigkeit ausweist. Diese Merkmale als physiologisches Correlat von Hornlosigkeit zu betrachten, wäre sicher zu weit gegangen, wenn auch Abplattung der supratemporalen Seitenränder der Stirn, d. h. Unterdrückung der Frontalsinus in der Gegend des Hornansatzes, auch die Galloway-Form des zahmen Rindes und die hornlose Form des Grunzochsen kennzeichnet. Mehr berechtigt dürfte der Schluss erscheinen, dass Säbelhörnigkeit die Vorbereitung für Hornlosigkeit bilden möchte. In solchem Sinne durfte es schon gewagt werden, schon jetzt von einer hornlosen Form von Probubalus zu reden. Viel gewagter wäre es gewesen, an irgend einem Punkt der Reihe einen Pfahl als Marke für Territorium neuer Species aufzustellen. So berechtigt dies sein mag, so bald wir die Grenzgestalten eines Genus-

Typus sich in geographischer oder morphologischer Richtung zu auffälliger Selbstständigkeit befestigen sehen, so gewaltsam hätte es erscheinen müssen, derartige Risse in die Formenreihe von *Probubalus triquetricornis* hineinzulegen.

Die folgenden Holzschnitte geben Skizzen von dem allgemeinen Bau der Hirncapsel bei den verschiedenen Varietäten von *Probubalus triquetricornis*: *A* Normalform, *B* Trochocerosform, *C* Acerosform; *D* entspricht sowohl den kurzseitigen Trochoceros-, als auch, bei entsprechender Veränderung des Horndurchschnittes, den Aepyceros-Schädeln.



## 2. *Probubalus antelopinus* Rütim.

Fig. 5. 6, Taf. I.

Obschon ich es gewagt habe, Schädel von so verschiedener Erscheinung wie die eben geschilderten unter dem Titel *Probubalus triquetricornis* zu vereinigen, so schrecke ich davor zurück, eine fernere Gestalt in dieselben Speciesgrenzen einzuschliessen. Obschon sie von demselben Fundort stammt, so scheint sie doch aus dem

Verband mit denselben so weit hinauszutreten, dass sie eben als Beweis von Ablösung zu selbstständiger Form-Entfaltung wird gelten können.

Nach Gestalt wird man allerdings der neuen Form den Titel «Species» kaum absprechen können, umsoweniger, als die Abweichungen von der Grundform, *Probalus triquetricornis*, weiter tragender Art sind als bei den bisher besprochenen Modificationen derselben. Damit ist freilich der Beweis noch keineswegs geleistet, dass ihr selbstständige Kraft genug inwohnte, um nunmehr, nach dem neuen Plan, wiederum alle die Gestalten zu schaffen, die wir erfahrungsgemäss in jeder Species sich als Alters- oder sexuelle Formen verwirklichen sehen.

Aus dem sivalischen Sandstein liegen als Träger dieser neuen Physiognomie im Britischen Museum nur zwei erwachsene und leider stark verletzte Schädel vor, von welchen ich nicht einmal zu sagen vermag, ob sie männlichen oder weiblichen Thieren angehörten. Auch unter lebenden Rindern wüsste ich keine Art zu nennen, die etwa als selbstständiger Erbe der sivalischen gelten dürfte. Ich muss es also einstweilen dahingestellt sein lassen, ob diese besondere Gestalt nur Eigenthümlichkeit einzelner Individuen, oder Eigenthümlichkeit einer zu allem Besitz von Speciesrechten gelangten Kategorie von Thieren geworden sei, mit andern Worten, ob dieselbe eine künstliche oder eine natürliche Species repräsentire.

Die zwei Schädel tragen die Nummern 39586 und 40886<sup>a</sup> des Britischen Museums und scheinen schon von Falconer von den übrigen sivalischen Schädeln ausgeschieden worden zu sein. So viel ich aus seinen Manuscripten vermuthete, hatte er sie mit dem Namen *Leptobos antelopinus* bezeichnet\*), den ich daher auch in der provisorischen Erklärung unserer Tafel I beibehalten hatte. Beide Schädel zeigen unter sich, was zu bemerken wichtig ist, trotz gemeinsamer Gesamt-Physiognomie allerlei kleine Verschiedenheiten. Zur Darstellung wählte ich denjenigen, welcher die erstere schärfer zum Ausdruck bringt, B. M. Nr. 39586.

Beide Schädel sind leider in ihrem Parietaltheil abgebrochen, und auch die Unter-

---

\*) Aus den im Britischen Museum aufbewahrten Manuscripten und Handzeichnungen Falconer's ist nicht mit Sicherheit auf die Namen zu schliessen, die er den verschiedenen Wiederkäuerschädeln seiner sivalischen Sammlung zuschrieb, da die darin enthaltene Nomenclatur offenbar nur eine provisorische war. Derselbe Schädel erscheint daher gelegentlich unter verschiedenen Bezeichnungen. Den sivalischen Rindern ist, wo sie nicht nur mit Nummern, Bovidae Nr. 1. 2 etc., etwa auch Antilopidae Nr. 1. 2 etc. aufgezählt sind, im Allgemeinen der Name *Leptobos* zugetheilt, wie *Leptobos triquetricornis*, *acuticornis*, *elatus*, *antelopinus*. Ein Festhalten der Falconer'schen Namen schien mir daher gerade auf diesem Gebiete, das er offenbar noch nicht durchgearbeitet hatte, eher vermieden werden zu sollen.



fläche derselben lässt nicht mehr viel Sicheres erkennen. Es würde sich also schon ihre Vereinigung mit dem Genus *Probubalus* oder überhaupt mit den Büffeln anfechten lassen. Besteht doch ihr gemeinsames Merkmal in einer für Büffel allerdings ganz ungewohnten Verlängerung und Schmalheit der Frontalzone. Dennoch glaube ich eine derartige Einwendung am wenigsten befürchten zu müssen. Der Bau des Gesichtstheiles entspricht, abgesehen von seiner Schlankheit, in hohem Maasse demjenigen von *Probubalus* und heutigen indischen Büffeln. Der Gesichtsschädel verjüngt sich nach vorn in auffallend geradlinigen Stufen. Die Augenhöhlen liegen weit rückwärts, mehr hinter als über der Maxillarzone, und treten mit wulstig verdickten Rändern über den übrigen Umriss des Schädels hervor. Form von Nasenbeinen, Thränenbeinen, Lage der Choanenöffnung verhält sich wie bei *Probubalus*, und auch der Parietalschädel scheint eine *Probubalus* ebenbürtige Ausdehnung erreicht zu haben. Was die Schädel von *Probubalus triquetricornis* unterscheidet, ist erstlich eine ungewöhnliche und nicht etwa durch Druck erzeugte Abplattung oder Niedrigkeit der Maxillarzone, ferner eine merkliche Verlängerung derselben, in Folge welcher der Gesichtsschädel ungewöhnlich gestreckt und schmal erscheint. Besonders deutlich spricht sich dies in der Form der Nasenbeine aus. Am eigenthümlichsten ist indess die Einsetzung der Hörner. Sie sind im Verhältniss zu der Grösse des Schädels ungewöhnlich stark, und ohne sich stark über die Profillinie der Stirne zu erheben von Anfang an stark nach hinten gerichtet. Theils in Folge ihrer Stärke, theils in Folge der geringen Divergenz von der Mittellinie verschmelzen ihre Wurzeln nahezu unter sich zu einem schmalen Frontalwulste und nehmen also die ganze Breite der Stirn für sich in Anspruch; die Frontalzone erscheint dadurch hinter den Augenhöhlen ungewöhnlich schmal und lang. Sie ist hier nicht breiter als die Maxillarzone. Die Hörner sind nahezu cylindrisch. Immerhin ist ihre Unterfläche abgeplattet und eine medialwärts gerichtete Kante unverkennbar. Sie verhalten sich also nahezu wie bei dem weiblichen *Probubalus triquetricornis*. Hierin scheint mir auch der richtige Wegweiser für unser Urtheil zu liegen. *Probubalus antilopinus* scheint eine durch ungewöhnlich starke Rückwärtsrichtung der Hörner charakterisirte Form von *Probubalus triquetricornis* darzustellen. Wenn auch innerhalb viel engerer Schranken, vollzieht sich also hier Aehnliches wie unter der Gensengruppe der Antilopen bei *Alcelaphus*: Confluenz der Hörner und dadurch Verlängerung der postorbitalen Stirnfläche. Die craniale Stirn erhält so gewissermaassen noch einen diploëtischen Zusatz, der wesentlich nur aus den verschmolzenen Hornbasen besteht. Ja man möchte geneigt sein, selbst in der auffallenden Verlängerung des Gesichtsschädels von *Alcelaphus* eine Parallele mit dem langgestreckten und schmalen Gesichtsschädel von *Probubalus antilopinus* zu

erblicken und zu fragen, ob hierin nicht ein Correlat zu der Verlängerung des frontalen Theils des Schädels liegen könnte. Als Ausgangspunkt für diese für Büffel so ungewöhnliche Erscheinung drängt sich dabei der weibliche *Probubalus triquetricornis* auf. Denkt man sich dessen Hörner um das Doppelte, bis zu gegenseitigem Zusammenfließen verstärkt und in entsprechendem Maasse nach rückwärts gerichtet, so scheint die Form *Antilopinus* sich auf natürliche Weise davon abzuleiten. Um so mehr trat also der Gedanken abseits, dass derselben nur ein ähnlicher Werth beizumessen sei wie der bockhörnigen oder der säbelhörnigen, da Verstärkung der Bewaffnung an *Triquetricornis* zu wesentlich andern Ergebnissen führte.

Die Verschiedenheiten zwischen den beiden Schädeln beziehen sich nicht auf verschiedene Ausprägung ihres Species-Merkmals. Eher scheinen sie mir Alters- oder sexuelle Unterschiede anzudeuten. Nr. 39576 stammt von einem etwas ältern Thier und ist stärker behornt und in seinem ganzen Bau kräftiger und derber als Nr. 40886. Die Augenhöhlen sind massiver umrandet und mit kleinerer Oeffnung versehen. Sie treten sowohl oberflächlich als seitlich stärker über die Frontalzone heraus. Der Jochbogen ist stärker und kürzer, die Schläfengrube kürzer, die Wangenfläche niedriger, das Tuber maxillare stärker, die Hornkanten sind schärfer ausgesprochen. Immerhin wird es reichlicherer Materialien bedürfen, um diesen Unterschieden ihren Werth zuzuweisen, und mit Sicherheit zu entscheiden, ob der neuen Form doch etwa der einfachere Titel einer *Opisoceros*-Form (von *ὀπίσσω*, rückwärts gerichtet) von *Probubalus triquetricornis* noch besser als ein besonderer Species-Titel geziemen möchte.

### 3. *Bubalus sivalensis* Rütim.

Fig. 4. 5, Taf. II.

Der einzige Schädel, um den es sich hier handelt, trägt im Britischen Museum die Nummer 16431 (mit der von Falconer's Hand herrührenden Etiquette Bovidae Spec. 5) und stammt aus den sivalischen Hügeln, also aus denselben Ablagerungen wie *Probubalus triquetricornis*. Weder die darüber vorhandenen Notizen von Falconer selbst, noch die Art des Gesteins lässt darüber einen Zweifel.

Merkwürdig ist der Schädel nicht etwa dadurch, dass er uns eine ungewohnte Form von *Bubalus* eröffnet, sondern vielmehr dadurch, dass er dies nicht thut, und nur mit geringen Modificationen die wohl bekannte Form des lebenden Arni über den geologischen Horizont des davon doch schon mehr verschiedenen *Bubalus palae-*

indicus hinauf bis in denjenigen von *Probubalus triquetricornis* führt. Wie heutzutage Anoa und Arni noch gleichzeitig Ostasien bewohnen, so lebten also bereits zur Zeit der sivalischen Ablagerungen Träger derselben zwei Gestalten auf dem nämlichen Schauplatz beieinander. Der heutige insulare Träger der *Probubalus*-Form ist um das Doppelte hinter die Grösse seines miocenen Vorfahrs zurückgegangen. Die plathörnige Form des Büffels, der Typus des sogenannten indischen Büffels, scheint zur Miocenzzeit, so weit der einzige davon vorhandene Schädel schliessen lässt, an Grösse eher hinter dem heutigen Arni zurückgeblieben zu sein und erst später in der Nerbudda-Form, dem *Bubalus palaeindicus*, ihren Culminationspunkt erreicht zu haben. Die Dimensionen des sivalischen Schädels, der von einem erwachsenen Thiere herrührt, verhalten sich zu denjenigen von *Bubalus palaeindicus* etwa wie 2 : 3 und erreichen keineswegs diejenigen von sehr starken Arni's. Die Stirnbreite beträgt aussen an den Augenhöhlen ungefähr 205 Mm., an der Occipitalkante zwischen den Hörnern 165 Mm., Umfang der Hornbasis 300 Mm., grosser Durchmesser der Hornbasis 105 Mm., grösste Breite der Hinterhauptsfläche 250 Mm.

Der Schädel in seiner Gesamtheit ist wie derjenige von *Bubalus palaeindicus* niedriger oder stärker abgeplattet als derjenige des heutigen indischen Büffels. Die Hinterhauptsfläche, die darüber den besten Aufschluss gibt, verhält sich im Verhältniss von Höhe und Breite nahezu wie bei dem am wenigsten abgeplatteten, und wie wir vermuthen, weiblichen Schädel von *Bubalus palaeindicus* Br. M. Nr. 39717. Im Uebrigen unterscheidet er sich aber von der Nerbuddaform in einer Menge von Dingen, die keineswegs als unwesentlich gelten können und ihn selbst vom Arni, trotz der unverkennbaren Gemeinsamkeit der Gesamthypsiognomie aller drei Formen, als besondere Ausführung derselben zu unterscheiden nöthigen.

Am bezeichnendsten ist die Gestaltung der Stirnfläche. Statt gewölbt, wie bei *Bubalus palaeindicus* und *indicus*, ist sie platt oder selbst im Vergleich zu dem scharf ausgesprochenen und hohen Frontalwulst concav, und überdies auf beiden Seiten der Mittellinie, im Verlauf der Supraorbitalrinnen durch tiefe Gruben ausgehöhlt. Der Frontalwulst bildet also, für Büffel ungewöhnlich, zwischen den Hornansätzen eine quere First, hinter welcher die Parietalzone sattelförmig zu der Occipitalkante abfällt. Der ganze Schädel ist überhaupt im Vergleich zu der gewöhnlichen Form von Büffeln auffallend kantig zugeschnitten. Der Frontalwulst zwischen den Hörnern ist scharf und geradegestreckt. Auch seitwärts zwischen Hornwurzeln und Augenhöhlen biegt sich das Stirnbein kantig von der Oberfläche zur Schläfe hinab. Die Augenhöhlen sind scharfrandig und treten kaum aus dem Schädelumriss vor.

Die Hörner liegen auf ihrem ganzen noch vorhandenen Verlauf in der Flucht der

Stirnfläche und sind also bei horizontaler Lage des Schädels schief aufwärts geneigt, während sie bei *Bubalus palaeindicus* horizontal, bei dem Arni in der Regel abwärts geneigt sind. Ihre Richtung geht in weit offenem stumpfem Winkel und in ganz schwacher Curve nach rückwärts, der Durchschnitt ist scharf dreieckig (S. Taf. II zwischen Fig. 8 und 9), mit vollkommen platter Unter- und Oberfläche, die vorn durch eine ebenfalls platte Vorderfläche, hinten oder medialwärts durch eine scharfe Schneide verbunden sind. Da die Hörner gleichzeitig eine sehr bedeutende Länge erreichen, so nähern sie sich also, von der Aufwärtsneigung abgesehen, denjenigen des Arni, während sie von *Bubalus palaeindicus* gänzlich verschieden gebildet sind. Mit der Aufwärtsrichtung der Hörner steht ein ferneres Merkmal, das in der Seitenansicht besonders in's Auge fällt (vgl. auch Fig. 5 mit Fig. 5<sup>a</sup> der Dinkel'schen Tafel G) in Verbindung. Die Schläfengrube, bei der Nerbuddaform und auch bei starken Arni's fast ganz zusammengedrückt, ist bei der sivalischen fast so offen wie bei *Probubalus*.

Immerhin ist irgend eine engere Beziehung zwischen *Bubalus sivalensis* und *Probubalus*, enger als sie der gemeinsame Plan der Büffelfamilie mit sich bringt, ausgeschlossen. Von einer zeitlichen Aufeinanderfolge, etwa als Andeutung eines Uebergangs von *Probubalus* in *Bubalus*, ist nicht die Rede. Im Licht der Altersmetamorphose steht, mit einigen davon unabhängigen Modificationen, der Arni schon fertig auf sivalischem Boden mit *Probubalus*, wie heutzutage, geographisch etwas isolirter, Arni und Anoa. Wenn die äussern Erlebnisse, welchen beide Genera seit der Miocenzeit ausgesetzt waren, Spuren an denselben hinterlassen haben, so scheinen dieselben nur in Erstarrung, in Verlust an Elasticität der Gestalt bestanden zu haben, obschon beide seit sehr alter Frist die Gruppe der Bibovina zu Zeitgenossen und Tischgenossen hatten, die bis auf den heutigen Tag an Lust und Kraft zur Bildung neuer Sprossen kaum etwas eingebüsst zu haben scheinen. Man wird also aus dem Zusammentreffen von *Probubalus triquetricornis* und *Bubalus sivalensis* in dem sivalischen Sandstein schliessen dürfen, dass uns diese Ablagerung noch keineswegs die Jugendjahre der Bubalina aufdeckt.

#### 4. *Bubalus palaeindicus* Falconer.

Murchison Palaeontolog. Mem. I. Pl. 29. Fig. 1—3. Dinkel'sche Tafel G. zu der Fauna antiqua sivalensis Fig. 3. 3<sup>a</sup> B. M. Nr. 39716, Fig. 4. B. M. Nr. 39717, Fig. 5. B. M. Nr. 39759, Fig. 7. B. M. Nr. 39715.

Die vier riesigen Schädel im Besitz des Britischen Museums, die Falconer mit dem obigen Namen bezeichnet hat, stammen aus der pliocenen, wo nicht gar postpliocenen Ablagerung von Nerbudda. Wie ich schon früher nachwies (Natürliche Geschichte des Rindes Abth. II. Pag. 31) und heute von Neuem nach der Vergleichung der Originalien bestätigen kann, stimmen sie mit dem jetzigen wilden Büffel Indiens, dem Arni, so sehr überein, dass die Berechtigung eines besondern Namens für die fossile Form in Frage gestellt werden dürfte. Wenn ich den Falconer'schen Namen mit den nöthigen Abänderungen dennoch beibehalte, so geschieht es nur, um einmal der palaeontologischen Sitte zu folgen, und zweitens eine weitere Verständigung über die fossile Form des Arni nicht durch Auslöschten eines Namens zu erschweren.

Allem Anschein nach wird die fossile Form die lebende an Durchschnittsgrösse etwas übertroffen haben. Mindestens bin ich noch keines Arni-Schädels ansichtig geworden, der die Dimensionen des grössten unter den Schädeln von Nerbudda erreicht hätte. Stirnbreite zwischen den Hörnern 300 Mm., Umfang der Hornwurzel 430 Mm., grösster Durchmesser derselben 170 Mm., vorhandene Hornlänge 1000 Mm., vermuthliche volle Hornlänge 1150 Mm. Auch darin mag ein leiser Unterschied zwischen der fossilen und der lebenden Form bestanden haben, dass die Hörner, trotz merklicher Verschiedenheit der Richtung von einem Individuum zum andern, doch fast ganz gerade gestreckt und dabei fast ganz quer, rechtwinkelig zur Schädelachse, gestellt sind, so dass sie z. B. bei dem langhörnigsten Schädel Nr. 39715 die ungeheure Spannweite von mindestens  $2\frac{1}{2}$  Meter erreichen konnten. Der Durchschnitt der Hörner, der bekanntlich bei den heutigen Büffeln, obwohl er überaus starken Wechselln unterworfen ist, im Allgemeinen dreikantig ausfällt, mit breiter Ober- und Unterfläche, mehr oder weniger hohem Aussen- und scharfkantigem Medialrand, ist an den fossilen Schädeln fast vierkantig zu nennen. Ober- und Unterfläche sind nahezu platt, die letztere sogar eher concav und aussen durch eine niedrige Aussenfläche medialwärts durch eine stumpfe Kante verbunden. — An dem Schädel 39716 (Dinkel'sche Tafel G, Fig. 3. 3<sup>a</sup>) sind die Hörner merklich verschieden von 39715. Sie sind ganz schwach nach hinten gerichtet und an der Wurzel so breit (Stirnbreite 260 Mm., basaler Hornumfang


420 Mm., grosser Durchmesser der Hornbasis 180 Mm.), dass der Zwischenraum zwischen ihnen und den Augenhöhlen fast unterdrückt ist. Gleichzeitig sind sie im Vergleich zu der riesigen Länge am Schädel 39715 sehr kurz, verlieren sehr rasch an Breite und scheinen bald mit stumpfen Enden abgeschlossen zu haben. Der Durchschnitt bildet, da die Oberfläche schwach convex und die äussere Fläche nicht scharf zugeschnitten ist, eher ein abgeplattetes Oval als ein Viereck. Eigenthümlich ist auch an diesem Schädel ein Kranz von mächtigen Knochengranulationen, der in einem Halbkreis den hintern Umfang der Stirnzone von einer Hornwurzel zur andern, dem Frontalwulst folgend, begleitet. Offenbar ist dies keineswegs, wie Murchison vermuthet, ein besonderes Merkmal einer Species, sondern nur ein individueller Excess von Sculptur, wie er sich bei Rindern aller Art gelegentlich an starken und alten Schädeln einfindet. Ich kenne solche Kränze von Knochenrauhigkeiten an *Bos primigenius*, am Gaur, am Banting, an indischen und africanischen Büffeln, ja sogar an Zebu's.

Alle Schädel des Nerbudda-Büffels sind durch starke Abplattung bezeichnet. An dem breit- und plathörnigen Schädel Nr. 39516 — ich darf ihn geradezu eine säbelhörnige Form von *Bubalus palaeindicus* nennen — erreicht diese Abplattung den höchsten Grad, so dass die Occipitalfläche, vom aufliegenden Frontalwulst abgesehen, fast dreimal so breit ist als hoch.

An dem kleinsten und am schwächsten behornen Schädel Nr. 39759, den ich für weiblich halte (Dinkel'sche Tafel G, Fig. 5, Stirnbreite 230 Mm., basaler Hornumfang 300 Mm., grosser Durchmesser der Hornbasis 110 Mm.), bildet der Durchschnitt ein flaches Dreieck, ähnlich wie bei dem jetzigen indischen Büffel. Auch in anderer Beziehung nähert er sich der heutigen Form des Arni am meisten unter den vier Schädeln des Britischen Museums; er ist am wenigsten abgeplattet, die Parietalzone ist etwas selbstständiger, die Augenhöhlen treten weniger röhrenförmig vor, sogar am Gebiss macht sich eine stärkere Ausbildung der accessorischen Säulchen oberer Backenzähne bemerklich. Immerhin behält er mit dem Schädel des Arni verglichen einige Merkmale, welche allerdings die Beibehaltung eines besondern Namens für die fossile Form rechtfertigen mögen. Am bezeichnendsten ist neben immer noch bedeutend grösserer Abplattung die starke und ununterbrochene Zunahme der Breitenmaasse von vorn nach hinten. Der Gesamtumriss des Schädels ist daher, wenn auch länger gestreckt als etwa beim Bison, dreieckig, während bei dem indischen Büffel die Zuspitzung des Schädels in deutlichen geradlinigen Stufen erfolgt \*).

\*) Die schöne Abbildung Fig. 1. Pl. 22 bei Murchison, combinirt aus mehreren derselben Species — keineswegs, wie Murchison angibt — demselben Individuum angehörigen Fragmenten, ist, obschon nach einem Entwurf von Falconer's Hand, doch dem Arni zu ähnlich gehalten. Der Schädel von *Bubalus palaeindicus* ist in beiden Geschlechtern nach hinten breiter.

## 5. Bubalus (Bos C. E. v. Baer) Pallasii Rütim.



So gut wie für den Büffel von Nerbudda sind es nur praktische Gründe, welche mich bestimmen, die hier genannte neue Form von Büffel mit einem besonderen Species-Namen zu bezeichnen. In Wahrheit kann ich darin nichts Anderes erblicken, als eine geographisch allerdings von Nerbudda weit abgelöste Zwerggestalt von *Bubalus palaeindicus*. Sie stammt aus dem Diluvium von Danzig und ihr erster Ueberrest ist zuerst im Jahr 1823 von C. E. von Baer unter dem Namen *Bos Pallasii* beschrieben worden\*). Diesen letztern in obiger Weise abzuändern, ist nun unentbehrlich geworden, da einestheils eine Verwechslung mit dem von Dekay so bezeichneten fossilen *Ovibos moschatus* nöthig, und zweitens über die Zugehörigkeit des Danziger Fossils zu dem Genus *Bubalus* kein Zweifel mehr vorhanden war.

Es ist das Verdienst von Herrn Prof. Fr. Römer in Breslau, das von Baer beschriebene Fossil wieder der Vergessenheit entzogen und dazu ein zweites von einem kleinern Thier abstammendes Stück ans Licht gebracht zu haben, das ebenfalls aus dem Diluvium von Danzig stammt. Da dieselben in neuerer Zeit sowohl von Prof.

\*) C. E. v. Baer, De fossilibus mammalium reliquis in Prussia repertis. 1823.

Römer \*) als von mir beschrieben worden sind, so bleibt mir hier nur noch übrig, die Beziehungen derselben zu den übrigen Büffeln festzustellen. Beide Stücke bestehen aus je einem Hornzapfen mit anhaftender Stirnhälfte. Das ältere, von Baer erwähnte Stück, ist ein linkseitiges, und was den Hornzapfen anbetrifft, fast unverletzt. Das andere ist rechtseitig, etwas kleiner und im Stirntheil vollständiger, insofern die volle Stirnhälfte sammt der Augenhöhle noch erhalten ist. Ueber die Form des Schädels sagen sie nur sehr wenig aus. Immerhin zu unserm Zweck durchaus Ausreichendes. Es ist offenbar, dass die Hörner rechtwinklig zur Schädelachse und in horizontaler Richtung von einem überaus flachen Stirnbein ausgingen. Die beiden Hornzapfen sind unter sich verschieden. Der grössere, A, von der Olivaer Brücke, Fig. 4. 5. 6 bei Römer, ist sehr breit, unten vollkommen platt, oben schwach convex, auswärts breit zugeschnitten, medialwärts mit stumpfer Kante. Umriss kurz und an der deutlich erhaltenen Spitze sehr stumpf abgerundet. Länge des Hornzapfens 260 Mm., Breite an der Basis 138 Mm., Umfang an der Basis 360 Mm. Das kleinere Horn B, Fig. 1. 2. 3 bei Römer, ist von dem vorigen nur durch geringere Breite und etwas weniger ovalen Umriss verschieden. Der Ansatz an den Schädel und die Beschaffenheit der Stirn verhalten sich durchaus gleich wie bei A. Dimensionen: Vermuthliche Stirnbreite etwa 225 Mm., vermuthliche Hornlänge 260 Mm., basale Breite des Horns 100 Mm., basaler Umfang desselben 295 Mm.

Dass beide Hörner nur Thieren von etwas verschiedener Grösse und Stärke, aber derselben Species angehören, steht ausser allem Zweifel. Nicht weniger sprechend ist aber die Aehnlichkeit des Olivaer-Schädel mit dem von Dinkel in Tafel G zur Fauna sivalensis Fig. 3 abgebildeten Schädels von *Bubalus palaeindicus* Br. M. Nr. 39716 aus Nerbudda. Der Unterschied besteht in Wahrheit, so weit das kleine Schädelfragment von Danzig urtheilen lässt, nur in der Grösse, welche etwa um die Hälfte hinter den oben angegebenen Dimensionen des Nerbudda-Schädels zurückbleibt. An dem kleineren Stück ist der Horndurchschnitt demjenigen des Nerbudda-Schädels Br. M. Nr. 39715 ähnlich, aber das Horn ist um das Vierfache kürzer. Wie ich schon

---

\*) F. Römer, Ueber C. E. v. Baer's *Bos Pallasii* aus dem Diluvium von Danzig. Zeitschr. d. deutschen geolog. Gesellsch. 1875. Mit Tafel XI.

Rütimeyer, Ueberreste von Büffel (*Bubalus*) aus quaternären Ablagerungen von Europa. Verhandl. d. naturf. Gesellschaft in Basel VI. 2. 1875. Pag. 320. In derselben Notiz habe ich auch auf die an mehreren Stellen Italiens allem Anschein nach in pleistocenem Terrain zerstreuten Ueberreste des indischen Büffels in Europa aufmerksam gemacht. Den Fundort in der Nähe bei Rom nennt Ponzi in seiner neuesten Schrift (*Ossa fossili subapennine dei dintorni di Roma*. Pag. 24. (Accad. dei Lincei 1878) praeglacial. Diese Bezeichnung wird wohl auch auf den Fundort Pianosa passen. Ueber denjenigen bei Bologna habe ich auch seither nichts Sicheres erfahren können.



früher geäußert, kann es sich also nur um eine sehr kleine Form von Büffeln handeln, welche im Wesentlichen die Merkmale von *Bubalus palaeindicus* tragen, und es ist von nicht geringem Interesse, dass auch die Schichten, worin die beidseitigen Vorkommnisse liegen, stratigraphisch wohl nicht weit auseinanderliegen werden. Immerhin ist wahrscheinlich, dass das «Diluvium» am baltischen Meer etwas jünger sein wird als der lockere Sandstein an der Westküste von Hindostan. Wenn auch einstweilen auf dem weiten Zwischenraum zwischen beiden Stellen keine Büffel-Ueberreste gesammelt worden sind, so wird es mithin wohl keinem Zweifel unterliegen können, dass schon die pliocenen Büffel Indiens Ausläufer, vielleicht auf Zwergform beschränkt, bis nach Nord-Europa aussandten, und dass auch das Wohngebiet der noch in Indien lebenden Büffel sich in vorhistorischer Zeit bis nach Süd-Europa ausdehnte, ohne von merklichen Veränderungen der Species begleitet gewesen zu sein.

## 6. *Bubalus antiquus* Gervais.

Gervais, Zool. et Paléontol. générales. Pl. XIX., Fig. 6.

Die Riffelbüchse, das geologische Agens, das so sehr beeilt ist, das Wohngebiet sowohl des Arni, als des auf Celebes bereits insular gewordenen *Probubalus* noch weiter als es durch die Natur geschah, d. h. auf Naturaliensammlungen einzuschränken, bedroht bekanntlich auf immer weiterem Raum auch die Existenz der in Africa einheimischen Büffelfamilie. Allem Anschein nach wird hier wie anderwärts durch diese geologisch so neue Macht ein Process von Thierbildung zum Stehen gebracht, zu dessen Entfaltung die Kräfte der vom Menschen unbeherrschten Natur ausserordentlich langer Zeiträume bedurften. Ueberblickt man die überaus zahlreichen localen Modificationen, in welche nach den Berichten neuerer Reisenden der so scharf von dem asiatischen Typus *Buffelus* getrennte africanische Typus *Bubalus*, von der riesig behörnten Form des Cap-Büffels bis zu dem in neuerer Zeit in so viele angebliche Species gespaltenen kleinhörnigen *Bubalus brachyceros* sich auflöst\*), so liegt es nahe anzunehmen, dass eine derartige Zersplitterung eines offenbar einst einheitlichen Ganzen auf geologisch

\*) Proceed. Zool. Soc. of London. 1863. P. 157. (*Bubalus reclinis* u. *planiceros*). 1866. P. 371. 1873. P. 434. (*Bubalus pumilus*, *aequinoctialis* und *caffer*.) etc.

allem Anschein nach überaus passivem Boden sich nicht innerhalb kurzer Frist vollziehen konnte. Nichtsdestoweniger sollte man aus den bisherigen Erfahrungen schliessen, dass der gesammte Vorrath von Bubalus-Gestalten in dem hier gebrauchten Sinn des Wortes relativ sehr neuen Ursprungs sei. Weder in ihrer jetzigen Heimat, noch ausserhalb derselben sind bisher Träger derselben, die doch leicht erkenntlich gewesen wären, aufgefunden worden.

Auch der einzige Beitrag, den ich hier an der Hand der Untersuchung eines schon von Duvernoy\*) und von Gervais\*\*) beschriebenen Fossiles zu der Geschichte der africanischen Büffelfamilie zu fügen vermag, stammt allem Anschein nach aus geologisch geringer Vergangenheit und beschränkt sich darauf, den Verbreitungsbezirk einer noch lebenden Form für praehistorische Zeit, aber allerdings um Beträchtliches, doch nicht etwa über das Gebiet von Africa auszudehnen. Das Fossil besteht in einem mit Absehen vom Gesichte ziemlich vollständigen Schädel aus dem Diluvium von Setif in Algier, der in der palaeontologischen Gallerie des Jardin des Plantes aufgestellt ist.

Auf den ersten Blick ist man nicht geneigt, diesen Schädel, den ich in Paris zu untersuchen Gelegenheit gehabt habe, einem Büffel zuzuschreiben. Die breite gewölbte Stirn und namentlich die sehr breite und kurze Parietalzone, sowie die Gestalt des Occiput erinnern zunächst eher etwa an *Bison priscaus*. Hievon, überhaupt von Bisonten, ist aber die Form der Hörner gänzlich verschieden. Sie sind durchaus seitwärts gerichtet, mit schwacher Biegung nach hinten und dabei ausserordentlich breit und vollkommen platt. Die Unterfläche ist convex, die Oberfläche nahezu flach und beide unter sich durch stumpfe Kanten verbunden. Die vordere Kante ist merklich höher als die hintere. Aus dem geringen Stück von Gesicht, das an dem Schädel erhalten ist, erhellt, dass dasselbe sich vor dem Hornansatz rasch zuspitzte, wobei die Augenhöhlen kaum über die seitlichen Schädelumrisse vorragten. Die Stirnfläche fällt nach vorn rasch gegen die Orbitalgegend ab, die dadurch tief concav erscheint. Die Supra-orbitalrinnen bestehen aus vereinzelt tiefen Löchern und sind weit gegen die Mittellinie hin verlegt. Die Occipitalfläche ist niedrig und sehr stark in die Quere gedehnt.

Die Form der Hörner schliesst von vorn herein alle Gruppen der Rinder, die Büffel ausgenommen, aus, und die starke Abplattung des Schädels, sowie die rasche Zuspitzung des Gesichtes weisen auf die africanische Gruppe derselben und zwar speciell

---

\*) Duvernoy, Comptes rendus de l'Acad. des Sc. 1851. Tom. XXXIII. Pag. 595.

\*\*) Gervais, a. a. O.

auf die mittelafricanische Form *Brachyceros*, mit welcher der fossile Schädel in allen wesentlichen Dingen überaus nahe übereinstimmt, wenn auch seine Grösse derjenigen von Cap-Büffeln gleich ist. (Stirnbreite zwischen den Hörnern 250 Mm., grosser Durchmesser der Hornbasis 170 Mm.) Der fossile Schädel verhält sich, um ihn am sichersten zu charakterisiren, zu dem heutigen *Bubalus brachyceros*, wie *Bubalus palaeindicus* zu dem lebenden *Bos indicus*.

Auf den Namen *Bubalus antiquus*, den ich in meiner früheren Schrift den in Italien fossil gefundenen Ueberresten des indischen Büffels gegeben hatte, verzichte ich jetzt gerne zu Gunsten dieses nördlichsten Vorpostens der africanischen Form, da die erstern eines besondern Namens leicht entbehren können.

## 7. *Amphibos acuticornis* Falconer.

Taf. III, Fig. 1—7.

Trotz aller Inconsequenz, welche darin liegen mag, ein Rind, dem sicherlich bei scharfer Definirung der Name Büffel zukommen müsste, mit dem so viel allgemeinem Titel *Bos* zu bezeichnen, scheint mir der von Falconer gewählte Name für die im Folgenden zu beschreibenden Wiederkäufer so zutreffend, dass ich ihn gerne beibehalte. Umsomehr, da theils frühere Notizen Falconer's, theils directe briefliche Aeusserungen, die ich ihm verdanke, ausser Zweifel stellen, dass Falconer mit diesem Namen wirklich die im Folgenden zu schildernde fernere Form sivalischer Rinder von den bisher hier besprochenen unterscheiden wollte. Ob Falconer dem Worte *Amphibos* denselben Sinn beizulegen beabsichtigte, wie ich es hier zu thun wünsche, mag füglich unentschieden bleiben. Mir leistet das Wort den Dienst, dass es kurz ein freilich vorwiegend negatives Merkmal ausdrückt, das den damit bezeichneten Schädeln zukömmt: die Mittelstellung, die sie in mancher Richtung zwischen Büffeln und Rindern, und zwar im Besondern zwischen *Probubalus* und *Bibovina* einnehmen.

Nicht dass diese Mittelstellung einen Uebergang zwischen beiden Gruppen andeuten könnte, da *Probubalus*, wie das Vorhergegangene erwies, allmählig zu Büffelformen führt, die in Structur des Schädels von *Amphibos* weit entfernt sind. Im Gegentheil erblicke ich in anatomischem Sinne in *Amphibos* viel mehr eine Art von Parallele zu *Probubalus triquetricornis*, die vielleicht eine Linie nach den *Bibovina* hin eröffnet. Dafür sprechen einerseits die Modificationen des Typus von *Amphibos*, welche dasjenige

wiederholen, was bei *Probubalus triquetricornis* als Ausbreitung der Speciesgrenze bezeichnet wurde. Andererseits die äussere Physiognomie des Schädels, welche bei gewissen Formen von *Amphibos* so nahe an diejenige von *Bibovina* streift, dass ich gern gestehe, oft geschwankt zu haben, ob nicht *Amphibos* besser den *Bibovina* einzuverleiben sei. Die Anhaltspunkte, nach welchen ich schon früher, wie auch hier die Scheidegrenze zwischen *Bubalina* und *Bovina* gezogen habe, mussten jedesmal zur Umkehr stimmen.

Von den älteren Angaben Falconer's über dieses Genus, Nr. 562 der Sammlung in Calcutta \*), war schon bei meiner früheren Besprechung desselben die Rede, wo es auch schon mit Bestimmtheit den Büffeln zugewiesen wurde. (Natürl. Geschichte des Rindes. Abth. II. Pag. 29.)

Mein Aufenthalt im Britischen Museum hat auch für dieses, mir früher nur sehr spärlich bekannt gewordene Rind ausserordentlich reiche Belehrung gebracht. Nicht weniger als 12 Schädel, zum Theil von trefflicher Erhaltung, fand ich mich veranlasst ihm zuzuweisen. Zwei derselben, Br. Mus. Nr. 39560 und 39564, sind in verschiedenen Ansichten in Fig. 2 und 3 der von Herrn Will. Davies zusammengestellten und von Dinkel gezeichneten Supplementtafel C zu der *Fauna antiqua sivalensis* abgebildet und auf unserer Tafel III in Fig. 1—5 theilweise copirt worden. Die Dinkel'sche Tafel fügt dazu in Fig. 1. 1<sup>a</sup>. 1<sup>b</sup>. 1<sup>c</sup> noch einen ferneren Schädel mit abgebrochenen Hörnern, dessen Original im East-India-House deponirt ist und den ich nicht in natura untersuchen konnte. Ich darf mir daher nicht erlauben, mich mit Sicherheit darüber auszusprechen, kann aber die Vermuthung nicht unterdrücken, dass er einem weiblichen Thier von *Probubalus triquetricornis* angehöre. Zwei Fragmente aus dem Britischen Museum, einem sehr jungen und einem sehr alten Schädel von *Amphibos* angehörig, Br. M. Nr. 48016 und 39585, habe ich in Fig. 6 und 7 meiner Tafel III beigelegt.

Die allgemeine Form des Schädels ist im Vergleich zu *Probubalus triquetricornis*, der einzigen Büffelform, mit welcher Verwechslung möglich wäre, lang und schmal. Die grösste Breite fällt auf die Augenhöhlen, obwohl dieselben nicht stark vorstehen, sondern eher wie etwa bei Ziegen, oder auch bei den africanischen Büffeln sich rasch zu den von dünnen Rändern umgebenen Oeffnungen verengern. Von röhrenartiger Bildung, wie bei starken Formen von *Probubalus triquetricornis* und bei *Probubalus antilopinus* ist also keine Rede. Auch die Supraorbitalrinnen sind in der Regel schwach

---

\*) Falconer, descriptive Catalogue of the Fossil Remains of Vertebrata in the Museum of the Asiatic Society of Bengal. Calcutta. 1859. Pag. 144 u. f.

und liegen weiter rückwärts als bei *Probubalus triquetricornis*, eher postorbital als supraorbital, so dass sie sogar meist bis an die Hornstiele hinauf sich fortsetzen.

Die Breite des Schädels nimmt also von den Augenhöhlen (Querdurchmesser am stärksten Schädel 220 Mm.) an, sowohl nach hinten als nach vorn ab. Die Stirnzone erscheint für ein Rind ungewöhnlich schmal, und die Hornwurzeln stossen wie bei weiblichen *Bibovina* in deutlichen Schultern der Stirnfläche, in die sie auslaufen, in der Mittellinie des Schädels zusammen. Für eine so ausgedehnte flache interorbitale Stirnplatte wie bei *Probubalus triquetricornis* ist daher kein Raum. Im Gegentheil tritt die Medialnaht der Stirnbeine meist kantenartig vor.

Der Parietalschädel bildet — das stärkste Motiv, um *Amphibos* den Büffeln zuzuzählen — eine selbstständige und relativ langgestreckte Zone von kaum geringerer Breite als die Maxillarzone. Von der Frontalzone neigt er sich in der Regel weniger abwärts als bei *triquetricornis* und verläuft an jüngern Schädeln sogar ziemlich horizontal. Die Coronalnaht ragt mit stumpfem Winkel bis zwischen die Hornwurzeln. Da die Scheitelfläche sich in Kanten gegen die Schläfe hinabbiegt, so erhält die Parietalzone fast einen viereckigen Durchschnitt, sehr verschieden von der platten Form von *Bubalus triquetricornis*. Durch diese Selbstständigkeit des Parietaltheils unterscheidet sich *Amphibos* auch wesentlich von den *Bibovina*, wo derselbe von dem Frontalschädel bereits wie ein von letzterem bald zu unterdrückendes Appendix abgeschnürt ist. Er ist sogar länger als bei *Triquetricornis* und erscheint um so schlanker, als auch die Occipitalfläche rechtwinklig von der Parietalzone abgebogen, viel weniger in die Breite gezogen und nicht von so mächtigen Kanten eingerahmt ist. Die Occipitalschuppe greift auf die Oberfläche der Scheitelzone hinüber. Auch Augenbogen, Jochbogen, *Processus exoccipitales*, kurz alle Muskelansätze sind weniger derb und massiv gebildet als bei *Probubalus triquetricornis*. Die Schläfengrube ist offener und länger gestreckt.

Sehr charakteristisch verhält sich bei *Amphibos* auch Form und Einsetzung der Hörner. Wie schon bemerkt, sind sie getragen von starken frontalen Hornschultern, die nicht selten, wenn der Hornzapfen am Anfang der Hornscheide verdickt ist, deutliche Hornstiele bilden, an welche sich die Supraorbitalrinnen bis zur Hornscheide hinaufziehen. Solche Hornstiele bilden auf ihrer Oberfläche meist scharfe Kanten, die erst gegen die Mitte der Stirn hin erlöschen und beim Verlassen derselben mitunter sogar in rauhe Höcker anschwellen können (Fig. 7, Tab. III), was der Stirn eine eigenthümliche Ziegen-Physiognomie aufdrückt.

Die Hörner sind unter allen Umständen steiler gestellt als bei *Bubalus triquetricornis* und divergiren in schwächerem Winkel. Sie verrathen eine deutliche spirale

Drehung wie etwa bei *Tragelaphus* unter Antilopen, so dass die Fläche, die an der Wurzel die äussere ist, gegen die Hornspitzen zur oberen wird. Sie erreichen unter Umständen eine sehr beträchtliche Länge, die mehreren Schädelnängen gleichkommen kann. (Länge an dem Schädel Fig. 1. 2, Taf. III, 660 Mm., basaler Umfang 310 Mm.)

Der Durchschnitt der Hörner ist in der Regel drei- bis vierkantig. Eine obere oder vordere Kante, bald wenig, bald sehr scharf ausgesprochen, ist die Fortsetzung der Kante des Hornstiels. Die schärfste und constanteste Kante ist die fast allen Büffeln zukommende und begrenzt medialwärts die Unterfläche. Weit schwächer ist diejenige, die von dem lateralen oder Schläfenrand der Hornwurzel ausgeht. Von den drei hiedurch begrenzten Flächen ist die untere, wie bei den meisten Büffeln platt, die äussere stark gewölbt, oft so sehr, dass sich hier eine vierte Kante bildet, die innere concav. Von den ebenfalls dreikantigen Hörnern des *Probubalus triquetricornis* unterscheiden sich diejenigen von *Amphibos* durch viel geringere Abplattung. An jungen und weiblichen Schädeln können die Hörner durch Erlöschen der Kanten fast cylindrisch werden.

Der Gesichtsschädel zeichnet sich im Vergleich zu *Probubalus triquetricornis* durch grosse Schlankheit aus, die wieder an *Bibovina* erinnert. Er verjüngt sich nach vorn nicht stufenförmig, sondern sehr allmähig. Dies spiegelt sich ab in der schlanken und nach hinten kaum erweiterten Form der Nasenbeine und in der schmalen und gestreckten Form des Gaumens. Die Choanenöffnung ist wie bei indischen Büffeln um Beträchtliches hinter die übrige Grenze des Gaumens verschoben. Die Wangenfläche ist niedriger, die Höhe der Zahnsäulen also geringer, *Massetererista* und *Tuber maxillare* schwächer ausgesprochen als bei *Probubalus*. Das Gebiss ist auch in anderer Rücksicht schwächer, die Zähne comprimirt und in ihrem ganzen Gepräge lockerer gebaut, weniger massiv als bei *Probubalus*.

**Jugendform.** Ich zähle hieher die Schädel Br. M. Nr. 48016 (unsere Fig. 6, Taf. III) und 48018. Dass diese beiden Fragmente jungen Thieren vom *Bubalus*-typus angehören, kann keinem Zweifel unterliegen. Zur Darstellung hätte vielleicht Nr. 48018, wo ein Horn noch erhalten ist, besser gepasst, da allerdings die Seitenkanten der Scheitelfläche bei 48016 ungewöhnlich scharf ausgebildet sind. Der Schädel, überdies anders gestellt als die übrigen derselben Tafel, d. h. die Parietalzone vollkommen von oben gesehen, erhält dadurch eine sonderbare Aehnlichkeit mit *Portax* (vergl. Fig. 8, Taf. VI), die indess nur eine äusserliche ist, da ja die Breite der Stirnfläche, die Stärke und Form der Hörner durchaus verschieden sind. Von *Probubalus*-Schädeln ähnlichen Alters unterscheiden sich beide schon jetzt nach allen oben als distinctiv bezeichneten Richtungen. Der Parietalschädel ist gestreckter,

schmäler, weniger abwärts geneigt, die Occipitalfläche weniger breit, die Hörner steiler gestellt und mehr nach rückwärts gerichtet, die Augenhöhlen weniger vorragend. Von ältern Stadien von *Amphibos* zeichnen sie sich nur aus durch allgemeine Gracilität und durch geringe Stärke und (wenigstens bei 48018) durch sehr schwache Andeutung der Hornkanten.


**Weibliche Form.** Sie scheint nur vertreten zu sein durch drei Schädel (Br. Mus. Nr. 39564, Original von Fig. 3. 3<sup>a</sup>. 3<sup>b</sup>. 3<sup>c</sup> der Dinkel'schen Tafel C und von Fig. 3. 4. 5 unserer Tafel III, ferner Nr. 29562 und 17555. Das gemeinsame und wesentliche Merkmal dieser Schädel — und ich glaube mich behufs ihrer Charakterisirung auf diese Bemerkung beschränken zu können — besteht darin, dass sie gewissermassen der Jugendform getreu verbleiben. Die starke Divergenz der Hörner an dem zur Abbildung gewählten Schädel betrachte ich als individuelle Abweichung; sie deutet uns vielleicht an, dass sich von hier aus auch bei *Amphibos* *Trochoceros*-Gestalten abzweigen konnten. Auch eine nochmalige Vergleichung mit der in Fig. 1. 2, Taf. I abgebildeten weiblichen Form von *Probubalus* scheint mir nach dem Obigen entbehrlich zu sein.

**Männliche Form.** Als besonders typisch erscheinen mir der Schädel Br. M. Nr. 39560, Original zu der Dinkel'schen Fig. 2 und zu unserer Abbildung Fig. 1. 2, Taf. III, ferner Nr. 48014. 48022. Nach ihnen ist die obige Schilderung von *Amphibos* entworfen.

Den Excess derselben, wie er in sehr starken und alten Thieren auftritt, vertreten die Schädel Br. M. 39585, Original zu unserer Fig. 7, Taf. III, Nr. 48020 und 40886. Der Parietalschädel kann an so mächtigen Schädeln kürzer ausfallen und wohl so stark nach abwärts gerichtet sein wie bei *Bub. triquetricornis*, und die mächtige Bewaffnung mit entsprechender Verstärkung aller Muskelansätze kann solchen Schädeln oft ein Gepräge geben, das sie auf den ersten Blick nicht so leicht von starken *Probubalus*-Köpfen unterscheiden lässt. Auch die Supraorbitalrinnen werden in solchen Fällen zu tiefen Gruben. So trotzige Ausrüstung ist bei *Amphibos* so wenig als bei *Probubalus* nothwendig an bedeutende Körpergrösse gebunden. Nr. 48014, einer der stämmigsten *Amphibos*-Schädel, steht eher unter als über der Mittelgrösse und hat mit den Bockköpfen von *Probubalus* grosse Aehnlichkeit der Physiognomie. Immerhin reichen auch in solchen Fällen die oben namhaft gemachten Merkmale zur Unterscheidung aus. Der mächtigste Schädel von *Probubalus* ist Nr. 40886; ihm ebenbürtig an Grösse und Wucht ist Nr. 39585 für *Amphibos*. Bei letzterem sind die Augenhöhlen trichterförmig, nicht röhrenförmig, die Hornschultern in scharfkantige Buckel erhoben und von tiefen Supraorbitalrinnen durchfurcht, die Nasenbeine weniger

breit; kurz, immer kommen nach beiden Seiten die Züge des Genus doch noch zum Ausdruck.

Die Holzschnitte machen auf die Modification der Hornform, welche an männlichen Schädeln von *Amphibos* vorkommen, aufmerksam. Wie man sieht, halten sie sich innerhalb weit engerer Grenzen, als bei *Probubalus*.





## B. Bibovina.

Ich finde mich nicht veranlasst, in der gegenwärtigen Uebersicht der fossilen Rinder der früher gegebenen Darstellung der Bibovina Wesentliches beizufügen. Aus mehreren Gründen ist dieser heute nur noch asiatischen Abtheilung von Rindern in der früheren Abhandlung über diesen Gegenstand gewissermaassen der Ehrenplatz eingeräumt worden. Einmal, weil es mir gelungen war, über deren jetzt noch lebende und von der älteren Litteratur mit Ausnahme von Salomon Müller sehr kümmerlich behandelte Vertreter mir ziemlich umfassende Beobachtung zu verschaffen\*). Vielmehr aber desshalb, weil sich ja an diese Gruppe ein besonderes palaeontologisches Interesse doppelter Art knüpfte. Nicht nur erschien sie noch im heutigen Gewand wie eine noch mit aller Elasticität und Bildungskraft begabte, man möchte sagen, noch jugendfrische Gruppe von Geschöpfen, fähig, heute noch Sprossen aller Art in neue Geleise auszusenden, und von einer Anzahl solcher Ableger bereits umgeben; noch mehr Bedeutung verlieh ihr ja der Nachweis, dass sie trotzdem keineswegs etwa geologischer Tradition entbehre, sondern dass auch ihr Bauplan mindestens in die pliocene Periode hinaufreiche. Noch jugendlicheres Gepräge als am Sunda-Ochsen wurde ja an *Bos etruscus* nachgewiesen, der hiemit gleichzeitig Süd-Europa dem bisher bekannten Quellgebiete dieses Typus beifügte und sich ähnlich an die Wurzel der Bibovina stellte wie *Probubalus* für *Bubalina*.

So überaus ergiebig sich der Sandstein der sivalischen Hügel an geologisch alten und somit, wenigstens zum Theil, an morphologisch-jungen Gestalten von *Bubalina* erwies, so gering muss der Abfall erscheinen, der daraus den Bibovina zufloss. Immerhin mit einem allerdings nicht leicht wiegenden Vorbehalt. Sah ich mich schon im Verlauf der bisherigen Mittheilungen, und lediglich aus morphologischen Motiven,

---

\*) Einige neuere Beifügungen sind niedergelegt in den Verhandlungen d. Naturf. Gesellschaft in Basel. VI. 3. 1878. Pg. 511 u. f.

genöthigt, die indische Antilope *Portax* mit der Reihenfolge der Rinder in überaus nahe Berührung zu bringen, und *Bos etruscus*, immer in diesem Lichte, zwischen *Portax* und *Bibos* einzuschalten, so wird es für den Nachweis, den die weitere Sichtung der sivalischen sowie der toscanischen Ernte bringen wird, nicht bedeutungslos erscheinen können, dass sowohl in Indien als in Süd-Europa in tertiärer Zeit allerlei Geschöpfe die für unser Auge immer noch offene Bresche zwischen *Portax* und *Bibovina* ausfüllen, denen unsere doch vorzugsweise an äussere Zuthaten knüpfende Sprache den Titel Rind vielleicht versagen würde.

Es schien mir daher geboten, diesen neuen Formen ein besonderes Capitel unter dem Titel *Portacina* zu widmen. Für *Bibovina* im bisher gebrauchten Umfang des Wortes beschränke ich mich auf folgende Bemerkungen.

## 1. *Bos (Bibos) Palaeogaurus* Falconer.

Unter diesem Titel erwähne ich ohne besondere Beschreibung ein Schädelstück des Britischen Museums aus *Nerbudda*, Br. M. Nr. 36672. Es besteht lediglich aus der Maxillarzone, aber mit vortrefflich erhaltenem Gebiss, eines Schädels, den ich unbedenklich *Bibos Gaurus* nennen würde, wenn ich nicht die Sitte im Allgemeinen für nützlich hielte, Fossilien einstweilen mit besonderen Namen zu bezeichnen. Dennoch, da ich keinen Unterschied von dem lebenden *Bos Gaurus* entdecken konnte, würde ich auf einen Namen verzichtet haben, wenn derselbe sich nicht, freilich ohne Nachweis, dass er diesem Fossil gewidmet war, in den Manuscripten Falconer's vorgefunden hätte. Das Fossil führt also auch den Gaur zum mindesten in irgend einen Theil der postpliocenen Epoche hinauf.

## 2. *Bos (Bibos) etruscus* Falconer.

Ich verweise für diese Species auf die früher gegebene Beschreibung, *Natürliche Geschichte des Rindes*, Abth. II. Pag. 71—77, Taf. I, Fig. 3—5. Der dort abgebildete Schädel ist, zu im Folgenden zu verwerthenden Zwecken, in anderer Stellung von Neuem dargestellt in unserer diesmaligen Taf. VII, Fig. 3. In derselben Absicht

ist der schon früher (a. a. O. Pag. 74) mitgetheilte Holzschnitt des Schädels im Museum von Florenz hier wiederholt.



Trotz erneuerter Durchsicht der Sammlung des Museums von Florenz sehe ich mich nicht veranlasst, der früheren Beschreibung dieser Fossilien etwas beizufügen, obwohl die Ueberreste dieses wichtigen Thieres, welche seit Nesti's Zeiten in den norditalienischen Museen in grossen Massen deponirt sind, Stoff zu einer vollständigen Monographie des ganzen Skeletes liefern würden. Diese zu unternehmen, muss ich den einheimischen Palaeontologien überlassen.

Wichtig scheint mir hier nur eine Bemerkung von geographischem Interesse. Erst meine neueren Reisen haben mir den längst erwarteten Beleg geliefert, dass *Bos etruscus* auch der pliocenen Fauna der Auvergne angehöre. Abgesehen von einigen Ueberresten, die ich in den palaeontologischen Sammlungen der Auvergne selbst, namentlich in Puy auffand, konnte ich mich überzeugen, dass der Schädel von *Bos elatus Croizet*, den die Gallerie des Jardin des Plantes in Paris seit langer Zeit besitzt, durchaus nichts anderes als *Bos etruscus* ist. Dasselbe besagen die von Abbé Croizet selbst herrührenden Ueberreste von *Bos elatus* aus dem Pliocen von Perrier bei Issoire, die im Besitz des Britischen Museums sind (Nr. 27640 und 27641). Weniger sicher blieb mir, ob nicht auch die mit dem Namen von *Bos elaphus Bravard* MS bezeichneten Ueberreste aus Arde, Puy-de-Dôme (Br. M. Nr. 46939) zu *Bos etruscus* zu zählen seien. Aus England selbst ist mir dagegen im Britischen Museum Nichts begegnet, was ich mit *Bos etruscus* hätte identificiren können. Die vielen Uebereinstimmungen zwischen der pliocenen Fauna Englands und derjenigen von Frankreich und Italien möchten dies indess wohl als eine zufällige Lücke erscheinen lassen.

---

## C. Portacina.

### 1. *Leptobos Falconeri* Rütim.

Taf. I, Fig. 7. 8. Taf. IV, Fig. 3. 4. 5. 6. Taf. VI, Fig. 9.

Die vier Stücke des Britischen Museums, die ich zunächst unter diesem Namen zusammenstelle, bilden eine kleine Gruppe, die sich unter dem Vorrath der von Falconer und Cautley gesammelten Wiederkäuer durch Eigenthümlichkeit der Form sowohl als durch geringe Schwankungen derselben schärfer als irgend eine andere hervorhebt. Von der ersten provisorischen Sichtung an, wo ich noch ohne genauere Untersuchung die Schaaren von Schädeln erst nur in physiognomische Gruppen brachte, bis zum Schluss der Arbeit fanden sich diese vier Hirschköpfe, wie ich sie zum Behuf der Orientirung vorläufig nannte, immer wieder zusammen, ohne dass man über ihre Zusammengehörigkeit je schwanken konnte. Sie stammen aus den sivalischen Hügeln und tragen die Nummern Br. M. Nr. 39566. 39567. 40887. 48026. Die Dinkel'sche Supplementtafel *S* zur Fauna sivalensis stellt die beiden ersten, unsere Fig. 7. 8, Taf. I das dritte dieser Stücke dar. Fig. 3. 4 unserer Tafel IV ist die Copie der Dinkel'schen Zeichnung von Nr. 39567. Viele Schwierigkeiten verursachte nur ein fünfter Schädel, Br. M. Nr. 48037, von demselben Fundort, auf der nämlichen Dinkel'schen Tafel *S* und auf unsern Tafeln in Fig. 5. 6, Taf. IV, und Fig. 9, Taf. VI dargestellt, der sich von den übrigen durch vollkommene Hornlosigkeit unterscheidet. Er wird selbstverständlich besonders zur Sprache kommen. Ob Falconer dieser Gruppe, an deren Erkennung schon durch ihn man nicht zweifeln kann, bereits einen besondern Namen, und welchen gegeben hatte, ist mir aus den Etiketten und aus seinen Manuscripten nicht hinlänglich klar geworden. Doch muss ich vermuthen, dass ihr einer der beiden in den Manuscripten vorkommenden Namen *Leptobos antilopinus* und *elatus* gewidmet war, Namen, welche sich vermuthlich auf die Beschaffenheit von Skeletstücken anderer Art als Schädel bezogen. In dieser Ungewissheit, und bei der Nothwendigkeit in der

ich mich befand, meine Untersuchung auf Schädel zu beschränken, wähle ich den Ausweg, von der vermuthlichen ursprünglichen Bezeichnung mindestens den sicherern Theil, den Genus-Namen zu behalten, da er mindestens eine Eigenthümlichkeit, die den Schädeln zukömmt, eine für Rinder ungewöhnliche Leichtigkeit und Schlankheit, die mir den Namen Hirschkopf aufdrängte, passend ausdrückt. Von vornherein muss man sich zu solchen Schädeln ein leichtgebautes Skelet hinzudenken.

An Grösse stehen diese Schädel denjenigen der übrigen sivalischen Rinder, wie schon unsere durchweg im gleichen Maassstab gehaltenen Abbildungen zeigen, nicht nach. An dem starken Schädel Nr. 40887 (Fig. 7. 8, Taf. I), der vielleicht einem männlichen Thiere angehörte, beträgt die grösste Schädel länge 450 Mm., die Schädel länge bis zur Nasenspitze 400 Mm., Länge der Schädelbasis 425 Mm., Breite aussen an den Augenhöhlen 220 Mm.

### A. Horntragende Form.


Schon die Gesamtform dieser Schädel ist überaus typisch und lässt sie mit Leichtigkeit von allen bisher beschriebenen Gruppen unterscheiden. Sie sind im Vergleich zu den letztern in ihrer ganzen Ausdehnung auffällig niedrig und platt, und im Umriss ausgesprochen dreieckig oder oval. Die Hörner sind schwach und dem Augenhöhlendach direct oder nur wenig hinter diesem, und gänzlich am Seitenrand der Stirnfläche eingepflanzt. An dieser Stelle besitzt daher die Schädeloberfläche die grösste Breite. Vor ihr verjüngt sich der Gesichtsschädel rasch in eine schlanke Schnauze. Aber auch hinter dem Hornansatz dehnt sich die Schädeloberfläche noch in eine ausgedehnte Facette von ovalem Umriss aus, die mit flügelartig vorspringenden Rändern die Schläfe überdacht und sich durch eine enge intertemporale Brücke zwischen den hintern Oeffnungen der Schläfengruben mit der Occipitalfläche in Verbindung setzt.

Schon diese allgemeine Schilderung lässt wohl erkennen, dass dieser Plan von Schädelstructur von demjenigen aller bisher bekannt gewordenen Rinder abweicht und mit demjenigen der Portaxgruppe unter den Antilopen in nächster Verbindung steht.

Die wesentlichsten Merkmale bestehen in der Lage der Hörner und in der Art, wie sich die Stirnzone und die Scheitelzone an dem Aufbau des Schädels betheiligen. Auffällig ist schon die für Rinder geringe Stärke der Hörner, welche cylindrisch oder höchstens auf der untern Fläche etwas abgeplattet sind und sich ziemlich steil und in ziemlich offenem Winkel divergirend über den Schädel erheben. Allem Anschein nach

waren sie kurz und gegen die Spitze leicht gebogen. Weder auf Stärke noch auf Richtung oder Form derselben möchte ich indessen besonderes Gewicht legen. Bedeutsam ist dagegen ihre Einpflanzung. Sie wurzeln wie bei Hirschen mehr oder weniger supraorbital, d. h. direct oder unmittelbar hinter den Augenhöhlen auf dem Seitenrand der Stirn. Sie sind also etwas weiter vorn und — womit dann allerdings ihre geringe Stärke in Verbindung steht — weiter auswärts eingepflanzt als bei irgend einem sonstigen Rind, gewissermaassen extracranial. Die Lage wechselt etwas nach Individuen. An dem stärksten Schädel Nr. 40887 heben sie von dem Orbitaldach an, während sie an den übrigen etwas hinter den Augenhöhlen zurückstehen. Immer aber letzteren doch noch so nahe, dass die Supraorbitalrinnen sich bis an das Horn hinaufziehen, wie etwa gelegentlich bei Amphibos, wo freilich der Ursprung der Hörner vollkommen hinter die Augenhöhlen und gleichzeitig fast in die Mittellinie des Schädels verlegt ist.

Nicht weniger typisch ist die Rolle, welche dem Stirnbein und dem Scheitelbein an der Bildung der Hirncapsel zukommt. Die Coronalnaht liegt wie bei der grossen Mehrzahl der Hornträger direct hinter den Hornwurzeln \*). Die Stirnzone nimmt daher trotz grosser Breite in longitudinaler Richtung einen viel kleinern und die Parietalzone



einen viel grössern Antheil an dem Schädeldach als bei irgend einem andern Rind, etwa Anoa allein ausgenommen, wo freilich ganz andere Verhältnisse sich damit combiniren.

---

\*) In Fig. 7, Taf. I ist sie nur nachträglich und fast unmerkbar in die Zeichnung eingetragen worden. An derselben Figur ist die Deltoidnaht zu weit nach vorn verlängert, daher ich die Lage der Coronalnaht in dem obigen Holzschnitt corrigire, wobei ich die Art der Zuspitzung der Hinterhauptsschuppe unbestimmt lassen muss.

Am nächsten steht *Leptobos* in dieser Beziehung offenbar *Bos etruscus* oder jungen heutigen Vertretern der *Bibos*-Gruppe. (Vergl. Fig. 4, 5, Taf. VII.) Aber auch da ist die Stirnzone viel mehr in die Länge ausgedehnt, die Hörner daher weit hinter die Augenhöhlen verlegt und die Parietalzone bereits gleichsam aus dem Bereich des Stirnschädels hinausgestossen. Immerhin ist offenbar der breite Sattel, der sich quer über der Stirne zwischen den Hornwurzeln ausspannt, die erste Andeutung des Frontalwulstes, der bei *Bibovina* die Parietalzone überdacht und bei *Gaurus* schliesslich die ungeheure First zwischen Stirn und Hinterhaupt darstellt. Denselben Plan wie bei *Leptobos*, nur mit schwächerer Bewaffnung und ausgedehnterer Scheitelzone, treffen wir aber bei *Portax*, wenn auch bei diesem Genus die rauen und stark gefurchten Hornzapfen durch eine scharf markirte Verdickung sich von dem Stirnbein abheben, während sie bei *Leptobos* wie glatte Ausläufer der Stirn erscheinen. Sie enthalten einen weiten diploëtischen Hohlraum, der sich wohl bis in das Augenhöhlerdach fortsetzen wird. (Fig. 4, Taf. VI; Fig. 16, Taf. V.)

Vollkommen ähnlich wie bei *Portax* ist dann die besondere Modellirung der Schädeloberfläche, worauf freilich, so bestechend sie für das Auge ist, wohl weniger Gewicht zu legen ist, als auf die tiefer liegenden soeben besprochenen Merkmale. Nur bei *Portax* stossen wir in Folge der ausgiebigen Verschmelzung von Stirn- und Scheitelzone auf die merkwürdige Facette, welche bei *Leptobos* die Schädeloberfläche noch weit über den Hornansatz hinaus nach hinten fortsetzt. Eine leise Neigung zu ähnlicher Bildung kann sich auch bei *Amphibos* einfinden (Fig. 6, Taf. III). Besonders augenfällig ist die Art, in welcher bei beiden Genera die Seitenränder der Schädeloberfläche sich unmittelbar hinter den Hornwurzeln über die Schläfe ausdehnen, die Hörner hier wie mit einer Verbindungsmembran an die Scheitelzone heftend (Fig. 4, Taf. IV), um dann schliesslich beidseits an der hintern Oeffnung der Schläfengruben in die Occipitalcrista überzufließen.

Ein directer Anschluss von *Leptobos* an andere *Cavicornia* ist also nur bei *Portax* zu finden, und wenn ich dennoch *Leptobos*, als Vertreter einer besondern Gruppe *Portacina*, den Rindern beizähle, so geschieht dies weit weniger in Rücksicht auf Körpergrösse, als weil dabei *Leptobos* das Uebergewicht der Stirnzone über die Parietalzone doch nach Rinderart weit über das Maass von *Portax* hinausführt. Mag auch dies zunächst nur Folge relativ stärkerer Bewaffnung sein, so führt es eben doch den Plan der Antilope bis zu einem Grade weiter, den wir aus manchen Gründen Rind zu nennen genöthigt sind.

Die übrigen Merkmale von *Leptobos Falconeri* lassen sich nach dieser Erörterung kurz anreihen. Sie wiederholen fast sämmtlich Merkmale von *Portax*, mit dem wichtigen



Unterschiede, dass von der in der ersten Hälfte dieser Arbeit erwähnten Spur von vordern Stirnhörnern bei Portax, d. h. von einer vordern Oeffnung des Supraorbitalcanales nichts vorhanden ist. Die merkwürdige Erinnerung, welche Portax noch mit Tetraceros verbindet, ist also gänzlich erloschen. Bei Portax fehlen ferner die starken Supraorbitalrinnen von Leptobos. Die Hinterhauptsfläche entspricht durch niedrige Gestalt der allgemeinen Abplattung des Schädels. Bemerkenswerth ist die geringe Ausbildung der paroccipitalen Theile; sie lässt auf eine leichte Befestigung des Schädels an den Rumpf schliessen.

Schon mit den Augenhöhlen beginnt die rasche Zuspitzung des Gesichtes. Ihre Oeffnung ist schiefgestellt, dünnrandig und klein, so dass sie kaum aus dem seitlichen Umriss des Schädels vorragen. Gleich rasch und ohne merkliche Stufen verjüngt sich der maxillare Theil des Schädels; die Nasenbeine sind schmal und flach, weder nach hinten noch nach vorn erweitert und bis in vorgerückte Altersstufen durch dreieckige Gesichtslücken von dem Thränenbein getrennt; an dem vordern Ende allem Anschein nach ohne Incisuren. Maxillar- und Intermaxillärzone sind niedrig und trotz einer ansehnlichen Anschwellung in der Gegend des Tuber maxillare ohne scharfe Muskelansätze. Obschon das Thränenbein vollkommen seitlich, in der Wangenfläche liegt, so verläuft die Massetercrista noch merklich tief unter ihm. Augen- und Jochbogen sind leicht und schlank, der letztere bis an seine Wurzel dünn, unten flach und rechtwinklig von der Wangenfläche abstehend. Die Schnauze ist antilopenähnlich fein; der Gaumen ist schmal, die Choanenöffnung wie bei Portax lang, nach vorn zugespitzt und bis in die Gaumenfläche hinein verlängert. Die Backzahnreihen, in Structur von bovinem Gepräge, verlaufen nicht geradlinig, sondern bogenförmig, am hintern Ende sich einander entgegen neigend.

Die Unterschiede zwischen den vier behornen Schädeln von Leptobos sind unerheblich. Sie beschränken sich hauptsächlich auf die Stärke und die damit offenbar in Verbindung stehende Lage der Hörner. Ob darin Geschlechtsunterschiede angedeutet sein mögen, vermag ich nicht zu unterscheiden. In solchem Fall würde ich den Schädel Nr. 40887, der die stärksten und gleichzeitig am meisten nach vorwärts verlegten Hörner trägt, einem männlichen Thiere zuschreiben, wie er denn auch kräftiger gebaut ist. In allen Theilen ist er etwas breiter und kürzer als die übrigen.

---

## B. Hornlose Form.

Taf. IV, Fig. 5. 6. Taf. VI, Fig. 9.

Der schon genannte Schädel Br. M. Nr. 48037 verleiht dem Genus *Leptobos* ein neues Interesse, dessen Tragweite sich weit über den sivalischen Fundort hinaus erstreckt. Er ist vollkommen hornlos. Mochte schon der bei *Probubalus* geführte Nachweis neu genug erscheinen, dass die Bewaffnung schon an tertiären Büffeln innerhalb derselben Species von überaus mächtigen Graden bis zum Verschwinden der Hörner schwanken konnte, so sind die Folgerungen, die sich an die hornlose Form von *Leptobos* knüpfen, viel bestimmter Art. Von allmäligen Uebergängen in die horntragende Form konnte ich in der sivalischen Sammlung nichts entdecken. Von vorn herein lag also die Frage vor, ob der hornlose Schädel den behornten, ja ob er überhaupt den Rindern beizuzählen sei. Im Falle der Bejahung eröffnete sich die Lehre, dass auch das Rind in tertiärer Zeit, so gut wie die Ziege in *Bucapra Daviesii*, unter Umständen die Metamorphose von Jugend zu Alter durchlaufen konnte, ohne zu der als so typisch betrachteten Zuthat der Hornträger zu schreiten. Der erste Blick auf den fraglichen Schädel lehrte, dass er nach Grösse, nach Gebiss, nach Gestalt nicht etwa auf jugendlicher Stufe stillgestanden sei, sondern dass er die volle Bahn der Species, nur mit Verzicht auf Ausrüstung zur Wehr durchlaufen habe. Die Hörner mussten also jetzt als individuelle und nebensächliche Zuthat erscheinen, da sich der Plan der Species auch ohne sie als durchführbar erwies. Wie bei Hirschen die Bildung frontaler Epiphysen nur an Fluth und Ebbe sexueller Thätigkeit gebunden ist, so stellte sich jetzt sogar unter Rindern Hornlosigkeit als alter Grundplan des Familien-Typus heraus. Konnte Hornlosigkeit bei *Probubalus* noch etwa als individueller früher Stillstand in dem Wachsthum der Hörner gelten, so erschien der hornlose *Leptobos* als eine bovine Parallele zu *Hydropotes*, *Lophotragus*, *Moschus* und so manchen asiatischen Vertretern der Hirsche, die den Kinderschuh der Familie treu geblieben sind; und es war ein günstiges Zusammentreffen, dass sich gleichzeitig, von ganz anderer Betrachtung aus, eine Form von Antilopen, wo sich Hornbildung allem Anschein nach starren Sitten noch keineswegs unterworfen hat, in Structur des Schädels mit *Leptobos* in Eine Linie gestellt hatte. Die Methode, die diesen Untersuchungen zum Leitfaden diente, gewann dadurch nicht wenig an Rechtfertigung.

Die Länge des Schädels Nr. 48037 beträgt 380 Mm., die grösste Breite, aussen

an den Augenhöhlen 175 Mm. Er erscheint in seiner gesamten Ausdehnung gestreckter und schlanker, sowie auch niedriger als die behornten Schädel derselben Species. Der Umriss ist also kaum mehr dreieckig. Die Oberfläche der Hirnschale, die vielleicht auch durch Druck etwas flacher erscheinen mag, bildet in ihrer Gesamtheit von den Nasenbeinen an ein ziemlich regelmässiges Oval, dessen grösster Querdurchmesser nahezu in dessen Mitte, in den hintern Augenhöhlenwinkel fällt. Die hintere Hälfte dieser Fläche ist sogar noch länger und auch im Umriss gestreckter als die vordere. Sie verhält sich aber, von Hörnern abgesehen, zu der Nachbarschaft vollkommen wie die hinter den Hornwurzeln liegende Facette der behornten Schädel. Sie überdacht mit flügelförmig vortretenden Rändern die niedrige Schläfengrube und setzt sich hinter derselben durch eine schmale Brücke in die vorstehenden Kanten des Hinterhauptes fort (Fig. 9, Taf. VI). Wie bei den behornten Schädeln ist diese Fläche zum grössten Theil vom Stirnbein, zu einem etwas kleinern Theil vom Scheitelbein gebildet. Obschon die dünne Knochenrinde im hintern Theil des Fossiles abgebröckelt ist, so ist doch die Coronalnaht noch mit Sicherheit zu erkennen. Sie verläuft in der Mitte zwischen dem hinteren Augenhöhlenrand und der Hinterhauptskante ziemlich quer, nur gegen die Sagittalnaht in stumpfem Winkel vorspringend. Die Lambdoidnaht ist nicht mehr zu erkennen; sie wird sich nahe an die Hinterhauptskante gehalten haben. Die Betheiligung von Stirn- und Scheitelbein an der Bildung des Hirndachs ist also vollkommen ähnlich wie an den behornten Schädeln; nur dass der parietale Antheil, dem allgemeinen Umriss des Schädels entsprechend, etwas ausgedehnter ausfällt.

Die Schädeloberfläche ist im Ganzen fast flach. Immerhin neigt sich, wie die Seitenansicht zeigt, die hintere Hälfte etwas nach hinten, die vordere etwas nach vorn abwärts. Ein schwacher Sattel liegt also in der Gegend der grössten Breite. Die bei den behornten Schädeln so scharf von der eigentlichen Stirnzone abgesetzte, hinter dem Hornansatz liegende Facette macht sich hier um so mehr bemerkbar, da die Augenhöhlen und namentlich ihr hinterer Theil viel mehr aus dem Umriss der Schädeloberfläche vortreten als bei den behornten Formen. Leider bringt dies weder die Dinkel'sche Zeichnung noch die von mir gegebene zu genügendem Ausdruck. Ueberdies ist die vordere Hälfte durch eine etwas vorstehende Sagittalcrista in zwei seitliche, zwischen Augenhöhlen und Mediannaht schwach vertiefte Facetten getheilt. Sie verhält sich also in dieser Beziehung etwas ähnlich wie bei der hornlosen sivalischen Ziege *Bucapra* (Fig. 8, Taf. II), um so mehr als selbst die mediane nasale Facette, die sich dort von vorn her zwischen die beiden frontalen einschiebt, schwach

angedeutet ist. Sehr seichte Supraorbitalrinnen verlaufen etwas einwärts der Augenhöhlenränder und diesen parallel.

Der Gesichtsschädel entspricht, abgesehen von seiner gestreckten Form, bis in alle Details demjenigen des horntragenden *Leptobos*. Die Verlängerung betrifft die Maxillar- und die Intermaxillärzone in gleichem Maasse. Die Nasenbeine, obwohl sehr schlank, mögen nach hinten etwas mehr an Breite zunehmen und die Oeffnung der Augenhöhlen ist etwas grösser. An Thränenbein, Wange und Schläfe wüsste ich keinen Unterschied als etwas geringere Höhe namhaft zu machen. Die Hinterhauptsfläche erscheint dagegen höher und schmaler, da an dem hornlosen Thier die Muskelkanten dieser Fläche viel schwächer ausgebildet sind. Sie verhält sich insofern ähnlich wie bei *Portax*.

Nach dem jetzt Mitgetheilten halte ich die Frage, ob es sich bei dem hornlosen Schädel um anderes Geschlecht, um andere Species, oder gar um anderes Genus als bei den behornnten der selben Physiognomie handeln möchte, einer besondern Besprechung kaum mehr werth. Viel grössern Anfechtungen schien ja die Vereinigung beider Formen in Eine Familie ausgesetzt zu sein. Von dem Moment an, wo aber der Besitz von Hörnern auch unter Rindern und selbst in deren erwachsenem Zustand nur als individuelle Zuthat erschien, musste die Entscheidung dem Vergleich des Schädelbaues ungeschmälert zufallen. Sie konnte nicht schwanken, wo der letztere von den ihn am meisten beherrschenden Momenten bis zur Modellirung von Muskelansätzen sich als so gleichförmig auswies.

Nur zwei Punkte können noch auf Berücksichtigung Anspruch machen. Erstlich die Frage, ob es sich in dem vorliegenden Fall um einen sexuellen Unterschied handeln möchte. Nach den reichlichen Erörterungen, die solchen Fragen im Verlaufe dieser Arbeit zugefallen sind, scheint mir die Antwort schon in der Schilderung des Schädels zu liegen. Die Leichtigkeit und Schlankheit seines Baues, ja schon die grössere Ausdehnung seiner Parietalzone werden nöthigen, ihn einem weiblichen Thiere zuzuschreiben. Nichtsdestoweniger müsste es sehr voreilig erscheinen, Hornlosigkeit überhaupt als Attribut weiblicher Thiere von *Leptobos* zu betrachten. Wie schon bemerkt worden, lässt die Vergleichung mit den Geschlechtsunterschieden an lebenden Rindern viel eher vermuthen, dass auch ein Theil und sogar die Mehrzahl der behornnten Schädel von weiblichen Thieren stammten. So gut wie bei Wiederkäuern aller Art, wird also auch hier das weibliche Geschlecht nur häufiger als das männliche der gemeinsamen unbewehrten Jugendform treu verblieben sein.

Die weitere Frage, welche Merkmale an dem in Rede stehenden Fossil von vornherein, auch abgesehen von Geschlecht, auf Rechnung von Hornlosigkeit fallen möchten,

wird ihre Antwort am besten in einer Prüfung des Einflusses finden, den Hornlosigkeit überhaupt auf die Gestaltung des Rinder-Schädels ausübt. Ich verspare diese Untersuchung, die ich an allen Formen heutiger Rinder vorgenommen habe, wo Hornlosigkeit gelegentlich auftritt, auf die Besprechung eines fernern fossilen Rindes ohne Hörner, wo die Vermuthung, dass dieses Merkmal nicht nur einzelne Individuen, sondern sogar die Species oder das Genus bezeichnen könnte, näher lag als hier. Nur vorläufig sei hier bemerkt, dass sich der hornlose *Leptobos* zu den behornten in allen wesentlichen Dingen ähnlich verhält, wie der Schädel des Galloway-Rindes zu demjenigen des behornten *Taurus*-Rindes.

## 2. *Leptobos* (*Bibos*?) *Frazeri* Rütim.

Taf. VII, Fig. 11. 12.

Ein einziges Stück der Sammlung des Britischen Museums (Nr. 39719) scheint anzudeuten, dass hornlose Rinder auch in der pleistocenen Epoche in Indien lebten. Er stammt aus dem Terrain von Nerbudda und ist dem Museum von Capitän Frazer übergeben worden. Leider ist er mir erst bei Abschluss meines Aufenthaltes im Museum in die Hände gefallen, so dass ich seiner Untersuchung nicht mehr die gewünschte Sorgfalt zuwenden konnte.

Der Schädel unterscheidet sich in vielen und nicht unwesentlichen Punkten von dem eben beschriebenen sivalischen. Er ist länger und schmaler und noch niedriger. Volle Länge vom Hinterhauptskamm bis Schnauzenspitze 470 Mm.; Breite aussen an den Augenhöhlen 182 Mm.; Länge vom Hinterhauptskamm bis Nasenbeine 212 Mm.; Länge der Nasenbeine 190 Mm.; Breite der Maxillarzone an den Tubera maxillaria 130 Mm. An vollkommener Hornlosigkeit des Schädels ist nicht zu zweifeln. Die gesammte Oberfläche ist, wohl nicht ohne äussern Druck, vollkommen platt, die Profilinie von der Nasenspitze bis zum Hinterhauptskamm durchaus gerade. Von den Facetten des sivalischen Fossils ist also nichts bemerkbar, und die Stirnfläche verläuft in ununterbrochener Flucht bis an den Hinterhauptskamm. Die Lage der Coronalnaht ist nicht mehr sichtbar. Obwohl mit aller Wahrscheinlichkeit ein guter und wohl sogar ein grösserer Theil der Oberfläche als bei *Leptobos Falconeri* auf die Parietalzone zu rechnen sein wird, ist diese also von der frontalen weniger abgetrennt als bei dem früher beschriebenen Schädel. Die Supraorbitalrinnen liegen hinter, nicht ein-

wärts der Augenhöhlen. Die Seitenränder der Stirnfläche treten nicht als Kanten vor, sondern biegen sich allmählig gegen die Schläfe abwärts. Die Stirnbeine werden also ausgedehntere Diploëräume enthalten haben. Der Schläfenrand der Stirn bildet sogar nach der Stelle hin, wo der Ursprung der Hörner zu erwarten wäre, eine schwache Vorrangung, hinter welcher er sich erst zu dem intertemporalen Isthmus zusammenneigt. Der Zwischenraum zwischen den hintern Enden der Schläfengruben ist erheblich breiter. Die Augenhöhlen sind höher hinaufgerückt, so dass ihr Dach in der Fläche der Stirn liegt, und sie ragen seitlich weniger vor.

Das Gesicht ist im Vergleich zu dem Gehirnschädel gestreckter als an dem sivalischen Fossil. Die Thränenbeine sind sehr lang gestreckt und auch die Stirnbeine senden einen langen Zipfel in den Zwischenraum zwischen Thränenbein und Nasenbein vor. Sehr verschieden sind die Nasenbeine. Sie sind breiter als bei dem hornlosen sivalischen Rind, vorn mit deutlichen Incisuren versehen, nach hinten erst stark erweitert und schliesslich lang zugespitzt. Die Maxillärzone, obwohl im Ganzen niedriger als bei dem sivalischen Schädel, wird doch nach vorn hin nicht so rasch niedriger wie bei diesem, sondern verliert an Höhe erst vor der Zahnreihe. Die Intermaxillärzone ist lang und niedrig, so dass der alveolare Rand der Wange vom vordern Ende der Zahnreihe stark zu dem Intermaxillärband aufsteigt. Die Zwischenkiefer reichen bis weit an die Nasenbeine hinauf. Das Gebiss ist leider grösstentheils zerstört.

Dass der Schädel von dem hornlosen sivalischen verschieden sei, kann also keinem Zweifel unterliegen. Dies besagt sowohl die Verschiedenheit der allgemeinen Form als diejenige der einzelnen Knochen. Viel Gewicht, so unbedeutend dies erscheinen mag, scheint mir in der Lage der Supraorbitalrinnen zu liegen. Sie sind durchaus postorbital und die Stirne verliert hinter den Augenhöhlen weniger rasch an Breite als bei dem sivalischen Schädel. Beides weist auf eine bedeutende Verlängerung der Stirnzone, wie sie — im Gegensatz zu den *Portacina* — die *Bibovina* charakterisirt und namentlich den weiblichen Banting bei aller Stärke seiner Hörner kennzeichnet. (S. Holzschnitt 10 in Natürl. Gesch. des Rindes Abth. II, Pag. 81 und die Skizze des jungen männlichen Gaur in unserer Tafel VII, Fig. 4.) In Folge hievon scheinen auch die Augenhöhlen an dem *Nerbuddaschädel* weiter nach vorn gerückt als an dem sivalischen. Auch die übrigen Merkmale desselben, die bedeutende Streckung des Gesichtsschädels, die Rolle, die daran den einzelnen Knochen zukömmt, ja sogar die besondere Form einiger meist sehr typischer Knochen, wie des Thränen- und Nasenbeins, sind dem weiblichen Banting überraschend ähnlich. Umgekehrt ist an jungen *Bibovina*, die ja hier einzig in Frage kommen können, die Parietalzone niemals so innig

mit der frontalen verwachsen und erreicht auch nicht eine solche Ausdehnung, wie ich sie an dem Nerbudda-Schädel vermuthe.

In letzter Beziehung würde sich also dieser Schädel demjenigen von *Leptobos* anschliessen, und es wird sich fragen, ob den Analogieen mit den *Bibovina* oder denjenigen mit *Portacina* grösseres Gewicht in der Beurtheilung desselben zuzumessen sei.

Eine Entscheidung darüber würde ich für voreilig halten, bevor der Antheil, den *Squama occipitis*, Scheitelbein und Stirnbein an der Bildung der Gehirncapsel nehmen, ausser Zweifel gestellt ist. Vor der Hand scheint mir die Aehnlichkeit mit *Bibovina* mehr nur eine physiognomische zu sein, während die tieferen Structurverhältnisse das Fossil des Nähern an die *Portacina* knüpfen. Auf diese Betrachtung ist auch meine vorläufige Bezeichnung des Schädels begründet, die nicht ausschliesst, dass endlich dieses hornlose Rind sich auch als Brücke zwischen *Portacina* und *Bibovina* einschalten könnte.

### 3. *Leptobos Strozzi* Rütim.

Taf. IV, Fig. 7. 8. Taf. VI, Fig. 10.

Keine passendere Einleitung konnte ich wünschen, um dem Leser eine dritte, mit Einschluss des sivalischen Büffels eine vierte Form von hornlosen fossilen Rindern vorzuführen, als die Besprechung der beiden letzten Arten. Sie ist mir aus zwei Schädeln bekannt, von welchen der besser erhaltene, der hier abgebildet ist, mir nur im Gypsabguss vorlag. Das Original befindet sich in der in Pontassieve aufgestellten Sammlung des Marchese Strozzi und stammt aus dem wohlbekannten Fundort von *Bos etruscus* in Val d'Arno. Der zweite Schädel, noch vollständiger als derjenige in Pontassieve, aber durch starke seitliche Zusammenquetschung sehr entstellt, ist im Besitz des Museums von Florenz. Trotz vielfacher Bemühungen ist mir das Original des erstern verschlossen geblieben. Um so erwünschter war es mir, den Gypsabguss schon in Florenz in Gegenwart der Originalien von *Bos etruscus* studiren zu können. Für diese oder jene besonderen Fragen, die noch nachher bei der spätern Prüfung desselben in Basel auftauchten, hatte Prof. Grattarola in Florenz die grosse Güte, nach Pontassieve zu reisen, um mir am Original die nöthige Auskunft zu verschaffen, wie auch Dr. Fors. Major mir in zuvorkommendster Weise Hülfe leistete. Ohne dieses freundliche Entgegenkommen und ohne die Bekanntschaft mit den fossilen Rindern

Indiens würde es mir kaum gelungen sein, den hornlosen Fossilien aus Val d'Arno ihre richtige Stellung anzuweisen. Noch bei meinem letzten Aufenthalt in Florenz war ich geneigt, darin nur eine hornlose Form von *Bos etruscus* zu erblicken.

Zur Orientirung verweise ich einmal auf die von mir schon früher mitgetheilten und theilweise hier reproducirten Abbildungen zweier Schädel von *Bos etruscus* aus Florenz und Turin. (Natürl. Gesch. des Rindes II. Fig. 3. 4. 5, Taf. I und Fig. 3, Taf. VII der jetzigen Abhandlung, sowie Holzschnitt Pag. 155.) Leider bin ich nicht im Fall, eine Abbildung eines mir seit langer Zeit bekannten Schädels von *Bos etruscus* des Museums von Florenz beizufügen, der sich von dem vorigen durch überaus geringe Hörner auszeichnet. Er stammt allerdings von einem jungen Thiere. Dennoch geht hieraus hervor, dass auch an *Bos etruscus* die Stärke der Bewaffnung sehr merklichen individuellen Schwankungen unterworfen war.

Des Fernern schalte ich hier das schon früher benützte Ergebniss der Vergleichung behornter und hornloser Schädel mehrerer Arten von lebenden Rindern ein. Als Object dienten mir Schädel der Basler Sammlung und zwar ein Kopf des männlichen Galloway-Rindes, das ich der Güte von Prof. Thomson in Glasgow verdanke, und den ich der Primigenius-Race von *Bos Taurus* zuzähle. Ferner ein hornloser und ein behornter Schädel des Yak, beide von weiblichen Thieren, drittens ein zwar nicht hornloser, aber doch nur mit Hornstummeln versehener erwachsener Schädel von Zebu aus Ceylon, der mir mit einer Anzahl behornter Schädel derselben Zebu-Race durch Herrn A. Spitteler aus Ceylon zugekommen ist. Im Vergleich mit der riesig behornten abessinischen Sanga- oder Galla-Race des Zebu's (vergl. für das ganze Thier das Titelbild in G. Vasey Delineations of the Ox Tribe, London 1851), wovon ich einen mir neulich zugekommenen Schädel am Schluss der Abhandlung beifügen werde, kann er allerdings füglich als hornlos gelten \*).

## Hornlose lebende Rinder.

Unter Benutzung der früher von mir mitgetheilten Messungen an Rind-Schädeln (Natürl. Gesch. des Rindes II. Pag. 171) stelle ich im Folgenden neben die Mittelmasse von Primigenius- und von Trochoceros-Form des europäischen Rindes die entsprechenden Maasse für den mir vorliegenden Galloway-Schädel. Leider stammt der letztere von einem, wenn auch verschnittenen,

---

\*) Unzugänglich blieb mir bisher die hornlose Form des indischen Büffels. Eine Abbildung davon s. in Cuvier, Ossem. foss. IV. Pl. X. Fig. 7. 8. 9. Hiemit sei auch das Versehen auf Pag. 134 beseitigt, das Hornlosigkeit an heutigen Büffeln in Zweifel stellt.




so doch ursprünglich männlichen Thier, so dass ich vermuthe, dass ein weiblicher Schädel die nahe Uebereinstimmung der hornlosen mit der Trochoceros-Form noch in helleres Licht gestellt haben würde. Lehrreich ist immerhin, dass schon diese etwas unpassende Zusammenstellung ergibt, dass die Trochoceros-Form bereits, wie zu erwarten war, einen Schritt von der am wenigsten veränderten Primigenius- zu der am meisten veränderten Aceros-Form darstellt.


Zwei fernere Columnen sind der Vergleichung eines hornlosen und eines behornen Schädels des Yak, beide weiblich, gewidmet. Mit den Zahlenreihen für Bos Taurus stehen sie natürlich in keinerlei Beziehung. Für das hornlose Zebu eine ähnliche Colonne zu liefern, unterliess ich mit Absicht, da mir für das behornete Zebu nicht so sorgfältig bestimmte Mittelwerthe zur Verfügung standen, wie für das europäische Rind. Die Positionen 4, 11 und 17 der erwähnten Tabellen mussten von selbst wegfallen.

	Europ. Rind			Yak	
	Primigenius- Race ♀	Frontosus- Race ♀	Galloway	Behorn ♀	Hornlos ♀
1. Schädellänge vom vordern Rand des For. magn. an . . .	100	100	100	100	100
2. " von Crista occipitalis an . . . . .	111.5	114.1	109.8	113.4	112.7
3. Stirnlänge von Crista occipitalis bis Nasenbein . . .	49.8	52.4	53.2	42.3	43.3
5. Länge der Nasenbeine . . . . .	42.0	39.3	38.6	47.1	45.9
6. Gaumenlänge . . . . .	62.4	61.8	60.8	67.6	65.8
7. Spitze der Intermaxilla bis Mitte hinter M. 3 . . .	60.3	62.1	62.0	65.8	64.3
8. " " " " " vor P. 3 . . . . .	31.6	31.8	31.2	34.2	33.4
9. Länge der Zahnreihe . . . . .	28.9	32.6	30.5	32.1	31.1
10. Länge der Intermaxilla . . . . .	33.4	35.0	29.3	31.8	34.4
12. Stirnbreite zwischen den Schläfen . . . . .	38.2	37.2	36.7	42.4	38.3
13. " " " Augenhöhlenrändern . . . . .	48.0	48.3	45.3	50.1	51.2
14. Gesichtsbreite an Tuber maxillare . . . . .	34.1	35.8	33.9	36.0	36.4
15. Occiput, Höhe über Unterrand von For. magn. . . .	34.7	36.8	31.0	33.7	33.9
16. " grösste Breite, Ohrhöcker . . . . .	48.-	46.9	47.2	43.4	42.6
18. " Breite zwischen den Schläfeneinschnitten . . .	30.6	31.2	26.7	20.3	19.6

A.




B.




A. B. Galloway-Rind.

Das Ergebniss für das Galloway-Rind ist insofern als unrein zu betrachten, weil der einzige gemessene Schädel nicht einem weiblichen Thiere angehört. Diesem Umstand ist vielleicht die Verkürzung des Gesichtsschädels im Vergleich zu den behornen Trochoceros-Formen von *Bos Taurus* zuzuschreiben. (Position 2. 5. 6. 7. 8. 9. 10.) Um so auffälliger und wohl bezeichnender wird die Verlängerung und Verschmälerung sowie die Abplattung des Gehirnschädels sein. (Position 3. 12. 13. 15. 18.)


E.




C.



F.



D.



C. D. Behornter, E. F. hornloser Yak.

Auf die Unterschiede in dem Schädelbau des Yak und des europäischen Rindes ist hier nicht mehr der Ort besonders einzugehen. Wie oben bemerkt, bestehen sie allerdings in einer sonderbaren Mittelstellung zwischen den Formen der Taurina und der Bisontina, die sich etwa in Folgendem präcisiren lassen: Abtrennung der Hinterhauptsfläche von dem Frontalschädel durch eine wenn auch sehr kurze, doch deutlich ausgesprochene Parietalzone. Geringe Ausdehnung der Occipitalfläche und namentlich sehr auffällige Kleinheit der Condyl und der paroccipitalen Theile. Bullae osseae relativ ansehnlich. Abplattung, Verkürzung und Breitenzunahme im Frontaltheil. Jochbogen kurz, schwach, mit sehr kleiner Gelenkfläche für den Unterkiefer. Gesichtsschädel lang, niedrig, nach hinten in Folge der breiten Stirngegend sich stark erweiternd; Nasenbeine nach hinten breit, vorn fast ohne Incisur. Thränbeine sehr lang und niedrig. Wange besonders nach vorn rasch an Höhe verlierend, Choanenwand daher niedrig und Berührung von Maxilla und Nasenbein sehr kurz. Nasenöffnung sehr gross, Nasenbeine weit darüber vorspringend, Massetercristae schwach. Gaumenfläche sehr breit und flach. Intermaxillarthteil flach, ausgedehnt. Unterkiefer schwach. Gebiss etwas schaffähnlich, Zähne im Allgemeinen compress, mit kaum vorragenden Mittelriefen der Zahnprismen, aber mit stark entwickelten Randfalten. Accessorische Säulchen schwach. Schneidezähne breit schaufelförmig.

Was den Unterschied zwischen behorntem und hornlosem Yak betrifft, so weist die obige Messungstabelle wiederum auf Verlängerung und Verschmälerung des Gehirnschädels bei der hornlosen Form (Pos. 3. 12. 16. 18) und im Allgemeinen auf Verkürzung des Gesichtes.

Wichtiger für unsern Zweck als die Aussage von Messungen an zwei hornlosen Schädeln sind andere Merkmale, die von den Messungen nicht zum Ausdruck gebracht werden. Um so deutlicher machen sie sich in den beigegebenen Zeichnungen geltend. Bei dem **Galloway-Rind** ist zunächst am erfolgreichsten die Unterdrückung der diploëtischen Sinus an der Stelle des Hornansatzes. Der Seitenrand des Stirnbeins und der Seitenrand des die Schläfe überdachenden Scheitelbeins legen sich hier wie zwei Blätter platt aneinander. Diploëtische Aufblasung der Stirn findet also nur noch Statt in der Mitte derselben. (S. den Schädeldurchschnitt in Fig. 10, Taf. VII.) Der Frontalwulst, anstatt wie bei behornten Primigenius-Rindern querüber von Horn zu Horn in gerader Linie zu ziehen, ist auf einen medianen Zipfel

eingeschränkt, von welchem nunmehr zwei deutlich vorspringende flache Kanten schief gegen den hintern Augenbogen ziehen. Dies wiederholt genau die Stirnbildung, wie sie sich normal bei der *Brachyceros*-Race findet. (S. die Holzschnitte 23. 24. 25 in „Natürl. Gesch. des Rindes“, oder Fig. 54 bis 57 von „Art und Race des zahmen europäischen Rindes“.) Die Stirn wird dadurch sehr uneben, da sie zwischen den Augenhöhlen in der Mitte wieder sehr vertieft ist. Die Supraorbitalrinnen sind dabei schwächer und verlaufen etwas weniger schief einwärts, fast der Mittellinie parallel. — Unterdrückung der Pneumaticität der Stirnzone in deren Seitentheil wird also als erstes, und Verlängerung, Verschmälerung und Abplattung der Stirnzone wohl als ferneres Ergebniss der Hornlosigkeit bei dem Galloway-Rind zu bezeichnen sein.

Genau dasselbe wiederholt sich bei dem **Yak**. Das hornlose Thier unterscheidet sich von dem behornten durch Unterdrückung der Seitentheile des Frontalwulstes und wohl ohne Zweifel in Folge hievon, durch freiere Entwicklung des ganzen postorbitalen Hirnschädels. Der Frontalwulst ist bei dem gerade vorliegenden Schädel in der Mitte sogar mehr aufgeblasen als bei dem behornten, aber seitwärts ganz unterdrückt. Die ganze postorbitale Stirn ist nebst Schläfe und Jochbogen in die Länge gezogen, erstere nach hinten verschmälert und in der Mitte aufgehoben. Es tritt sogar, wie wohl an jugendlichen Thieren, die Parietalzone freier und selbstständiger vor.

Für das hornlose **Zebu** könnte ich nicht das mindeste Neue beifügen. Die Stirn, in dem eben vorliegenden Fall noch mit kleinen Hornstummeln versehen, wiederholt, so weit dies für Zebu irgend möglich ist, die dem europäischen *Brachyceros*-Rind in dessen stärksten Graden eigenthümliche Gestalt.

Wenden wir uns von den hornlosen Rindern der Gegenwart wiederum denjenigen der Tertiärzeit zu, so ist von vorn herein ersichtlich, dass in allen bisher besprochenen Fällen von Hornlosigkeit Verhältnisse wie die an heutigen Thieren beobachteten nicht ohne Mitwirkung waren. Abplattung des Hirndaches durch Unterdrückung der frontalen und parietalen Lufträume war es, welche schon die sonderbare Gestaltung der Stirnfläche von *Bucapra Daviesii* zu Stande brachte. Genau derselbe Factor war wirksam bei der hornlosen Gestalt von *Probubalus sivalensis*, wie schon die Vergleichung der Seiten-Ansicht Fig. 2, Taf. II mit derjenigen behornter Formen, z. B. Fig. 5 derselben Tafel auf den ersten Anblick zeigt. Ueberaus charakteristisch verhält sich in dieser Beziehung *Leptobos* (*Bibos*?) *Frazeri*, Fig. 11. 12, Taf. VII. Da wir letzterer Species eine behornte Gestalt als Complement an die Seite zu stellen vor der Hand noch nicht mit Sicherheit vermögen, so bleibt es einstweilen fraglich, inwiefern die ungewöhnliche Länge und Schmalheit dieses Schädels, zumal von dessen Stirnzone, nur auf Rechnung der Hornlosigkeit fallen dürfte; allein die Gestaltung des fronto-parietalen Schläfendachs auf der unverletzten linken

Seite sagt mindestens mit Bestimmtheit, dass es an behornten Complementen zu diesem hornlosen Rinde von Nerbudda sicherlich nicht fehlte, und da an demselben Fundort eine freilich kurzköpfige Form der heutigen Bibovina bereits fossil auftritt, so lag die Vermuthung allerdings nicht fern, dass der hornlose Schädel der langköpfigen Gestalt des heutigen Bibos, oder dem Banting nahe stehen möchte.

Nicht mehr so vollkommen zutreffend ist die Parallele zwischen hornloser und behornter Gestalt an heutigen Rindern und an den entsprechenden Vertretern von *Leptobos Falconeri*. Mit vollem Rechte werden wir zwar die vollkommene Abplattung des Hirndaches, vielleicht sogar die gestreckte Gestalt des Schädels als Correlat von Hornlosigkeit betrachten dürfen. Immerhin liegt am Tage, dass behornte und hornlose Gestalt in dieser Species weiter auseinanderstehen, als etwa bei *Bos grunniens* oder *Taurus*, ja selbst weiter, als wir es für *Leptobos* (*Bibos*?) *Frazeri* vermuthen dürfen. Nicht so weit allerdings, dass es gerechtfertigt gewesen wäre, die hornlose Form von *Leptobos* als besondere Species dieses Genus zu bezeichnen. Dennoch ist nicht zu übersehen, dass sie den Stempel von Hornlosigkeit weit tiefer eingeprägt erhalten hat als die andern bis jetzt zur Sprache gebrachten hornlosen Rinder.

Dies ist wohl geeignet, die Frage anzuregen, ob nicht zwischen Hornlosigkeit als Stamplan und Hornlosigkeit als Rückfall zu unterscheiden sei. Die vorliegenden Fälle scheinen einer solchen Unterscheidung das Wort zu reden. So wenig als bei *Bucapra* an Hornlosigkeit durch Rückfall zu denken war, so offenbar handelt es sich bei dem Yak, bei dem Galloway-Rind, ja wohl auch bei dem hornlosen Rind von Nerbudda um Rückfall, da ja die Unterdrückung der Stirnsinus sich auf die Stelle des Hornansatzes beschränkt, und mindestens kleine Vorsprünge des Schläfendaches die Ansatzstelle für Hörner immer noch verrathen. Bei dem hornlosen *Leptobos* dagegen ist es im ganzen Umfang des Hirndaches noch gar nicht zur Ausbildung von äusserlich bemerkbaren Luftsinus gekommen. Die Vergleichung der Hinterhauptsfläche führt zu demselben Schluss; sie ist im Vergleich zu derjenigen der behornten Form erheblich schmaler, als bei hornlosen Rindern jüngerer geologischen Datums. In allen Theilen spricht sich bei *Leptobos* ein Progress von unbewehrten zu bewehrten Gestalten aus, da ja die distinctiven Züge der letztern als eine Folge der Bewehrung erscheinen und an der erstern noch Nichts die Lust zur Bildung von Hörnern ankündigt. Würde der hornlose *Leptobos* aus älterem Terrain stammen als der behornte, so würde man ihm wohl den Titel einer Species nicht versagen dürfen, und selbst bei Berücksichtigung des Zusammenlebens beider wird die Hornlosigkeit als individuelles Merkmal schwerer wiegen als etwa bei heutigen Rindern.

Dies Alles ist geeignet, dem hornlosen Rind des italienischen Pliocen, *Leptobos*

*Strozzii* seine Stellung zu den behornnten Formen desselben Fundortes, mit Sicherheit anzuweisen. So sehr sich jetzt die Wahrscheinlichkeit aufdrängt, dass auch *Bos etruscus*, — von einer einstigen Stammform desselben ohne Hörner nicht zu reden — gelegentlich hornlos blieb, so wird es sich nunmehr vor Allem fragen, ob die in Rede stehenden hornlosen Schädel aus Val d'Arno nur als individuelle Variation von *Bos etruscus* zu betrachten seien.

Nach dem Vorhergegangenen muss die Antwort verneinend ausfallen. Die Ueberschiebung der Frontalzone über die Parietalzone ist bei *Bos etruscus* bereits viel weiter gediehen als bei *Leptobos Strozzii*. Die Vergleichung unserer Figuren 3. 4, Taf. VII mit Fig. 7, Taf. IV, oder auch der Seitenansichten Fig. 5, Taf. VII und Fig. 4, Taf. I in Natürl. Gesch. des Rindes mit Fig. 8, Taf. IV stellt dies in helles Licht. Der Schädelbau von *Bos etruscus* folgt bereits dem Plan von *Bibovina*; derjenige von *Bos Strozzii* liegt noch innerhalb des Planes von *Leptobos*, wo Stirn- und Scheitelzone noch innig, in gleicher Flucht und Breite, und ohne Andeutung von Ueberschiebung mit einander verbunden sind. Man mag zugeben, dass der postorbitale Theil der Stirn an *Bos Strozzii* bereits ausgedehnter ausfiel als an dem indischen *Leptobos*. Dennoch liegen die Supraorbitalrinnen noch in der Zone der Augenhöhlen, während sie bei *Bos etruscus* bereits in der postorbitalen Zone liegen. Wie der jugendliche Schädel des Gaur zeigt, würde selbst Hornlosigkeit an *Bos etruscus* nicht zu der ausgedehnten Verbindung der Scheitelzone mit dem Stirntheil des Schädels führen, welche *Bos Strozzii* kennzeichnet.

Nicht minder charakteristisch, und im nämlichen Sinne, verhält sich die Occipitalfläche von *Bos Strozzii*, Fig. 10, Taf. VI. Sie entspricht noch in vollem Maasse derjenigen von *Leptobos*. (S. Fig. 4, Taf. IV), insofern als ihr noch der parietale Aufsatz aufgelagert ist, der den hintern Theil des Schläfendaches bildet. Bei *Bos etruscus* erlöschen die flügel förmigen Kanten, welche die Hörner an die Parietalzone heften, sehr rasch. Die Occipitalfläche entbehrt also jenes parietalen Aufsatzes und ist übrigens, wie bei horntragenden Thieren überhaupt, mit paroccipitalen Muskelansätzen ungleich stärker ausgerüstet als bei *Bos Strozzii*.

Mit der Gehirn caps el von *Leptobos* verbindet *Bos Strozzii* nichtsdestoweniger eine Anzahl von unverkennbaren Merkmalen von *Bos etruscus*. Der Schädel ist in seiner Gesammtheit um Merkliches weniger abgeplattet als bei *Leptobos*. Besonders auffällig ist dies im Gesichtstheil, dessen Wangenfläche um vieles höher ist als bei den hornlosen Schädeln Indiens. Die Nasenbeine sind breiter und namentlich an dem Schädel des Florentiner Museums, weniger an demjenigen der Strozzii'schen Sammlung, nach

beiden Enden, aber nach dem hintern Ende zu so stark erweitert wie bei dem Banting und dem hornlosen Rind von Nerbudda.

Allen diesen Verhältnissen glaube ich den passendsten Ausdruck zu verleihen, wenn ich das hornlose Rind Toscanas, so gut wie dasjenige Indiens mit dem Genus-Namen *Leptobos* bezeichne. Ich beabsichtige damit keineswegs, die beiden Formen, über deren Verschiedenheit als Species ein Zweifel nicht bestehen kann, als directe Nachkommen eines und desselben nächsten Stammes hinzustellen. Wohl aber möchte ich damit zum Ausdruck bringen, was mir das wichtigste Ergebniss der Vergleichung zu sein scheint, dass in Indien so gut wie in Europa der Structur, die ich dort wie hier *Bibos* nannte, ein Stadium, das ich mit dem Namen *Leptobos* zu bezeichnen suche, vorausging. Unter beiden Namen sind also, wie es sich an Fossilien geziemt, viel weniger Eigenthümlichkeiten äusserer Details, als Etappen in der geologischen Umbildung des Schädels verstanden. Ob die äussere Erscheinung berechtigen mochte, die Thiere Indiens und diejenigen Italiens mit gleichem Namen zu bezeichnen, wird sich nicht beweisen lassen. Wichtiger ist der an den Fossilien, wie mir scheint, geleistete Beweis, dass die Metamorphose von hornlosen zu behorneten Thieren sich an beiden Orten in dem nämlichen Geleise erging. So weit wir aus dem Bau des Schädels schliessen können, sollte man vermuthen, dass die besondern Formen im Pliocen von Süd-Europa und von Indien unter einander kaum mehr verschieden waren, als etwa diejenigen weit getrennter Provinzen des von der Familie heutzutage bewohnten Raumes.

---

## D. Taurina.

### *Bos namadicus* Falconer.

Falconer, Palaeontological Memoirs Vol. 1, Pl. XXII, Fig. 4—6. — Fauna antiqua sivalensis, Supplementtafel G Fig. 1. 2.

Obschon ich im Britischen Museum Gelegenheit hatte, drei Schädel dieses mächtigen Nerbuddarindes (Nr. 39758, 39760, 39595) zu untersuchen, so scheint es mir vollkommen überflüssig, auf deren Beschreibung des Nähern einzugehen. Der erste Blick auf diese Schädel lehrt, dass sie den Plan der Primigenius-Gruppe für den Pleistocen von Indien vertreten. Die Stirnfläche ist platt und im Allgemeinen vier-eckig und ragt sowohl seitlich über der Schläfe, als nach hinten über die Occipitalfläche weit vor; der Hornansatz erfolgt im hintern Seitenwinkel der Stirn. Die Hörner stehen mit nach vorn gerichteter concaver Curve fast transversal zur Längsaxe des Schädels; ihr Umriss ist cylindrisch bis mehr oder weniger abgeplattet. Verglichen mit der so überaus veränderlichen Primigeniusform des europäischen Pleistocen vertreten sie also im Allgemeinen deren Trochoceros-Form, womit auch die sehr starke Depression der gesamten Hirncapsel, die sich namentlich in der niedrigen und in die Quere gedehnten Gestalt der Hinterhauptsfläche verräth, vollkommen übereinstimmt.


Einzigster Gegenstand der Besprechung könnte daher hier sein, zu prüfen, ob und inwiefern es gerechtfertigt sein möchte, die indischen Vertreter dieses Typus durch einen besondern Namen von den europäischen zu unterscheiden. Nach den Principien, welche mich in früheren Schriften (Fauna der Pfahlbauten pag. 137 u. f., Archiv für Anthropologie 1866, pag. 228, Natürliche Geschichte des Rindes Cap. IV Taurina pag. 125 u. f., pag. 149 u. f.), veranlassten, die Trochoceros-Gestalt flachstirniger Rinder lediglich als eine individuelle oder Racenmodification des Primigenius-Typus, sei es in dessen wildem oder zahmem Zustand zu betrachten, kann ich nicht geneigt sein, den indischen säbelhörnigen Vertretern desselben grössern Werth als denjenigen einer localen Race beizumessen, gesetzt auch, dass sie, wie es den Anschein hat, im dortigen



Pleistöcen dominiren oder ausschliesslich vorherrschen sollte. Lediglich aus praktischen Gründen, welchen ich im Vorhergehenden schon so häufig Concessionen dieser Art gemacht habe, mag es sich daher empfehlen, der Form von Nerbudda einstweilen den von Falconer ihr gegebenen Namen nicht zu entziehen. Gelänge es, in einem einzigen Museum die Primigeniusschädel von Europa bis nach Indien zu vereinen, so könnten sich vielleicht, obschon ich selbst dies bezweifle, geographische Areale für die einzelnen Modificationen des gemeinsamen Planes herausstellen.

### Zuschrift.


G.



Viel wichtiger dürfte vielleicht sogar mit der Zeit die Frage werden, auf welchen physiologischen Motiven die Eigenthümlichkeiten des Schädelbaues, die den Primigenius-Typus zu Stande bringen, überhaupt beruhen möchten. Zu dieser Frage veranlasst mich die überraschende Gestaltung eines Schädels des schon von Vasey (*Delineations of the Ox Tribe*, London 1857, Titelbild pag. 120) erwähnten Galla- oder Sanga-Rindes aus Centralafrika, der mir im Momente der Abfassung dieser Zeilen zugekommen. Die beigegebenen Holzschnitte stellen ihn in  $\frac{1}{6}$  nat. Grösse dar. Nach Gestaltung der Stirnfläche müsste man ihn dem Primigeniustypus des Linné'schen Genus *Bos*, oder also den *Taurina* einverleiben. Nichtsdestoweniger lassen alle übrigen Details von Structur keinen Zweifel darüber aufkommen, dass

er dem Zebu-Rind, dem sogenannten *Bos indicus* Linné zugehöre. So wenig ich auch geneigt bin, über die Beziehung des Zebu zu wilden Rindern schon jetzt bestimmtere Ansichten als die in meinen früheren Schriften niedergelegten zu äussern, so nehme ich doch keinen Anstand zu gestehen, dass ich in den von Jahr zu Jahr sich mehrenden Materialien je länger je mehr Belege für meine ursprüngliche Vermuthung zu finden glaube, dass die anatomischen Merkmale des Zebu auf eine Descendenz von dem Genus *Bibos* und zwar zunächst vom Banting hindeuten. Zur Feststellung dieser Vermuthung würde es freilich bei der ungeheuren und allem Anschein nach sehr alten, wenn gleich vom Menschen besorgten Verbreitung des Buckelochsen über das gesammte Asien und Africa noch viel ausgedehnterer Hülfsmittel und namentlich einer viel weitern Kenntniss der individuellen Entwicklungsbahn des Zebu bedürfen, als mir dermalen zu Gebote steht. Immerhin ist es nicht wenig bedeutsam, dass das Galla-Rind in überraschender Weise uns in seiner Stirnzone eine Conformation des *Primigenius*-Schädels innerhalb des allgemeinen Planes von *Bibos* vor Augen führt — um so merkwürdiger, als dadurch nichtsdestoweniger, wie schon gesagt, die ganze Physiognomie von *Bibos*, oder wenigstens des Zebu nicht im Mindesten verwischt ist. Dass dadurch der *Primigenius*-Typus oder die *Taurus*-Gruppe der Rinder irgend etwas an morphologischer Selbstständigkeit verlieren könnte, wird Niemand denken können. Wohl aber eröffnet sich daraus die Perspectivel dass Abflachung und horizontale Expansion der Stirnzone nicht ein ausschliessliches Merkma, der Gruppe der *Taurina* bilden, wie denn dieses wesentlich von dem Verhalten der Lufthöhlen des Schädeldaches abhängige Merkmal ja auch bei *Bubalina* — und fast durchweg in Verbindung mit besonderer Stellung und Gestalt der Hörner — eine grosse Rolle spielt.

### H.



Den Modificationen des Schädelbaues innerhalb von *Bos indicus* eine besondere Untersuchung zu widmen, ähnlich wie ich es in einer frühern Schrift für das zahme europäische Rind versucht, mag vielleicht, sobald einmal zureichende Materialien gesammelt sein sollten, bei einem spätern Anlass versucht werden. Es würde sich dabei nur darum handeln können, in der so mannigfaltigen Gestaltung des alten Haus-Rindes von Asien und Africa natürliche Gruppen für die zahlreichen lokalen Racen und Schläge aufzusuchen, ähnlich

wie ich dies bereits (Archiv für Anthropologie 1866) für das zahme europäische Rind durchzuführen versucht habe.


Wollte man, wie dies Swinhoe (Proceed. Zool. Soc. London 1870. Pag. 648 *Bos chinensis*) begonnen hat, für solche Schläge Species-Namen einführen, so könnte man dem Galla-Rind sogar einen besondern Genus-Namen kaum versagen.

Auf das besonders Eigenthümliche an diesem central-africanischen Schlag des Zebu-Rindes einzugehen, ist nicht der Ort. Auf einen einzigen Punkt möchte ich aufmerksam machen. Man wird nicht übersehen können, dass gerade in einigen seiner bezeichnendsten Merkmale, in der ungewöhnlichen Mächtigkeit der Hornstiele, die ja einen guten Theil des Stirnbeins in Anspruch nehmen, in der Gestaltung der Hinterhauptsfläche und noch manchen

andern Dingen der Galla-Schädel keiner einzigen Form von wilden Rindern näher steht, als dem Banting. Vergleiche die hier mitgetheilten Holzschnitte mit den Abbildungen des männlichen Banting, Holzschnitt 11–13, Pag. 82–84 in meiner „Natürl. Geschichte des Rindes“ Abth. II.

Um so merkwürdiger ist es, mit solchen Merkmalen des am meisten typischen Vertreters der heutigen Bibovina andere combinirt zu sehen, welche man in so ausgesprochenem Maasse bei manchen nicht weniger typischen Gestalten der Taurina am treuesten wiederholt findet. An Plattstirnigkeit wetteifert das Galla-Rind mit den sivalischen Vertretern der Primigenius-Gruppe, die von Lydekker den Namen *Bos acutifrons* und *Bos planifrons* erhalten haben. (Vergl. unsern Holzschnitt *G* mit Fig. 2. 4, Pl. XVI in Lydekker's unten zu erwähnenden *Crania of Ruminants*. Calcutta 1878.)

I.



# Nachträge.

## 1. Fossile Antilopen.

Zu dem diesem Gegenstand bereits gewidmeten Capitel (Pag. 82 u. f.) sind nach P. Gervais, Paléontologie et Zoologie générales, welche mir damals durch Zufall nicht zur Hand waren, noch hinzuzufügen:

Aus **Frankreich**: 1. Pag. 60 *Antilope? Mialeti* Pl. XVII, Fig. 1—3 aus der Caverne de Mialet.

2. Pag. 148. *Antilope Cordieri* de Christ. Pl. XX. und XXI, Fig. 1—3 und *Antilope hastata* Gerv. Pl. XVII, Fig. 5 aus den Sables marins von Montpellier.

Aus **Algier**, Gebiet von Constantine, Pag. 92: *Antilope strepsiceros* Pl. XIX, Fig. 4 Bayle, Bullet. Soc. géol. de France. 2e Sér. XI. 1854. pag. 343.

Wohl mit vollem Recht vereinigt Gervais, wie schon Bayle, *Antilope strepsiceros* mit der heute in Africa lebenden Kudu-Antilope; *Antilope Cordieri* hält er dagegen der jetzigen *Antilope equina* verwandt. Nach der Beschaffenheit der Hörner und den mächtigen Bullae osseae scheint sie mir mit dem Genus *Tragelaphus* weit mehr übereinzustimmen und sich davon nur durch auffällige Kürze der Parietalzone zu unterscheiden. Sowohl die Formen aus Süd-Frankreich als diejenigen aus Algier würden somit nur die aus den früher mitgetheilten Thatsachen gezogenen Schlüsse bestätigen, d. h. dem Wohnbezirk der Gemen einerseits einstige grössere Ausdehnung zuweisen, andererseits den Bezirk der *Strepsiceros*-Gruppe für die Pliocenperiode bis nach Süd-Frankreich und für das Diluvium noch bis Nord-Africa ausdehnen. Sehr unsicher bleibt wohl die Beziehung von *Antilope hastata* zu heutigen Formen. Nach dem geringen davon erhaltenen Fragment, das mit *Oreotragus hastatus* Peters aus Abessinien viele Aehnlichkeit hat, scheint die Möglichkeit nicht ganz abseits zu liegen, dass es sich hier um die erste Andeutung eines fossilen Vertreters der *Oreotragus*-Gruppe handeln könnte.

Auch auf dem indischen Schauplatz scheinen Antilopen in tertiärer und post-tertiärer Zeit reichlicher vertreten zu sein, als oben angedeutet wurde. Schon Falconer erwähnt aus den sivalischen Hügeln neben der schon genannten Antilope *palaeindica* eine *Antilope gyricornis* und *A. picta*. Lydekker in den «Crania of Ruminants» (Memoirs of the Geological Survey of India. Calcutta 1878, pag. 67 u. f. Pl. XXV) fügt dazu, sämmtlich aus den sivalischen Hügeln, drei fernere Formen: *Antilope sivalensis*, *A. patulicornis* und *A. porrecticornis* Lydekker; allem Anschein nach Formen, die sich theilweise *A. palaeindica* und somit wohl der heutigen Damalis-Gruppe, theilweise den Gazellen (*A. cervicapra*) anschliessen.

## 2. Fossile Ziegen.

Auch für diese Gruppe macht Lydekker (a. a. O. pag. 82 u. f. Pl. XXVIII) auf einige Formen, die einen aus den sivalischen Hügeln, eine andere von Perim Island aufmerksam, die wenig Zweifel übrig zu lassen scheinen, dass gewisse Gestalten heutiger Ziegen schon in tertiäre Vergangenheit hinaufreichen. Allerdings scheint *Capra sivalensis* Lyd. den Iharal aus den Nilghérrys, eine unbenannte Art aus Perim dagegen, und wohl auch *Capra perimensis* Lyd. von demselben Fundort, den Markhoor aus dem Himalaya, von welchen beiden schon oben die Rede war, bereits in tertiären Terrains anzukündigen.

## 3. Fossile Rinder.

### **Crania of Ruminants from the Indian Tertiaries by R. Lydekker. B. A.**

Memoirs of the Geological Survey of India. Calcutta 1878.

Wie oben erwähnt worden, liegt die sivalische Ernte von Falconer und Cautley an drei Orten zerstreut: die grosse Mehrzahl im Britischen Museum, der Gegenstand obiger Abhandlung. Ein kleiner Theil, den ich leider zu untersuchen unterlassen musste, im East-India-House in London; ein nicht unansehnlicher Ueberrest, in neuerer Zeit, wie es scheint, durch Theobald u. A. nicht unbeträchtlich vermehrt, im Museum der asiatischen Gesellschaft von Bengalen in Calcutta. Die letztere Sammlung, soweit sie von Falconer und Cautley selbst herrührt, ist mir nur sehr unvollständig durch

deren Katalog \*), sowie durch mündliche und schriftliche Mittheilungen meines verstorbenen Freundes Falconer bekannt geworden. Um so erwünschter musste es mir sein, wenn auch spät, nach vollständigem Abschluss meiner Abhandlung über den in London aufbewahrten Theil, die einlässliche Arbeit kennen zu lernen, die R. Lydekker dieser Sammlung gewidmet hat. Dies musste auffordern, dieselbe mit der meinigen des Genauesten zu vergleichen. Könnte doch daraus eine höchst erwünschte und lehrreiche Controlle für den relativen Erfolg der beiden Arbeiten und für das daraus gewonnene Urtheil über deren Objecte sich ergeben. Nichtsdestoweniger machen äussere Verhältnisse es mir unmöglich, dieser Confrontirung ein besonderes Capitel zu widmen. Bei näherem Zusehen ist dies auch entbehrlich.

So sehr in einzelnen Punkten die beiden Arbeiten zu verschiedenen Ergebnissen zu kommen scheinen, so würde doch eine einlässliche Besprechung der Lydekker'schen Arbeit zu nichts Anderem als zu einer Wiederholung von schon Gesagtem führen. Der des Stoffes mächtige Leser wird sofort gewahr werden — und es gewährt mir keine geringe Befriedigung, diess auszusprechen — dass in Wahrheit die beiden Arbeiten in den meisten wesentlichen Dingen zu sehr übereinstimmenden Resultaten führten. Ich nehme keinen Anstand, zu gestehen, dass ich Angesichts der Materialien, die Lydekker vorlagen, die Grenzen für Genus und Species kaum wesentlich verschieden gezogen haben würde. Wenn Abweichungen in der Beurtheilung von offenbar identischen Formen der Sammlung von Calcutta und derjenigen von London sich herausstellten, so beruhen sie auf folgenden Verhältnissen, die sicherlich Niemand als Verkenennung der Verdienste Lydekker's wird deuten wollen.

So weit sich aus Lydekker's Abhandlung der Umfang der Sammlungen in Calcutta abschätzen lässt, so scheint derselbe immer noch, trotz der neueren Zuthaten seit Falconer, an Ausdehnung um das Drei- bis Vierfache hinter demjenigen des Britischen Museums zurückzustehen. Dies macht sich namentlich geltend für einige Arten, wie Hemibos und Amphibos Falconer, die sich in Obigem gerade als die formenreichsten und am meisten elastischen Gestalten der ganzen sivalischen Rinderheerde erwiesen haben. Es wird daher begreiflich erscheinen, wenn etwa 24 Schädel von Hemibos, die mir zur Verfügung standen, bezüglich der Beurtheilung dieses Genus zu etwas anderen Resultaten führten, als die wenigen, welche Lydekker vorlagen. Aehnlich verhält es sich mit Amphibos und mehreren Arten, die in Calcutta sogar gänzlich zu fehlen

---

\*) Descriptive Catalogue of the Fossil Remains of Vertebrata in the Museum of the Asiatic Society of Bengal. Calcutta 1859.

scheinen. Umgekehrt entbehrt offenbar das Britische Museum einiger wenigen Glieder der sivalischen Rinder-Fauna des Museums von Calcutta. Nur das Thal von Nerbudda oder die pleistocene indische Fauna scheint in Calcutta etwas reichlicher vertreten zu sein als im Britischen Museum.

Einen ähnlichen Vorsprung glaube ich mir Angesichts meiner bisherigen Arbeiten über Rinder in Bezug auf Ueberblick der Familie im ganzen Umfang des Wortes vindiciren zu dürfen. Muss ich doch aus der Lydekker'schen Arbeit schliessen, dass mir bezüglich lebender Rinder — von ausserasiatischen nicht zu reden, selbst für asiatische, ja sogar für specifisch indische Arten ausgedehntere Hilfsmittel vorlagen, als das Museum der asiatischen Gesellschaft von Bengalen und die von Lydekker benutzte Litteratur zu enthalten scheint. Ich hege die Zuversicht, dass selbst die an sich geringen Differenzen, die sich in Beurtheilung von Formgrenzen unter Rindern in den beidseitigen Bearbeitungen der indischen Fossilien herausstellten, verschwunden wären, wenn Lydekker die neuere europäische Litteratur über diesen Gegenstand, die hier namhaft zu machen nicht nöthig ist, zugänglich gewesen wäre. Selbst für Beurtheilung der Fauna von Nerbudda dürfte mir aus den vielleicht um das Zehnfache ausgedehnteren Hilfsmitteln, die mir an überaus analogem Stoff in den Museen Englands und Italiens zur Verfügung standen, einiger Ersatz für die Spärlichkeit der Vorräthe des Britischen Museums aus ersterer Quelle erwachsen sein.

Unerheblicher, wenn auch gerade mehr bestechend für den dem Stoffe fremden Leser, möchte die Verschiedenheit in der graphischen Ausstattung der beiden Abhandlungen sein. Es ist kein Zweifel, dass trotz des grossen Vortheils, den der grössere Maassstab der Lydekker's Arbeit beigegebenen Abbildungen bietet, manche scheinbare Dissonanzen für den Beschauer der beidseitigen Kupfertafeln verschwunden wären, wenn der Zeichner in Calcutta die unersetzbaren Vortheile benutzt hätte, welche die in Europa doch allmählig um sich greifende und in allen meinen Arbeiten über Rinder angewendete streng-zuverlässige Zeichnungs-Methode (Lucae'sche Tafel) auf solchem Gebiete leistet \*).

Ohne in Einzelheiten einzugehen, scheint es mir daher zum Zweck der Verständigung für den Fachmann und der wissenschaftlichen Confrontirung der beidseitigen Resultate vollkommen ausreichend, wenn ich kurz auf die Parallelen und Dissonanzen

---

\*) Die Nachtheile, die das blossе Zeichnen von Auge an solchen Objecten nach sich zieht, treten in mehreren der Lydekker'schen Tafeln, namentlich solchen, die unter sich sehr ähnlichen Formen gewidmet sind, wie etwa Pl. XXII—XXIV, für den Kenner der Objecte grell an den Tag, von weit mehr verunglückten Zeichnungen, wie etwa Pl. XXVI gar nicht zu reden.

in den Ergebnissen der Untersuchung der Sammlung in Calcutta und derjenigen in London aufmerksam mache \*).

Es ist am Platze vor auszuschicken, dass Lydekker der Reihenfolge der sivalischen Schichten einen ausgedehnteren geologischen Horizont zuweist, als ich anzunehmen wagte. Die ältere Ansicht, dass dieselben dem Miocen angehören möchten, scheint er gänzlich abzuweisen; dafür stellt er die ganze Reihenfolge vom untern Pliocen bis zum Pleistocen als Aequivalent dieser Schichten auf; soll doch sogar (Pag. 52) das Terrain von Nerbudda in den obersten Abtheilungen der sivalischen Schichten vertreten sein. Die oben pag. 124 geäußerten Anschauungen über die Frist, welche der sivalischen Fauna zur Entfaltung offen stand, erleiden dadurch eine nicht ganz unwesentliche Berichtigung.

Halten wir uns in der Aufzählung der in Calcutta vertretenen Formen an die von Lydekker eingehaltene Reihenfolge, so sehen wir die Primigenius-Gruppe nicht nur durch *Bos namadicus*, sondern überdies durch zwei fernere Formen:

1. *Bos planifrons* und *Bos acutifrons* Lyd. vertreten. Besonders wichtig ist hiebei, dass während *Bos namadicus* auch von Lydekker dem Pleistocen ausschliesslich zugewiesen ist, die beiden andern den tiefern, also zum Mindesten pliocenen Schichten der sivalischen Hügel zugeschrieben werden.

Zum ersten Mal treffen wir also unzweideutige Vertreter der Taurina in ächtem Pliocen. Was die Berechtigung anbetrifft, diesen Gestalten eine morphologische Selbstständigkeit gegenüber den übrigen fossilen Taurina zu vindiciren, so wird darüber

---

\*) Nicht etwa zur Wahrung von sogenannten eigenen Rechten, sondern lediglich zur Orientirung des wissenschaftlichen Publikums, das ja mehrfach in der Lage sein wird, zwischen Namen für denselben Gegenstand, die von zwei Autoren herrühren, die Wahl zu treffen, scheint es mir am Platz zu erinnern, dass mein Aufenthalt in den Basements des Britischen Museums in das Frühjahr 1877 fällt. Die Sichtung der Londoner Herde wird also chronologisch so ziemlich mit der Prüfung derjenigen in Calcutta durch Lydekker zusammen fallen. Bestimmt war meine Publication für den auf Ende 1877 erschienenen Band IV der „Abhandlungen der schweizerischen palaeontologischen Gesellschaft“, welchem denn auch die ersten drei Tafeln über sivalische Rinder, sowie die Einleitung in die gesammte Arbeit beigegeben sind. Die Nöthigung, den gesammten Umfang der Antilopen mit in die Betrachtung zu ziehen und der speciellen Besprechung der sivalischen Fossilien sogar vor auszuschicken, war es dann, welche die Darstellung der letzteren bis zur Erscheinung von Band V (Ende 1878) der genannten Abhandlungen verzögerte. Dem wissenschaftlichen Publikum wird es also überlassen bleiben, in den wenigen Fällen, wo derselben zoologischen Gestalt in Calcutta und in Basel das Angebinde eines andern Namens zufiel, dem einen oder dem andern je nach innerer Berechtigung desselben, oder wo solche den Ausschlag nicht geben sollte, je nach Geschmack des Lesers eine Stätte in der Litteratur der Zukunft anzuweisen. Für die Wissenschaft selbst werden die gelegentlichen Doppelnamen um so weniger Schaden stiften, als, wie schon erwähnt, die Verschiedenheit in der Taxirung der Objecte sich in der Mehrzahl der Fälle auf den blossen Wortlaut einschränkt.



das Urtheil wohl nicht schwanken dürfen. Meinstheils scheint mir aus dem Ueberblick über die grosse Mannigfaltigkeit der Erscheinung, mit welcher im europäischen Pliocen *Bos primigenius* auftritt, mit ziemlicher Sicherheit hervorzugehen, dass sowohl *Bos planifrons* als *acutifrons* nur als *Trochoceros*-Gestalten von *Bos primigenius* betrachtet werden dürfen. Es würde mir leicht sein, auf einzelne Schädel in den Museen von Bologna, von Arezzo und hauptsächlich von Rom hinzuweisen, welche treue Parallelen zu den genannten sivalischen Formen bilden. Immerhin ist nicht unerheblich, dass sowohl *Bos acutifrons* als *planifrons* die allgemeine Abplattung des *Primigenius*-Schädels zu viel weiteren Graden führen, dass mit andern Worten die Luftsinus der Frontalzone an ihnen auf weit geringerer Entfaltung zurückbleiben als bei *Bos namadicus*. Lydekker's Tafel XVI gibt davon ein treffliches Bild, indem sie zeigt, dass der supra-occipitale Frontalwulst an den pliocenen Schädeln fast auf Null reducirt ist, was freilich gelegentlich an *Bos primigenius* ebenfalls auftritt.

Am wenigsten scheint mir *Bos acutifrons* (Pl. XII, Fig. 1; Pl. XIII; Pl. XVI, Fig. 4) eine besondere Durchführung des *Primigenius*-planes anzudeuten. Das scharfe Vortreten einer Sagittalnaht und die daherige dachförmige Gestalt der Stirnfläche dürften doch wohl kaum mehr als individuelle Abweichungen sein, welche auch am *Primigenius*-Schädel hier und da auftreten. Immerhin bleibt es vollkommen gerechtfertigt, den pliocenen Vertretern der *Primigenius*-gestalt einen gemeinsamen Speciesnamen zuzuweisen, für den sich der von Lydekker trefflich gewählte, *Bos planifrons*, am besten empfehlen dürfte.

2. *Bison sivalensis* Falconer. Lydekker Pl. XV, Pl. XVII, Fig. 1. Der Nachweis der Vertretung des Genus *Bison* in dem sivalischen Pliocen scheint einstweilen auf einem einzigen, dem Museum von Calcutta zugehörigen Schädel zu beruhen. Das Britische Museum enthält an indischen Fossilien nichts, was diesem Genus zugeschrieben werden könnte; immerhin ist der genannte Schädel vollkommen ausreichend, um die Anwesenheit des *Bison* im Pliocen von Indien ausser allen Zweifel zu stellen, wie denn derselbe auch schon von Falconer erwähnt ist. Der Gruppe der Bisonten erwächst in chronologischer Beziehung aus dieser Thatsache eine neue Stammform, von welcher sich nunmehr fragen wird, wie sie sich zu den bisher bekannten Vertretern derselben verhalten wird. Dies näher zu beurtheilen steht mir nach der davon gegebenen Abbildung nicht zu. Immerhin scheint dieselbe zu besagen, dass die indisch-pliocene Form dem im Diluvium von Europa und Asien verbreiteten *Bison priscus*, sowie dem demselben Gebiete angehörigen noch lebenden *Bison europaeus* überaus viel näher stehe, als etwa der sei es pleistocenen, sei es lebenden Form

amerikanischer Bisonten. So wenig Neues mithin nach Gestalt das sivalische Fossil für den Formeninhalt von *Bison* bietet, so lehrreich ist die Hinaufführung dieser in Asien immer noch nicht ausgestorbenen Gestalt bis in den Horizont von *Bos planifrons* und *Bubalus sivalensis*.

3. *Bos platyrhinus* Lyd. Pl. XIV. Das bloße Fragment, welchem dieser Name gewidmet ist, scheint bei Vergleichung mit den vollständiger erhaltenen Fossilien aus demselben Fundort keinen bestimmten Schluss über seine Beziehungen zu denselben zuzulassen. Nach seinen bedeutenden Dimensionen müsste man am ehesten geneigt sein, es irgend einem der sivalischen Vertreter der *Primigenius*-Gruppe zuzuweisen.

4. *Bubalus palaeindicus* Falc. Lyd. Pl. XVII, Fig. 2<sup>a</sup>, Pl. XIX. Ueber die Identität der von Lydekker unter diesem Namen beschriebenen Fossilien mit der schon von Falconer beschriebenen Form von Büffeln kann kein Zweifel obwalten.

5. *Bubalus platyceros* Lyd. Pl. XVIII. Wie die Vergleichung der Lydekker'schen Abbildung mit der von mir in Tafel II, Fig. 4. 5, gegebenen zeigt, entspricht *Bubalus platyceros* bis in alle Details dem Fossil des Britischen Museums, das ich im Obigen unter dem Titel *Bubalus sivalensis* beschrieben habe. Ein Zweifel darüber ist um so weniger möglich, als der von Lydekker unter demselben Titel angeführte Gypsabguss des Museums von Calcutta dem von mir beschriebenen Original des Britischen Museums entnommen ist.

6. *Peribos occipitalis* Falc. Lyd. Pl. XX und XXI, Fig. 2. Ein Zufall hat von den Vertretern dieser Form die grosse Mehrzahl in das Britische Museum gebracht und, wie es scheint, einen einzigen Schädel in Calcutta zurückgelassen. Dieser Umstand konnte Grund genug sein, dass Lydekker in dem letztern eine selbstständige Gestalt sivalischer Rinder erkennt, als deren Hauptmerkmal vollkommen richtig die, wenn auch sehr kurze, doch durchaus horizontale, und von der Hinterhauptsfläche gänzlich ausgeschlossene Scheitelzone bezeichnet wird. Es ist kaum zu zweifeln, dass Lydekker selbst, wenn ihm nur ein zweiter Schädel mit etwas ausgedehnterer Parietalzone vorgelegen wäre, mit Leichtigkeit erkannt hätte, dass es sich hier weder um einen Vertreter der Rinder im engeren Sinn, noch der Bisonten, sondern lediglich der Büffel handeln konnte. Es wird jetzt wohl ein kurzer Hinweis auf unsere Darstellung des Genus *Probubalus* (*Hemibos* Falc.) genügen, um in volles Licht zu stellen, dass *Peribos* bis in alle Einzelheiten den kurzschreitigen Formen von *Probubalus* und im Besondern von deren *Trochoceros*-gestalt entspricht, von welchen oben die Rede war pag. 128 und Holzschnitt D. pag. 135.

Was mir in London lange Zeit die Vereinigung solcher säbelhörniger und kurz-scheitliger Büffel mit *Probubalus* erschwerte, das Fehlen des Gesichtsschädels, leistet jetzt das von Lydekker beschriebene Fossil aus Calcutta in erwünschtester Weise. Es genügt ein Blick auf die Abbildung von *Peribos*, um zu zeigen, dass sein Gesichtsschädel bis in alle Details die Merkmale von *Probubalus* wiederholt. So sehr, dass es jetzt leicht ist, die Fossilien des Britischen Museums zu bezeichnen, welche in Lydekker's Sinn mit *Peribos occipitalis* zu identificiren wären. Es sind dies nicht nur etwa die von mir in Tafel I, Figur 3. 4 dargestellte Nr. 36665, sondern noch vielmehr Nr. 48029, 48030 und so fort, bei welchen allen die ungewöhnliche Verkürzung der Parietalzone mit derjenigen des Schädels in Calcutta auf vollkommen gleichem Fusse steht.

7. *Hemibos triquetriceros* Falc. Lyd. Pl. XXII und XXIII. *Amphibos acuticornis* Falc. Lyd. Pl. XXI, Fig. 1. Pl. XXIV. Die Einwendungen, welche ich mir gegen die von Lydekker gemachte Sichtung der diesen beiden Species zugewiesenen Schädel der Sammlung in Calcutta erlaube, beruhen auf demselben Vorrecht, das ich bezüglich der Deutung seines Genus *Peribos* in Anspruch nehme. Gelang es mir doch selbst, wie früher geschildert worden, nur nach und nach, die einzelnen unter den nahezu 40 Schädeln des Britischen Museums, welche ich meinerseits als Vertreter der Falconer'schen Genera *Hemibos* und *Amphibos* anerkannte, mit voller Sicherheit der einen und der andern Form zu unterstellen. Erst allmählig, nachdem die zahlreichen Modificationen dieser beiden Typen, wie sie nach Geschlecht und Alter, nach Stärke der Bewaffnung und nach Race auseinandertreten, gesichtet waren, konnte der Ueberblick über die ganze Mannigfaltigkeit der Erscheinung in Stand setzen, jedem einzelnen Fossil seine Stellung unter diesem oder jenem Genus zuzuweisen.

So gewagt es auch erscheinen mag, an der Hand von blossen Abbildungen, die gerade auf diesem Gebiet zum Theil recht viel zu wünschen übrig lassen, dieselbe Sichtung an den von Lydekker dargestellten Fossilien von Calcutta vorzunehmen, so darf ich doch gestehen, dass mir dieselben sämmtlich als gute Bekannte entgegentraten. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich jetzt feststelle, dass *Amphibos acuticornis* in den Lydekker'schen Abbildungen nicht nur durch Fig. 1, Pl. XXI, sondern auch durch Pl. XXII und XXIII (die beiden letztern von Lydekker als *Hemibos* bezeichnet), vertreten ist, während nur Pl. XXIV (nach Lyd. *Amphibos*) — nebst dem schon erwähnten *Peribos* — dem Falconer'schen Genus *Hemibos* zugehören.

Dies des Weitern zu erörtern, würde zu Wiederholungen führen, die ich im Hinblick auf die obige Beschreibung der beiden Species, sowie auf die trefflichen Zeich-

nungen von Dinkel in den Supplement-Tafeln *C* und *H* zu Fauna ant. sival. wohl bei Seite lassen darf. Nur in Kurzem möge aufmerksam gemacht werden, dass auch aus den Lydekker'schen Abbildungen etwa folgende typische Merkmale für den daselbst reichlicher vertretenen *Amphibos* hervorgehen.

Pl. XXI, Fig. 1 wird dabei mit aller Wahrscheinlichkeit einem jungen und vermuthlich weiblichen, Pl. XXII und XXIII dagegen erwachsenen und alten Thieren, nahezu entsprechend unserer Fig. 7, Taf. III zuzuschreiben sein. An allen ist als Merkmal von *Amphibos* im Gegensatz zu *Hemibos* bezeichnend die Richtung und die Form der Hörner, die sich, in schwachem Winkel divergirend, ansehnlich über das Profil der Stirn erheben, und an alten Thieren ihre First in Form von kantigen Schultern bis tief in das Gesicht fortsetzen. Die Stirnfläche wird dadurch in eine concave Mulde umgewandelt, in welcher die Supraorbital-Rinnen spaltförmig einwärts der Hornschultern liegen. Die Parietalzone und die Schläfengruben sind langgestreckt, der Jochbogen schwach. Die Augenhöhlen, dünnrandig und mit kleinen Oeffnungen, ragen nur wenig aus dem Profil des Gesichtsschädels vor. Letzterer ist gestreckt und schlank, mit schwachen Muskel-Cristae, die Wange niedrig.

Umgekehrt ist *Hemibos*, Pl. XXIV bezeichnet durch weitgetrennte Einsetzung der Hörner, die in stark geöffnetem Winkel mehr oder weniger nach hinten abfallen. Die Stirnfläche gewinnt dadurch eine ansehnliche Breite und bildet zwischen den weit nach aussen verlegten Supraorbital-Rinnen eine rauhe Platte. Die Augenhöhlen mit wulstig verdickten Rändern stehen röhrenförmig vor, der Gesichtsschädel ist hoch und breit, mit mächtigen Muskelhöckern versehen und die Nasenbeine entsprechen nach Umriss und Ausdehnung denjenigen von Büffeln. Parietalzone und Schläfengrube sind relativ kurz, der Jochbogen ungewöhnlich kräftig.

---

# Schlusswort.

## 1. Uebersicht der fossilen und lebenden Rinder.

		Miocen ? und Pliocen	Pleistocen	Lebend
<b>Bubalina</b>	<b>Bubalus</b>		B. antiquus	B. caffer B. brachyceros
	<b>Buffelus</b>	B. sivalensis	B. palaeindicus B. Pallasii	B. indicus B. sondaicus
	<b>Probubalus</b>	Pr. triquetricornis Pr. antelopinus		Pr. (Anoa) celebensis
	<b>Amphibos</b>	A. acuticornis		
<b>Portacina</b>	<b>Leptobos</b>	L. Falconeri L. Strozii	L. Frazeri	
<b>Bibovina</b>	<b>Bibos</b>	B. etruscus	B. Palaeo-Gaurus	B. Gaurus ? B. Gavaeus B. sondaicus B. indicus ? B. brachyceros
				B. grunniens
<b>Bisontina</b>	<b>Bison</b>	B. sivalensis	B. priscus B. latifrons	B. europaeus B. americanus
<b>Taurina</b>	<b>Bos</b>	B. planifrons	B. namadicus B. primigenius	B. Taurus <i>F. primigenius</i> <i>F. trochoceros</i>

In einem Schlusswort die Ergebnisse, sei es auch nur die prägnantesten, der vorhergehenden Abhandlung kurz zusammenzufassen, wäre schwierig. Noch mehr, wenn man gar auch die Erwartungen derselben, die ja unwillkürlich gelegentlich zu Tage treten, mit wollte einfließen lassen. Eine Art von Abschluss für die Rinder im Besondern sucht das obige Tableau zu bilden. Immerhin genug kümmerlicher Art, auf den ersten Anblick kaum mehr als ein blosses und für manchen Leser höchst unsicheres Verzeichniss, da er ja in der Aufzählung und Abwerthung von Genus und Species je nach seinem persönlichen Urtheil über solche Dinge bald da bald dort sei es zu Wenig, sei es zu Viel gewahren wird.

Dennoch ist dasselbe nicht ohne Vorbedacht und wie ich glauben sollte, nicht ohne Uebersicht entworfen. Im Allgemeinen folgt es dem Plan ähnlicher Tableaux in meinen früheren Schriften. Nur verzichtete ich diesmal, dasselbe in eine chronologische und in eine morphologische Reihe abzutrennen. Grund dazu war der Umstand, dass über die chronologischen Horizonte der indischen Terrains und über deren Parallelen zu europäischen oder anderweitigen Fundorten doch immer noch viel zu wenig Anhaltspunkte vorlagen. Beide Gesichtspunkte sind daher in dem obigen Tableau, soweit es thunlich war, gleichzeitig berücksichtigt. Man wird bemerken, dass die horizontalen Reihen chronologischen — die verticalen morphologischen Inhaltes sind. Letzteres immerhin, was für eine Darstellung auf so beschränktem Raume unvermeidlich war, mit allerlei Vorbehalten. Namentlich fand sich kein passender Raum für *Portacina* und *Bisontina*, für welche besser eine Reihenfolge etwa folgender Art gepasst hätte:

*Portacina*, *Bibovioa* { *Bisontina*  
                                  *Taurina*

Gleichzeitig sind absichtlich die Büffel von den primitiveren zu den culminativen Formen in vertical aufsteigender — die übrigen Rinder in vertical absteigender Reihenfolge geordnet. Die gänzlich domesticirten Formen sind mit Cursivschrift eingetragen.

Um meiner Absicht zu genügen, in graphischer Form einen Ueberblick über das Gewonnene zu geben, würde überhaupt eine einzige Methode dienlich gewesen sein, wie ich sie in weit allgemeinerem Rahmen schon anderwärts anzuwenden versucht habe \*). Nach diesem Vorbild würde ich am liebsten auf geographischer Unterlage, d. h. auf einer Karte des in Betracht fallenden Erdenraumes, dessen Bevölkerung an

Wiederkäuern, fossil und lebend, mit Punkten verschiedener Farbe für jedes Genus und überdies für fossile und lebende Arten mit verschiedenen Farben Abstufungen der jeweiligen Genus-Farbe, je nach deren geologischem Alter, und nach deren morphologisch altem und jungem Gepräge eingetragen haben.

Allerlei lehrreiche Ergebnisse würden sich an einem solchen Bilde herausgestellt haben. An dem einen Ort würde man höchst altväterische, mit weniger veralteten bis zu neumodischen und allerneuesten Formen aller Art, in bunter Mischung auf einem und demselben Terrain angetroffen haben. Anderwärts, wie z. B. in Europa, wäre das Bild der Bethierung einförmig, einmodisch und ärmlich ausgefallen. Unter ausschliesslich vom Menschen abhängenden, ja sogar von ihm hiehergebrachten Thieren lebt ja hier «Wild» überhaupt nur noch hier und da in Schlupfwinkeln verborgen, und selbst im Hintergrund dieser Scene, wenn man sich ältere Bevölkerung durch die gegenwärtige durchschimmernd denkt, würde das Bild kaum buntmodischer sich gestaltet haben, als dasjenige des heutigen Tages für Indien oder Africa. Scenen paradiesischer Art, wie sie uns Livingstone und neuerdings Stanley schildern, wo ganze Faunen uralten Gepräges noch nicht als «Wild», sondern noch als Herrscher den Wohn- und Weideplatz mit dem Menschen und dessen unmittelbarer thierischen Begleitung, aber noch durchaus nicht immer als mit einem Feind, sondern oft eher als wie mit einem Gaste oder selbst Freunde theilen, versinnlichen etwa den Vorgang, wie über ältere Blätter von Thierwelt successive neuere sich wegschieben — langsam und unmerklich, wo es sich nur um beidseitige persönliche Wehr, um redlichen Zweikampf — rasch und plötzlich, wo es sich um sogenannten Sport mit Riffelbüchse und ähnlichen modernen Hilfsmitteln handelt.

Für unser Schlusswort wird es indessen passend sein, uns auf die nächsten Ergebnisse zu beschränken, welche innerhalb des hier zu Grunde liegenden Gesichtskreises aus einer solchen Darstellung etwa hervorgehen würden.

## 2. Geographische Vertheilung.

1) Was zunächst den Schauplatz betrifft, dem die Mehrzahl der hier besprochenen Thiere angehört, **Indien**, so ist derselbe mehr als irgend ein anderer ausgezeichnet durch Vereinigung von alten und neuen Formen aller Art. Vollkommen ausgestorben sind jene phantastischen Geschöpfe, wie *Sivatherium*, *Brahmatherium*, *Wishnutherium*, *Hydaspitherium*, von welchen, wie es den Anschein hat, nur noch in Afrika ein

schwacher und doch für den ersten Anblick immer noch genug überraschender Nachklang in der Giraffe erhalten ist. Vielleicht eine Episode in der Entwicklung des Hirsch-Geschlechtes, welche sich dereinst als eine Art von Parallele auf paridigitater und selenodonter Bahn zu den nicht minder bizarren Formen wie *Dinoceras*, *Brontotherium* u. s. w. herausstellen dürfte, welche in dem Bereich der Nasenhörner in neuester Zeit von J. F. Brandt nicht unpassend mit dem gemeinsamen Namen Falschhörner, *Sphaleroцерatinae*, bezeichnet worden ist \*).

Viel weniger phantastisch, allein in anderem Sinne nicht weniger altmodisch, ist die Gestalt der kleinen Hirsche ohne Geweih — gewissermaassen noch nicht Hirsche — wie *Moschus*, *Hydropotes*, *Lophotragus* u. s. w., welche die fortschreitende Durchforschung China's uns in immer grösserer Anzahl kennen lehrt, immerhin offenbare Sprossen an der Leiter, welche durch Muntjack's und dergleichen zu den stolzen cladoceren Gestalten der eigentlichen Hirsche führt, wie *Rusa*, *Panolia*, *Elaphus* u. s. w. Dazu auf demselben Boden zwei fernere Erscheinungen hornloser Wiederkäufer, die eine von Riesengrösse, altväterischer und fremdartiger als alles bisher Genannte, das *Kamel*, in dem kaum gespaltenen Pantoffel wie in viel ernsthafteren Dingen eine nur noch morsche Brücke zu Unpaarhufern schlagend, die andere, die *Tragulina*, nur Zwerggestalten, welche mindestens im Bau des Schädels an noch viel primitivere, man möchte sagen an lissencephale Formen von Säugethieren zu streifen scheinen. — Beide dürfen wohl im Vergleich zu der elastischen Gestalt der Hirsche als das Sprödeste bezeichnet werden, was unter Wiederkäuern noch bis auf den heutigen Tag Fleisch und Blut behalten hat.

Endlich, eingestreut in diesen an sich schon bunten Teppich, die ganze Wucht der Gipfformen unter Klauenträgern, fast die Gesamtheit der Rinder, zum Mindesten zwei Drittheile der vollen Zahl der Species, und was weit mehr ist, vertreten durch alle Typen, deren sich die Familie überhaupt bis jetzt als fähig erwiesen hat: *Bubalina*, *Portacina*, *Bibovina*, *Bisontina*, *Taurina* — es fehlt keine einzige Gruppe. Von jeglicher derselben enthält sogar jede geologische Periode Indiens, deren Einsicht uns eröffnet ist, gleichzeitig Gestalten primitivster so gut wie culminativer Art. Noch heut zu Tage leben nahezu auf demselben Boden der Zwergbüffel von *Celebes* in tertiärem Gewand, und der Gaur, wie man glauben sollte das Aeusserste und Letzte, was im Hinblick auf seine einstige Grundgestalt das Rind an Umbau des Schädels erreicht. Umgekehrt bergen, wie sich ergab, schon die untersten sivalischen Schichten neben

\*) J. F. Brandt, Tentamen Synopseos Rhinocerotidum viventium et fossilium, Mém. Acad. St. Pétersbourg 1878. Pag. 19.



*Leptobos* und *Hemibos*, dem Rind und Büffel in Kinderschuh, gleichzeitig und von ihren überlebenden Nachkömmlingen kaum verschieden, den *Arni* (*Bub. sivalensis*) und den *Ur* (*B. planifrons*), Schlussgestalten ihrer Reihe, worin wir bisher nur Gebilde der Gegenwart zu erblicken glaubten.

Unter Rindern allein stossen wir also hier neben trägen oder perennirenden Gestalten wie die Mehrzahl der Büffel, gleichzeitig auf so junge und elastische Gebilde wie *Portacina* und *Bibovina*, und auf so ausgenutzte oder terminale wie *Ur* und *Wisent*. Dass dies vollauf berechtigt, Indien nicht nur einen Sammelpunkt von Rindern aller Art und zu allen Zeiten zu nennen, sondern dieses Gebiet direct als nächsten Ausgangspunkt und Heimat des gesammten Stammes zu bezeichnen, kann wohl keinem Zweifel unterliegen. Erscheint doch Alles, was ultramontanes Asien mit Einschluss von Nordamerika, ja selbst Alles, was Europa und Africa an Rindern bergen, in diesem Licht nur wie Auswanderung und gelegentliche Umgestaltung von Bewohnern der einstigen Weideplätze am Südabhang des Himalaja.

Angesichts solcher Selbstständigkeit und Fülle Indiens an Rindern muss es sicherlich doppelt bedeutsam erscheinen, auf demselben Boden, fossil und lebend, gleichzeitig das Einzige anzutreffen, was sich bisher als etwaiger Keim und Wurzel für die Erscheinung des Rindes darbot. Dies ist das *Nylghau*, für unser Auge und unsere Sprache allerdings noch Antilope, für palaeontologische Sprache aber viel mehr als Antilope. Nach einer Seite reicht es ja dem *Leptobos*, nach einer andern dem zierlichen, halb hornlosen (im weiblichen Geschlecht), halb vierhörnigen *Tetraceros*, ja durch diesen sogar den zwergigsten unter allen Hohlhörnern, den Buschböcken *Africas* die Hand.

Und immer noch der Wiederkäuer Indiens kein Ende. *Gazellen*, freilich hüben nur spärlich im Vergleich zu drüben in den Steppen und Wüsten der centralen Platte des Continents. An dem Kamme endlich und dessen Verzweigung bis hinaus nach Sumatra und Japan folgend, Gemsen jugendlicher Art (*Nemorhedus*, *Capricornis*), und endlich, noch mehr an die Hochregion gebunden, fast die Gesammtheit alles Dessen, was unter Wiederkäuern die Wehr durch Hörner noch zu weiteren Gipfelpunkten bringt als selbst die Rinder. Vom *Iharal* zum *Markhoor*, von *Budorcas* zu den *Argalis* finden wir ja schliesslich noch die letzte Zunft von Wiederkäuern, die Schafe und Ziegen in einer Fülle, zu welcher sich wiederum fast Alles, was alte und neue Welt aufzubieten vermag, wie blosse Aussaat ältern oder neuern Datums verhält.

**Africa**, der zweite grosse Sammelpunkt von Wiederkäuern, ist in Bezug auf Anzahl der Species derselben Indien nicht nur ebenbürtig, sondern überlegen. In Rücksicht auf Vertretung grösserer Categorien als Species dagegen überaus verschieden. Von

vornherein bringen wir selbstverständlich davon das mediterrane Gebiet in Abzug, wenn es auch in Abessynien wahrscheinlich ohne alle scharfe Grenze mit Africa im engern Sinne, d. h. mit dessen transsaharischem Theil verschmilzt. Hier aber, welche Einförmigkeit im Vergleich zu Indien! Von einheimischen Kameelen, von Schafen und Ziegen, von Hirschen im engern Sinne keine Spur. Von Rindern ein einziges, allerdings endemisches Genus, aber trotz aller Schattirung in einer Anzahl localer Racen dennoch von überaus einförmigem Gepräge, kaum mehr als zwei erkennbare Species. Dafür fast die Gesamtheit der Antilopen, mehr als drei Vierteltheile aller Arten, eine viermal grössere Zahl als in ganz Asien. Was Indien der Gruppe der Rinder, das scheint also Africa den Antilopen zu bieten. Wie dort keine einzige Familie der Rinder, so ist hier keine einzige grössere Abtheilung der Antilopen unvertreten. Dennoch ist die Parallele nicht bis in alle Punkte zutreffend und er erscheint das Uebergewicht der Rinder in Indien trotz viel geringerer Artenzahl bei näherem Zusehen noch bedeutender als dasjenige der Antilopen in Africa.

Eine einzige Gruppe, *Oreotragus*, überdies bis jetzt nur durch wenige und kleine Formen von höchst jugendlichem Aussehen vertreten, ist hier ausschliesslich einheimisch — man möchte glauben erst eine Aussaat für die Zukunft. Auch das Schwergewicht der Buschböcke (*Cephalophus*), den Klippspringern nicht an Grösse, aber an Artenzahl überlegen, fällt auf Africa. Allein bei aller Verschiedenheit der äussern Erscheinung erwiesen sich ja, wie wir gesehen, die indischen Genera *Tetraceros* und *Portax* als Glieder derselben Gruppe. Von den Kosmolopiten unter den Antilopen, den Gazellen, fällt auf Africa allerdings nur ein Theil, doch ansehnlich genug dadurch, dass er alle Gipfelformen der Gruppe, wie *Eleotragus*, *Adenota*, *Kobus* u. s. f. enthält. Auch die Strepsiceren, heut zu Tage allerdings wie *Oreotragus* nur noch diesem Continente eigen, erreichen hier im *Kudu*, *Canna*, *Inyala* und so mancher fremdartigen Wiederkäuer-Gestalt ihre Gipfelpunkte.

Am wenigsten kann Africa auf den Titel einer Heimat der Tragina oder der Gemen in hier gebrauchten allgemeinen Sinne des Wortes Anspruch machen, obschon es in Bezug auf Arten die grosse Mehrzahl derselben enthält. Die Jugendformen derselben, die Gemen nach bisherigem üblichem Sprachgebrauch, fehlen hier des Gänzlichen. Dafür enthält es — und wiederum wenigstens heut zu Tage — ausschliesslich Alles, was man an Gipfelformen dieser Abtheilung bezeichnen kann. Immerhin wird man sich erinnern, dass manche mächtige Gestalten, wie Blauböcke und manche Glieder der *Damalis*- und *Oryx*-Gruppe in tertiärer Zeit noch über Südeuropa bis nach Indien reichten. Nur die letzten Schlussformen, wozu es die Gemen-Gruppe in Wucht und Wehr gebracht hat, und merkwürdiger Weise gerade diejenigen, welche nach Architectur des Schädels eine

Parallele zu den Rindern bilden, oder noch darüber hinaus gehen, wie *Gnu*, *Caama*, *Alcelaphus* etc. sind, so viel wir wissen, auf africanischem Boden aufgewachsen und noch heute eingeschränkt.

Alles das scheint allerdings, wie schon geäussert, nur wenig für eine Parallele zwischen Africa und Indien in Bezug auf Beherbergung von Wiederkäuern zu sprechen. Dennoch genügt, auch ohne irgendwelcher anderer Thiergruppen als der Wiederkäuer zu gedenken, die Nennung von zwei einzigen von allem bisher Aufgezählten überaus verschiedenen Bewohnern Africas, um sofort diese zwei grossen Provinzen, trotz aller Macht, womit heutige Geographie sich dagegen sträubt, für Verbreitung von Wiederkäuern auf eine und dieselbe natürliche Linie zu stellen: der einzige africanische Vertreter der Hirsche im weitesten Sinne des Wortes, die *Giraffe* und der einzige africanische Vertreter der Tragulina (*Hyaemoschus* von Sierra Leone), das Aelteste, was an Wiederkäuern noch lebt.

Höchst unbedeutend im Verhältniss zu Africa und Indien verhält sich die **Neue Welt**. Für unsere Betrachtung kann sie füglich bei aller ihrer geographischen Ausdehnung nur im Vorbeigehen erwähnt werden. Sie besitzt an Wiederkäuern zwar immer noch eine nicht unbeträchtliche Zahl, die sich nach Species im Vergleich zu denjenigen der Alten Welt etwa wie 1 zu 6 verhält; allein fast die Gesamtzahl derselben besteht je nur aus Hirschen. Was an Vertretern anderer Gruppen dort wohnhaft ist, beschränkt sich auf eine einzige Art von Rind, auf Eine Gemse, Eine Gazelle und zwei Schafe (*Argali* und *Ovibos*), auf welche sämmtlich America durchaus kein primitives Anrecht hat. Nichts ist gewisser, als, dass Alles das von anderwärts nur abgetreten wurde. Als einheimisch dürfen im Hinblick auf die alttertiäre Thierwelt dieser Erdhälfte ausschliesslich die wenigen und heut zu Tage nur diminutiven Kameele, die sogenannten *Lamas* von Südamerica gelten.

Noch unerheblicher ist die Rolle, welche **Europa**, dieses kleine Vorgebirge der beiden continentalen Massen der Alten Welt als Wohnplatz für Wiederkäuer einnimmt. Nicht eine einzige typische Form kann man namhaft machen, welche für Europa als endemisch gelten dürfte. Mag man den Steinbock der Sierra Nevada, oder denjenigen der Pyrenäen, mag man den Mouflon Corsicas als Species noch so verschieden von östlicher wohnenden Verwandten ansehen, so wäre es ja vergeblich, auch nur Ein Genus zu nennen, für welches Europa als Heimat gelten könnte. Alles ist, und grösstentheils oder gar ausschliesslich von Osten her, entlehnt \*).

---

\*) Vergl. meine Schrift „Ueber die Veränderung der Thierwelt in der Schweiz seit Anwesenheit des Menschen“. Basel 1876. Pag. 75 u. f.

Trotzdem wäre es ein Irrthum, Europa bei aller seiner geographischen Unselbstständigkeit an eigenen Wiederkäuern völlig leer zu nennen. Es bedarf nur des Abhebens des dünnen Blattes jetziger Geschichte, um die Zahl der Wiederkäuer in überraschender Weise zunehmen zu sehen. Die Mehrzahl ist also unterirdisch geworden, etwa wie die Wurzelstöcke von Waldbäumen, die wir auf nicht unbedeutender Erstreckung europäischen Gebietes unter einstigem oder noch heutigem Gletscherboden finden.

Zwar sind auch diese Findlinge in der Mehrzahl augenscheinlich asiatischen und insbesondere indischen Kernes, wie der *Bibos*, ja sogar ein *Leptobos* im Pliocen von Südeuropa, in Toscana, Frankreich u. s. w. — in noch viel späterer Zeit ein *Büffel* aus Nerbudda nicht weniger nördlich als an der Mündung der Weichsel, ein anderer Büffel noch moderneren Ansehens in der Umgebung Roms und Elbas. Umgekehrt trägt die Mehrzahl der in Europa ausgestorbenen *Antilopen* africanisches Gepräge. Unverkennbar africanische Gestalten von Antilopen sind schon in miocener Zeit bis nordwärts der heutigen Alpenlinie hinaufgeschoben. Auch an Gazellen, an Strepsiceren fand sich im Pliocen von Südeuropa eine ganze Fülle, die alle eher auf Africa als auf Indien als Heimat weisen.

Endlich, in der nämlichen Periode, ein ganzer Vorrath jugendlicher *Hirsche*, theils gänzlich hornlos, theils Sprosser, wie Muntjaks und dergleichen, welche Europa als Eigenthum abzusprechen einstweilen noch nicht das geringste Recht vorliegt.

Alle diese Wiederkäuer, trotzdem sie nicht mehr in der Form sibirischer Mammuths mit Haut und Haar, mit Fleisch und Blut erhalten sind, unterirdisch zu nennen und wie die Mammuths von Eis auf längere Zeit bedeckt zu denken, mag nicht so unberechtigt scheinen, wenn wir in die Karte von Europa die Vergangenheit hineinmalen, die uns von allen Vergangenheiten dieses Continents am allerbesten bekannt ist.

Kaum wird man es blosse Dichtung nennen dürfen, wenn man die südlichen Gestalten erloschener Säugethiere Europas, den mediterranen Rand von Africa vielleicht eingeschlossen, sich durch jene harten Perioden von Frost hinweggewischt denkt, deren Spuren in neuester Zeit bis hinab nach Gibraltar nachgewiesen worden sind\*. Mochte damals an Wiederkäuern, wovon die jetzigen Eisgebiete Europas uns ja Bilder genug vor Augen führen, auch keineswegs Alles erloschen sein, so kann man sich doch des Eindrucks nicht erwehren, dass nur harte gegen Frost gestählte Formen zurückgeblieben seien. Was an fröstelnden, gegen Kälte empfindlichen Geschöpfen etwa vorhanden war, scheint weggewischt und ihr Wohnplatz erst nachträglich von Neuem

---

\*) Ramsay und Geikie, On the Geology of Gibraltar. Royal Institut. of Gr. Britain. 24 May 1878. Quart. Journ. Geol. Soc. August 1878.

mit Gestalten bevölkert zu sein, die von Asien her von der neuerdings spriessenden Nahrung sich anlocken liessen.

Fassen wir das Alles nochmals kurz zusammen, so scheint Alles dafür zu sprechen, dass, von der alten Welt allein zu reden, Südafrika und Indien Schauplätze mehr oder weniger perennirender Art für Entwicklung von Wiederkäuern bildeten, während Europa auf wiederholte Auslöschung und neue Aussaat von Thieren und auch insbesondere von Wiederkäuern hinweist. Immer mit einem durchaus nicht unwesentlichen Vorbehalt. Allerlei was hier früher wohnte, ist nicht wieder gekehrt. Der neue Boden erwies sich nur für diese oder jene neuen Samenkörner keimfähig. Sind es ja eigentlich nur zwei grosse Gruppen, welche unter Wiederkäuern mehr oder weniger als kosmopolitisch gelten dürfen. Vor allem aus die Hirsche, welche ja allein von ihrer Familie sich nach Osten bis auf jene äussersten Landzungen Polynesiens hinausgewagt haben, wo nur noch ein kleiner Raum sie an der Eroberung Australiens hemmte, und nach Westen von der Neuen Welt bis hinunter nach Patagonien Besitz nahmen, und zwar allem Anschein nach auf Brücken von Festland, von welchen heut zu Tage nur noch die Köpfe im äussersten Osten Asiens über Wasser ragen.

Weniger kosmopolitisch als die Hirsche, aber doch wenigstens an vielen Orten späteren Eindringens sehr verdächtig verhält sich höchstens noch die Gruppe der Gazellen. Ihr Schwerpunkt liegt unverkennbar im centralen Africa und Indien. Um so bedeutsamer muss es erscheinen, dass stark modificirte Gestalten, gutentheils Rüsselträger, zur Lebensweise in Wüsten, selbst des herbsten Klimas, ausgerüstet, sich nordwärts der Rückengräte der alten Welt bis nach dem Ostende Asiens ausdehnen und eine noch viel sonderbarere Gestalt in einer Begleitung einer einzigen Gemse und einer altweltlichen Form von Schaf bis nach Californien.

### 3. Ausgangspunkte.

Der vorige Abschnitt hat gleichzeitig mit der geographischen Vertheilung Das berücksichtigt, was man passend Verbreitungscentren nennen kann, d. h. Schwerpunkte der heutigen geographischen Vertheilung. Wie sich ergab, kann dieselbe ältern oder neuern Datums sein, ja sie kann sogar auf neuer Aussaat beruhen an Stellen, die schon früher von analoger Thierwelt bewohnt, aber durch irgend welche Ursache von derselben verlassen wurden.

In diesem Sinn ist es also von vornherein am Platze, die Besetzung eines Districtes mit dieser oder jener Thierwelt auf ihre Andauer und auf die Wechsel zu prüfen, welchen sie im Verlauf der Zeiten ausgesetzt war. Die Stelle, wo sich das Schwer-

gewicht der Stammformen oder Jugendformen von natürlichen Thierfamilien zusammenfinden sollte, würde dann wohl als deren Ausgangspunkt gelten dürfen, soweit überhaupt für Thiere so moderner Erscheinung wie die grosse Mehrzahl der uns bekannten Säugethiere von Stammformen die Rede sein kann. Sogar der Begriff Ausgangspunkt fusst also immer noch auf der äussern Erscheinung, wie sie im Allgemeinen durch den populären oder durch den wissenschaftlichen Sprachgebrauch umgrenzt ist. Wie wenig derselbe auf die ausgedehnten Perspectives der Palaeontologie berechnet ist, liegt am Tage. Ist es doch keineswegs so leicht, die Grenzen zu bezeichnen, wo unter selenodonten Paarhufern der Typus «Hirsch» beginnt, oder wo derjenige der «Antilope» aufhört.

Auf den Nachweis von wirklichen Schöpfungscentren wird die Palaeontologie also vorderhand noch auf lange Zeit verzichten müssen, gesetzt auch, dass sie denselben auf wohlbekannte Formen wie Hirsche und Antilopen gründen wollte. Sie wird niemals Schöpfung, sondern immer nur mehr oder weniger rasche Umbildung von schon vorhandenem Stoff entdecken, also niemals Anheben neuer Linien, sondern stets nur Veränderungen in der Continuität von schon Vorhandenem gewahren.

Am ersten noch würde von Schöpfungscentren die Rede sein können in den seltenen Fällen, wo Verbreitungscentren und Ausgangspunkt zusammenfallen, d. h. wo Jugendformen alten und neuen Datums mit Gipfel- und Schlussgestalten derselben Gruppen einen und denselben Raum bewohnen. Mindestens würde dies auf grosse Perennität der Lebensbedingungen der betreffenden Thiergruppe schliessen lassen, möge sich dieselbe als eine entwicklungsarme und spröde oder als eine metabolische und reiche erwiesen haben.

Im Allgemeinen wird dies indessen nur selten zutreffen. In den meisten Fällen sehen wir Entfaltung einer und derselben Familie gerade an Ausstreuung oft über grosse Räume gebunden und findet man die einstweiligen Blüthenformen von den Ausgangsgebilden geographisch weit getrennt.

Unterziehen wir die Thiergruppen, welche den Gegenstand der obigen Darstellung bilden, noch einer kurzen Prüfung in diesem Lichte, so wird es schon deshalb passend sein, sich auf wenige Worte zu beschränken, als ja die heutigen Thier-Namen auch für alte Zeiten fast auf allen Punkten ausreichen und uns also nur selten Verlegenheiten bereiten werden. Unter allen Umständen werden wir also nur kurze Strecken von geologischer Metamorphose zu überblicken haben.

Am perennirendsten nach Wohnort und Gestalt erscheint ohne allen Zweifel die kleine Gruppe der *Tragulina*. Wir kennen sie nirgends anders als in der zierlichen, nach Schädelbau fast lissencephalen, nach Gebiss im höchsten Grade brachyodonten,

nach Grösse vollkommen zwerghaften Form des heutigen Tages. Sie sind nahezu auf die äquatoriale Zone der alten Welt eingeschränkt, und eine progressive Entwicklung verräth sich höchstens in dem verschiedenen Grad der Reduction ihrer Metapodien.

Die zweite Familie heutiger hornloser Wiederkäuer, die **Kameele**, bietet gerade die entgegengesetzte Erscheinung. Sie ist heutzutage merkwürdig schwach in zwei geographisch weit getrennte Gruppen zerrissen, welche beide von dem gemeinsamen Ausgangspunkt weit verschlagen zu sein scheinen. Die eine, die Lamas, von geringer Körpergrösse und auch sonst noch jugendlicher Erscheinung, gehört dem Süden der Neuen Welt an; die andere, weder nach Statur noch sonstwie etwa jugendlich, und als «Wild» mit Sicherheit seit Marco Polo erst in neuester Zeit wieder in den von Przewalsky besuchten Wüsten am Lob-Nor aufgefunden, gehören dem Norden der Alten Welt an\*). Dennoch lassen die fossilen Funde in Nebraska, wo die Stammformen zu Dutzenden auftreten, keinen Zweifel übrig, dass der Westen von Nordamerika beiden als Ausgangspunkt diene.

Für **Giraffen** wird es schwer sein, etwas auszusagen, bevor man über die Verwandtschaft der indischen, der südeuropäischen und der einzig noch lebenden africanischen Form derselben im Reinen sein wird. Nach Mannigfaltigkeit der Erscheinung sollte man geneigt sein, ihnen Indien als Heimat zuzuweisen. Die oben erörterten und sicher nicht unbedeutsamen Beziehungen der africanischen Form zu einem von seiner sonstigen Familie vielfältig abweichenden Hirsch der arctischen Zone stehen dazu allerdings in sehr sonderbarem Verhältniss. Dies lässt einstweilen einen gemeinsamen Schluss über Alles, was wir etwa geneigt sind «Giraffe» zu nennen, gewagt erscheinen.

Als das Unfertigste und Neueste unter Wiederkäuern darf man wohl den Typus der **Hirsche** bezeichnen. Schädelbau und Gebiss lassen trotz der Spaltung des Typus in mehr als ein halbes Hundert Arten ausserordentlich wenig an Mannigfaltigkeit von Gestaltung erkennen. Von Blüten- oder Gipfformen kann kaum anders als in Bezug auf Körpergrösse und entsprechende Ausrüstung zur Wehr die Rede sein. Auch die Merkmale der Arten beruhen, abgesehen von Körpergrösse, fast ausschliesslich auf der launenhaften und nach Lebensalter, ja wie es allen Anschein hat sogar nach

---

\*) Ich glaube nicht, dass die „fossilen“ Kameele von Assuan und andern Punkten der ägyptischen Wüste, welche in den von Herrn Dr. Fr. Mook in Cairo mir zugestellten Sammlungen so reichlich vertreten sind, irgend eine Einwendung hiegegen bilden. Obwohl neben Hyänen, Antilopen bisher unbestimmbarer Art etc. auch von Zebras begleitet, also von Thieren, die für Unter-Egypten längst als erloschen gelten können, so wird doch höchst wahrscheinlich schon dieses „fossile“ Kameel ein importirtes gewesen sein. Den Bericht von Hrn. Dr. Mook siehe in Correspondenzblatt der deutschen Ges. f. Anthropologie etc. Novemb. 1878. P. 142.

Nahrung und Klima wechselnden Gestaltung der Waffen, mit welchen die Natur die männlichen Thiere periodisch ausrüstet — also von Organen, in deren Besitz die grosse Mehrzahl der Vertreter der Species noch gar nicht eingetreten ist. Welche Verwirrung müsste in unserer Eintheilung der Hirsche entstehen, wenn irgend ein Bösewicht über Nacht in unseren Museen Alles was Geweih trägt, ausrottete und nur weibliche Thiere von Hirschen oder etwa auch männliche im Stadium der Wehrlosigkeit stehen liesse.

Solcher Indifferenz der Gestaltung entspricht gewissermaassen die schon erörterte fast kosmopolitische Zerstreuung dieses Typus. Schon seine Jugendformen, seien es ganz hornlose, seien es schon Spiesser oder Gabler, sind sehr zerstreut. In grosser Menge finden sie sich schon in mitteltertiären Schichten von Europa und in etwas jüngern Terrains von Nordamerica. Noch andere bewohnen noch heute, und wie sich immer mehr herausstellt, in ziemlicher Anzahl den äussersten Osten Asiens bis weit hinaus in die Sundawelt.

Vor der Hand ist man also wohl genöthigt, diese gesammte Linie als Keimstätte für Hirsche zu betrachten. Im Allgemeinen von arctischen wie von tropischen Gegenden gleich weit entfernt zieht sie sich von Westeuropa nach Ostasien, ja bis nach Nordamerica hinüber und scheint nach allen Seiten, Südafrica einzig ausgenommen, ihre Ausläufer ausgesendet zu haben.

Eine ähnliche Linie hat sich schon oben als heutiger Verbreitungs-Bezirk der **Schafe** und **Ziegen** herausgestellt, und das Wenige, was wir über deren geologische Geschichte wissen, lässt auf keine merkliche geographische Verschiebung während der bis jetzt bekannten Lebensfrist dieser Thiere schliessen. Bemerkenswerth ist immerhin, dass sowohl das Schwergewicht ihrer jetzigen Vertretung als das Einzige, was uns bis jetzt an primitiver Structur dieses Typus, in *Bucapra Daviesii*, bekannt geworden ist, auf das centrale Asien hinwies.

Weit sicherer kann das Urtheil lauten für **Antilopen** und **Rinder**. Für die gegenwärtige Verbreitung der erstern fällt der Schwerpunkt ohne Zweifel auf Südafrica. So sehr, dass bei näherem Zusehen sogar fast Alles, was wir an Antilopen, lebend oder fossil, auf anderweitigem Gebiete, in Europa, in Asien, ja selbst drüben in Nordamerica kennen, viel eher wie Erfolg alter Ausstrahlung, als wie Einwanderung nach Africa von anderen Ausgangspunkten aussieht. Dies gilt vor Allem für Gazellen und Strepsiceren. Zwei kleine fernere Gruppen, *Oreotragus* und *Cephalophus*, letztere selbstverständlich im engsten Sinne des Wortes, erwiesen sich sogar als für Africa endemisch. Eine merkliche Ausnahme hievon machen nur die Gamsen, insofern als ihre Jugendformen im Begleit der Schafe und Ziegen den alten Ketten der Alten Welt bis hinüber



nach Californien folgen. Nichtsdestoweniger fanden wir die ganze Fülle ihrer Blüthen- und Gipfelsprossen nur südwärts dieser Linien und fast ausschliesslich in Africa ausgestreut. Da sich sogar Alles, was sich an solchen Gipfelformen fossil in Südeuropa und Südasien vorfand, nach Gestalt zunächst heutigen Typen Africas anschliesst, so liegt bei aller Unkenntniss, worin wir uns dermalen bezüglich der fossilen Säugethiere Africas befinden, die Vermuthung sehr nahe, Africa als Ausgangspunkt der grossen Mehrzahl heutiger Antilopen anzusehen.

Am bestimmtesten lautet ohne Zweifel die Auskunft über das vermuthliche Quellgebiet der **Rinder**. Nicht nur liegt sowohl für die Gegenwart als für die Tertiärzeit ihr Schwergewicht in Indien, sondern auch das Einzige, was sich bisher, zwar selbst nach Bau von Schädel und Gebiss den Rindern als Wurzelform unterscheiden liess, Portax und der kleine nur noch im männlichen Geschlecht behornte Tetraceros, ist Indien angehörig. Was Europa, was Africa, was Nordamerica an Rindern enthält, kann füglich als Ausstrahlung aus Asien gelten. Nur die merkwürdigen und innigen Beziehungen mehrerer fossilen und primitiven Gestalten von Rind in Indien zu den zwerghigen Buschböcken Africas lassen noch die Frage offen, ob es sich hier gar um frühe Verpflanzung einer ursprünglich africanischen Gestalt nach Indien, oder um Ausbreitung eines Ablegers in umgekehrter Richtung handeln möchte.

#### 4. Art des Fortschritts der geologischen Metamorphose.

Wenn es nicht zu gewagt sein sollte, schon jetzt hievon zu reden, so ist vorerst zu erinnern, dass sich Alles, was an der Hand der obigen Untersuchung hierüber auszusagen ist, fast nur noch auf die morphologische Geschichte des Schädels und etwa des Gebisses bezieht. Immerhin lassen sich schon hierin gewisse Richtungslinien, sei es in geographischem, sei es in chronologischem Sinne nicht verkennen.

Am augenfälligsten ist vor Allem ein Progress von hornlosen zu bewaffneten Gestalten, denn auch den letzteren liegen ausnahmslos hornlose Jugendformen zu Grunde. Weder Tragulina noch Camelina lassen bis jetzt irgend etwas entdecken, was auf Neigung zur Bildung solcher Waffen deuten könnte. In den übrigen Abtheilungen lässt sich der allgemeine Fortschritt etwa durch folgende Linien versinnlichen:

**Inermia** S. str. (Tragulina, Camelina)

**Inermia** **Cadueicornia** Subulicornia Digiticornia (Spiesser, Gabler, Sechser u. s. f.)

**Pseudocornia** (Procervulus)  
(Giraffe)

**Inermia** **Perennicornia** Solidicornia Cavicornia.

Wie schon gesagt erscheint die erste unter den beiden grossen Reihen eigentlicher Hornträger in jeder Richtung als die spätere und insofern weniger reife, trotz aller Mannigfaltigkeit in oberflächlichen Merkmalen einstweilen an weit engere Grenzen von Structur gebunden als die zweite. Da die Hörner nur an einzelnen Individuen und nur periodisch auftreten und niemals eine bleibende Vereinigung mit Schädelknochen eingehen, so sind sie nothwendig von der Verbindung mit den Lufthöhlen der letzteren ausgeschlossen und unter allen Umständen luftleer.

Sowohl Procervulus als Giraffe erscheinen kaum anders als wie zwei von der Natur noch wenig verwendete und ziemlich ephemere Zwischenstufen zwischen beiden Reihen, die eine mehr den Geweihträgern, die andere mehr den Hornträgern zuneigt.

Unter Perennicornia stehen Strepsiceren und die Gazellen den Hirschen noch am Nächsten. Obschon nach Körpergrösse, Statur und Art der Bewaffnung grosser Mannigfaltigkeit fähig, so halten sich doch die Modificationen ihres Schädelbaues und Zahnbaues innerhalb enger Schranken. Sind doch die erstern selbst in ihren mächtigsten Vertretern noch brachyodont zu nennen. Die Hörner, mögen sie zu noch so ansehnlicher Entfaltung gelangen, stehen gewissermaassen extracranial auf dem Dach der Augenhöhlen und ausser aller Verbindung mit den Lufträumen des Schädels.

Auch die kleine Gruppe von Oreotragus kennen wir bisher, ihrer jugendlichen Physiognomie entsprechend, nur auf dichthörniger und brachyodonter Stufe. Ihre gesammte Physiognomie scheint aber reifere und dann wohl hohlhörnige und säulen-zähnige Formen schon jetzt anzukündigen.

Viel Bestimmteres verspricht in dieser Beziehung die Cephalophusgruppe. Obgleich in Africa an Grösse und Gebiss so jugendlich als Oreotragus, so stehen ihre Hörner doch vollkommen supracranial, allerdings, wie bei so geringer Grösse zu erwarten, noch vollkommen dicht, allein durch ihre Lage für den Fall von Verstärkung nicht nur in die Möglichkeit, sondern in die Nothwendigkeit versetzt, mit den Lufthöhlen des Schädels in Verbindung zu treten. Man kann sich der Frage kaum erwehren, ob nicht Verpflanzung auf andern Boden zu den Resultaten führte, durch welche uns ihre Verwandten in Indien überraschen.

Hohlhörner par excellence — so gut wie die Rinder, von welchen hier nicht mehr besonders die Rede zu sein braucht — sind also unter Antilopen nur die Gemen \*). Die Lufthöhlen des Stirnbeins erstrecken sich so früh als irgend bei Rindern bis in

---

\*) Um Missverständnissen bezüglich des hier so oft in doppeltem Sinne gebrauchten Namens „Gemen“ zu vermeiden, könnte es etwa passend sein, für die allgemeinere Bedeutung des Wortes, wie sie in Pag. 39 angewendet worden, die Bezeichnung *Tragina* einzuführen.

die Hornzapfen und halten mit deren Zunahme an Grösse Schritt. Unter allen Antilopen haben sie sich auch und, wie man glauben sollte, seit ältester Zeit als die am meisten metabolischen erwiesen. Wenn es auch keine einzige Form bis zu Gestalten brachte, welche in vollem Maasse den Namen Rind verdienten, so beruhen doch die Mittel, womit hier die Natur zu jenen Gipfformen fortschritt, die theilweise mindestens Parallelen zu der Gestalt des Rindes bilden, auf denselben Umgestaltungen wie bei dem letztern. Die Stufenfolge bezieht sich einmal auf die progressive Ausdehnung der Stirnzone auf Kosten der Scheitelzone, andererseits auf die Bereicherung des Gebisses, sei es durch säulenartige Ausdehnung, sei es durch Fältelung der Zahnschubstanz. Beide dienen hier so gut als bei Rindern als directer Maassstab des Fortschritts von Jugend- zu Alters- oder von Knospen- zu Blütenformen.

In letzter Linie knüpft sich an die hier abgeschlossene Betrachtung noch eine nicht wenig ernsthafte Frage, zu deren Beantwortung mir freilich dermalen noch alle Anhaltspunkte fehlen. Wie man sah, beruht fast das gesammte Gerüste unserer Untersuchung auf der Abmessung der Rolle, welche den verschiedenen Zonen des Schädels an der Umhüllung des Gehirnes zukömmt. Die physiologische Frage, inwiefern zuletzt die ganze Reihe von Modificationen der Schädelcapsel, die wir durchgegangen, nur morphologischer Ausdruck von, sei es noch so leiser, aber doch unablässiger und für die Knochenhülle unwiderstehlicher Umgestaltung des Gehirnes und Ausdehnung der Muskelansätze des Schädels sein könnte, wird also für die Zukunft einen nicht unwichtigen Hintergrund des gesammten hier in Rede stehenden palaeontologischen Problems bilden. Eine genaue Prüfung dieser Frage scheint umsomehr zu versprechen, als ja die Geleise, in welchen sich die geologische Metamorphose verwirklicht, denjenigen des individuellen Fortschritts von Jugend zu Alter im Grossen und Ganzen parallel laufen.

Auf beiden Seiten handelt es sich grösstentheils um Concentrirung, vorwiegend zu defensiven Zwecken, von allerlei sonst andern Partien des Schädels anvertrauten Functionen auf das Stirnbein, und im facialis Theil desselben und zu nutritiven Zwecken, auf den Oberkiefer.

Welche andere Reihen von Gestalten würden sich ergeben haben, wenn craniale Hörner, diese anfänglich nur der Gipfelhöhe sexueller Thätigkeit beigegebene und erst spät für die Gesamtheit der Species so dominirend gewordene Zuthat, andern Theilen des Craniums entsprossen, oder wenn die Aufgabe der Zubereitung der besondern Nahrung dieser Thiere andern als maxillaren Gebilden zugefallen wäre!

---

## Erklärung der Tafeln.

---

Sämmtliche hier neu mitgetheilte Figuren, Lithographien und Holzschnitte, sind mit Hülfe der Lucae'schen Tafel gezeichnet und mit wenigen am betr. Ort namhaft gemachten Ausnahmen auf  $\frac{1}{3}$  nat. Grösse reducirt. Sie lassen also directe und vergleichende Messungen zu. Die Dinkel'schen Zeichnungen für die Supplement-Tafeln der Fauna antiq. sival., wovon einige hier copirt sind, sind mit der Camera lucida entworfen.

### Tafel I. Sämmtlich aus den Sivalischen Hügeln:

Fig. 1 und 2 *Probubalus (Hemibos) triquetricornis* Falconer spec., weiblich, Brit. Mus. Nr. 16173.

» 3 und 4 *Probubalus (Hemibos) triquetricornis* Falconer spec., *Trochoceros*-form, Br. Mus. Nr. 36665.

» 5 und 6 *Probubalus antelopinus* Rütim. Br. Mus. Nr. 39586.

» 7 und 8 *Leptobos Falconeri* Rütim. Br. Mus. Nr. 40887.

### Tafel II. Sämmtlich aus den Sivalischen Hügeln:

Fig. 1. 2. 3 *Probubalus triquetricornis*, hornlose Form. Br. Mus. Nr. 48033.

» 4. 5 *Bubalus sivalensis* Rütim. Br. Mus. Nr. 16431.

» 6. 7. 8. 9 *Bucapra Daviesii* Rütim. Br. Mus. Nr. 36677.

### Tafel III. Sämmtlich aus den Sivalischen Hügeln:

Fig. 1—7 *Amphibos acuticornis* Falcon.

» 6 junges männliches, Fig. 1—3 erwachsenes männliches, Fig. 7 altes männliches Thier. Fig. 1—3 Br. Mus. Nr. 39560. Fig. 6. Br. Mus. Nr. 48016. Fig. 7. Br. Mus. Nr. 39585.

» 4. 5 weiblich. Br. Mus. Nr. 39564.

### Tafel IV:

Fig. 1. 2 *Probubalus triquetricornis*, männlich, Br. Mus. Nr. 23109. Sival. Hügel.

» 3. 4 *Leptobos Falconeri* Rütim. Br. Mus. Nr. 39567. Sival. Hügel.

» 5. 6 » » » hornlose Form. Br. Mus. Nr. 48,037. Sival. H.

» 7. 8 » » *Strozzii* Rütim. Val d'Arno.

## Tafel V:

- Fig. 1. 2 *Capella rupicapra* Keys. u. Bl.  
 » 3. 4 *Damalis pygarga* Gray.  
 » 5. 6 *Addax nasomaculatus* Gray.  
 » 7. 8 *Alcelaphus Tora* Gray.  
 » 9. 10 *Catoblepas Gnu* Gray.  
 » 11. 12 *Oreotragus saltatrix* Harris.  
 » 13. 14 *Cephalophus pygmaeus* Smith.  
 » 15 *Tetraceros quadricornis* Gray.  
 » 16 *Portax Tragocamelus* Pall.

## Tafel VI:

- Fig. 1 *Gazella Mohr* (Dama) Gray.  
 » 2 *Kobus Sing-Sing* Gray.  
 » 3 *Tetraceros quadricornis* Gray.  
 » 4 *Portax Tragocamelus* Pall.  
 » 5. 6 *Oreas Canna* Gray.  
 » 7. 8 *Portax namadicus* Rütim. Br. Mus. Nr. 36851. Nerbudda.  
 » 9 *Leptobos Falconeri* Rütim., hornlose Form. Br. Mus. Nr. 48037. Siv. H.  
 » 10 *Leptobos Strozzi* Rütim. Val d'Arno.  
 » 11 *Probubalus triquetricornis* (Falc.) *Trochoceros*form. Br. Mus. Nr. 48031.

## Tafel VII:

- Fig. 1. 2 *Probubalus triquetricornis* (Falc.), männlich, Br. M. Nr. 39563.  $\frac{1}{4}$  nat. Grösse.  
 » 3 *Bos etruscus* Falconer. Astigiana. (Museum von Turin).  $\frac{1}{4}$  nat. Grösse.  
 » 4. 5 *Bibos Gaurus* Gray, jung.  
 » 6. 7 *Probubalus celebensis* Rütim. (*Anoa depressicornis* Sundev.).  
 » 8. 9 *Bison americanus* Gray, jung.  
 » 10 Galloway-Rind. Durchschnitt durch die Frontalzone.  
 » 11. 12 *Leptobos Frazeri* Rütim. Br. Mus. Nr. 39714. Nerbudda.  $\frac{1}{4}$  nat. Grösse.  
 » 13. 14 *Palaeoryx Meneghini* Rütim. Toscana. (Mus. in Pisa).  $\frac{1}{2}$  nat. Grösse.

## Holzschnitte im Text.

	Seite
Probubalus triquetricornis (Falc.) . . . . .	135
Bubalus Pallasii Rütim. Danzig . . . . .	143
Amphibos acuticornis Falc. Horndurchschnitte . . . . .	152
Bos etruscus Falc., masc., Val d'Arno. (Mus. v. Florenz) . . .	155
Leptobos Falconeri Rütim. . . . .	159
Galloway-Rind, Oberfläche und Hinterhaupt . . . . .	170
Bos grunniens, Yak, behornt, Oberfläche und Hinterhaupt .	170. 171
» » » hornlos » » » .	170. 171
Galla-Ochse (Zebu), Oberfläche, Hinterhaupt und Seitenansicht	171—179

---

# Inhalts-Uebersicht.

	Seite		Seite
Einleitung . . . . .	3	Spanien . . . . .	85
Allgemeine Bemerkungen über Beurthei-		Italien . . . . .	86
lung von Gestalt am Säugethier-Schädel	9	Deutschland . . . . .	88
Gestaltungsgruppen am Wiederkäuer- „	17	Indien . . . . .	88
<b>Camelina</b> . . . . .	19	America . . . . .	90
<b>Tragulina</b> . . . . .	21	<b>Caprina</b> . . . . .	93
<b>Cervina</b> . . . . .	25	Hemitragus . . . . .	97
Camelopardalis . . . . .	27	Kemas . . . . .	99
<b>Antilopen</b> . . . . .	36	Aegoceros Pallasii . . . . .	99
1. Die Gruppe der Gemsen (Tra-		Ammotragus . . . . .	101
gina) . . . . .	39	Budorcas . . . . .	102
Gemse . . . . .	41	Ovibos . . . . .	103
Nemorhedus . . . . .	43	<b>Fossile Caprina</b> . . . . .	105
Mazama . . . . .	44	Bucapra Daviesii Rütim. . . . .	105
Aegoceros und Damalis . . . . .	44	<b>Bovina</b> . . . . .	113
Addax und Oryx . . . . .	46	<b>Fossile Rinder</b> . . . . .	122
Alcelaphus . . . . .	47	A. Bubalina . . . . .	122
Catoblepas . . . . .	49	1. Probubalus (Hemibos Falc.) trique-	
2. Gruppe von Oreotragus . . . . .	52	tricornis Rütim. . . . .	122
3. Cephalophus-Gruppe . . . . .	54	A. Normal-Form . . . . .	125
Tetraceros . . . . .	56	1. Jugend-Form . . . . .	126
Portax . . . . .	57	2. Weibliche Form . . . . .	126
4. Die Gruppe der Gazellen . . . . .	60	3. Männliche Form . . . . .	127
Saiga . . . . .	65	B. Aepyceros-Form . . . . .	128
Pelea . . . . .	67	C. Trochoceros-Form . . . . .	129
Dicranoceros . . . . .	67	D. Aceros-Form . . . . .	132
(Procervulus) . . . . .	68	2. Probubalus antelopinus Rütim. . . . .	135
5. Strepsiceros-Gruppe . . . . .	73	3. Bubalus sivalensis Rütim. . . . .	138
Schlusswort zu der Uebersicht der An-		4. Bubalus palaeindicus Falconer. . . . .	141
tilopen . . . . .	78	5. Bubalus (Bos C. E. v. Baer) Pal-	
<b>Fossile Antilopen</b> . . . . .	82	lasii Rütim. . . . .	143
Pikermi . . . . .	82	6. Bubalus antiquus Gervais . . . . .	145
Frankreich . . . . .	83	7. Amphibos acuticornis Falc. . . . .	147
Schweiz . . . . .	84	Jugendform . . . . .	150

	Seite		Seite
Weibliche Form . . . . .	151	3. Fossile Rinder. Lydekker's Crania of Ruminants from the Indian Tertiaries. . . . .	181
Männliche Form . . . . .	151	1. Bos planifrons und acutifrons Lyd. . . . .	184
B. Bibovina . . . . .	153	2. Bison sivalensis Falc. . . . .	185
1. Bos (Bibos) palaeogaurus Falc. . . . .	154	3. Bos platyrhinus Lyd. . . . .	186
2. Bos (Bibos) etruscus Falc. . . . .	154	4. Bubalus palaeindicus Falc. . . . .	186
C. Portacina . . . . .	157	5. Bubalus platyceros Lyd. . . . .	186
1. Leptobos Falconeri Rütim. . . . .	157	6. Peribos occipitalis Falc. . . . .	186
A. Horntragende Form . . . . .	158	7. Hemibos triquetriceros Falc. und Amphibos acuticornis Falc. . . . .	187
B. Hornlose Form . . . . .	162	Schlusswort.	
2. Leptobos (Bibos?) Frazeri Rütim. . . . .	165	1. Uebersicht der fossilen und lebenden Rinder . . . . .	189
3. Leptobos Strozzi Rütim. . . . .	167	2. Geographische Vertheilung . . . . .	191
Hornlose lebende Rinder . . . . .	168	3. Ausgangspunkte . . . . .	197
D. Taurina . . . . .	176	4. Art des Fortschritts der geologischen Metamorphose . . . . .	201
Bos namadicus Falconer . . . . .	176	Erklärung der Tafeln. . . . .	204
Zuschrift. Galla- oder Sanga-Rind . . . . .	177		
Nächträge.			
1. Fossile Antilopen . . . . .	180		
2. Fossile Ziegen . . . . .	181		








Fig. 6.




Fig. 5.




Fig. 7.




Fig. 4.




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 8.



Fig. 3.




Fig. 5.




Fig. 9.




Fig. 6.




Fig. 1.




Fig. 7.




Fig. 8.




Fig. 4.




Fig. 10.




Fig. 2.




Fig. 3.





Fig. 11.








Fig. 1.




Fig. 3.




Fig. 2.




Fig. 6.



Fig. 10.




Fig. 5.




Fig. 11.




Fig. 4.




Fig. 8.




Fig. 7.



Fig. 12.




Fig. 9.




Fig. 14.




Fig. 13.